

健康评估-题库

[1] 题型.单选题

[1] 题干.

心前区饱满,多见于()

[1] 正确答案.D

[1] 难易度.易

[1] 选项数.4

[1] A.

急性心肌梗死

[1] B.

左心室肥大

[1] C.

法洛四联症

[1] D.

心包积液

[2] 题型.单选题

[2] 题干.下列各项属于症状的是()

- [2] 正确答案.D
 - [2] 难易度.易
 - [2] 选项数.4
 - [2] A.肝大
 - [2] B.阑尾点压痛
 - [2] C.心脏杂音
 - [2] D.心悸
-

- [3] 题型.单选题
 - [3] 题干.关于主诉的描述,错误的是()
 - [3] 正确答案.D
 - [3] 难易度.易
 - [3] 选项数.4
 - [3] A.病人感觉最明显的症状
 - [3] B.病人感觉最明显的体征
 - [3] C.病人本次就诊最主要的原因
 - [3] D.对病人痛苦感受的诊断性用语
-

- [4] 题型.单选题
 - [4] 题干.方颅可见于()
 - [4] 正确答案.C
 - [4] 难易度.易
 - [4] 选项数.4
 - [4] A.凶门早闭
 - [4] B.脑积水
 - [4] C.佝偻病
 - [4] D.变形性骨炎
-

- [5] 题型.单选题
- [5] 题干.颈静脉怒张不见于()

- [5] 正确答案.D
 - [5] 难易度.易
 - [5] 选项数.4
 - [5] A.心包积液
 - [5] B.缩窄性心包炎
 - [5] C.上腔静脉阻塞综合征
 - [5] D.高血压性心脏病
-

- [6] 题型.单选题
 - [6] 题干.右心室增大时,其心尖搏动的位置()
 - [6] 正确答案.A
 - [6] 难易度.易
 - [6] 选项数.4
 - [6] A.向左移位
 - [6] B.向右移位
 - [6] C.向右下移位
 - [6] D.向左下移位
-

- [7] 题型.单选题
 - [7] 题干.等渗性脱水见于()
 - [7] 正确答案.D
 - [7] 难易度.易
 - [7] 选项数.4
 - [7] A.昏迷病人补液不足
 - [7] B.高热大量出汗
 - [7] C.糖尿病酮症酸中毒
 - [7] D.大面积烧伤
-

- [8] 题型.单选题
- [8] 题干.关于麻疹黏膜斑(Koplik 斑)的描述正确的是

- [8] 正确答案.D
- [8] 难易度.易
- [8] 选项数.4
- [8] A.颊粘膜白色斑块,大小不等高出表面
- [8] B.颊粘膜充血、肿胀并伴有小出血点
- [8] C.颊粘膜有蓝黑色色素沉着
- [8] D.第二磨牙的颊粘膜帽针头大小白色斑点周围绕以红晕
-
-

- [11] 题型.单选题
- [11] 题干.口腔内有烂苹果味,见于
- [11] 正确答案.B
- [11] 难易度.易
- [11] 选项数.4
- [11] A.有机磷农药中毒
- [11] B.糖尿病酮症酸中毒
- [11] C.尿毒症
- [11] D.肝性昏迷
-

- [12] 题型.单选题
- [12] 题干.左心房肥大的特征为
- [12] 正确答案.B
- [12] 难易度.易
- [12] 选项数.4
- [12] A.Ⅱ导联 P 波高尖,振幅 $\geq 0.25\text{mV}$
- [12] B.Ⅱ导联 P 波增宽,时限 ≥ 0.12 秒
- [12] C.Ⅱ导联 P 波高尖,振幅 $\geq 0.12\text{mV}$
- [12] D.导联 P 波增宽,时限 ≥ 0.25 秒
-

[13] 题型.单选题

[13] 题干.

大量腹水并发腹膜炎者的腹外形为

[13] 正确答案.B

[13] 难易度.易

[13] 选项数.4

[13] A.

蛙腹

[13] B.

尖腹

[13] C.

舟状腹

[13] D.

球状腹

[14] 题型.单选题

[14] 题干.

急性心肌梗死最具诊断价值的心电图改变是

[14] 正确答案.C

[14] 难易度.易

[14] 选项数.4

[14] A.

异常 Q 波

[14] B.

ST 段压低

[14] C.

ST 段弓背向上抬高

[14] D.

T 波改变

[15] 题型.单选题

[15] 题干.

关于主诉的描述,错误的是()

[15] 正确答案.D

[15] 难易度.易

[15] 选项数.4

[15] A.

病人感觉最明显的症状

[15] B.

病人感觉最明显的体征

[15] C.

病人本次就诊最主要的原因

[15] D.

对病人痛苦感受的诊断性用语

[16] 题型.单选题

[16] 题干.心源性水肿的特点为:()

[16] 正确答案.A

[16] 难易度.易

[16] 选项数.4

[16] A.首先出现在身体下垂部位

[16] B.初为眼睑与颜面水肿

[16] C.以腹水为主要表现

[16] D.以口唇、眼睑及下肢胫前较明显,呈非凹陷性

- [17] 题型.单选题
- [17] 题干.叩诊移动性浊音阳性,提示腹腔内游离腹水达
- [17] 正确答案.B
- [17] 难易度.易
- [17] 选项数.4
- [17] A.500ml
- [17] B.1000ml
- [17] C.1500ml
- [17] D.2000ml
-

- [18] 题型.单选题
- [18] 题干.网织红细胞绝对值减少见于
- [18] 正确答案.A
- [18] 难易度.易
- [18] 选项数.4
- [18] A.再生障碍性贫血
- [18] B.溶血性贫血
- [18] C.急性大出血
- [18] D.铁剂治疗 1 周后
-

- [19] 题型.单选题
- [19] 题干.粒细胞缺乏症是指中性粒细胞绝对值小于
- [19] 正确答案.A
- [19] 难易度.易
- [19] 选项数.4
- [19] A. $0.5 \times 10^9/L$
- [19] B. $1.0 \times 10^9/L$
- [19] C. $1.5 \times 10^9/L$
- [19] D. $2.0 \times 10^9/L$
-

[20] 题型.单选题

[20] 题干.

体格检查时触诊肌肉松软,被动运动阻力减弱或消失,为

[20] 正确答案.B

[20] 答案解析.B

桶状胸常见于下列哪种疾病()

A.肺结核 B.佝偻病 C.一侧大量胸腔积液 D.肺气肿 B

[20] 难易度.易

[20] 选项数.4

[20] A.

肌张力增强

[20] B.

肌张力减弱

[20] C.

肌力增强

[20] D.

肌力减弱

- [21] 题型.单选题
[21] 题干.评估贫血较可靠的部位是()
[21] 正确答案.A
[21] 难易度.易
[21] 选项数.4
[21] A.脸结膜
[21] B.颈部皮肤
[21] C.指甲
[21] D.面颊皮肤
-

- [22] 题型.单选题
[22] 题干.当左锁骨上窝淋巴结肿大时,常提示()
[22] 正确答案.C
[22] 难易度.易
[22] 选项数.4
[22] A.肺癌转移
[22] B.鼻咽癌转移
[22] C.胃癌、食管癌转移
[22] D.甲状腺癌转移
-

- [23] 题型.单选题
[23] 题干.淤点是指皮下出血的直径为()
[23] 正确答案.A
[23] 难易度.易
[23] 选项数.5
[23] A.<2mm
[23] B.>2~3mm
[23] C.3~5mm
[23] D.>5mm
[23] E.>10mm

-
- [24] 题型.单选题
- [24] 题干.匙状甲最常见于()
- [24] 正确答案.A
- [24] 难易度.易
- [24] 选项数.4
- [24] A.缺铁性贫血
- [24] B.先天性心脏病
- [24] C.肺脓肿
- [24] D.风湿热

-
- [25] 题型.单选题
- [25] 题干.二尖瓣狭窄最具特征的是()
- [25] 正确答案.C
- [25] 难易度.易
- [25] 选项数.4
- [25] A.心尖区第一心音拍击样亢进
- [25] B.肺动脉瓣第二心音亢进
- [25] C.心尖部舒张期隆隆样杂音
- [25] D.左心房肥大

-
- [26] 题型.单选题
- [26] 题干.以下哪种病变使语音震颤增强()
- [26] 正确答案.B
- [26] 难易度.易
- [26] 选项数.4
- [26] A.大量胸腔积液
- [26] B.肺实变
- [26] C.阻塞性肺不张
- [26] D.支气管痉挛

[27] 题型.单选题

[27] 题干.下列哪种情况出现肝浊音界消失()

[27] 正确答案.B

[27] 难易度.易

[27] 选项数.4

[27] A.肺气肿

[27] B.急性胃肠穿孔

[27] C.急性肝坏死

[27] D.肝癌

[28] 题型.单选题

[28] 题干.甲状腺功能亢进面容为()

[28] 正确答案.A

[28] 难易度.易

[28] 选项数.4

[28] A.眼裂增大,眼球突出

[28] B.头颅增大,面部变长

[28] C.双颊紫红,面色晦暗

[28] D.面色苍白,颜面浮肿

[29] 题型.单选题

[29] 题干.下列哪项不属于深反射检查()

[29] 正确答案.B

[29] 难易度.易

[29] 选项数.4

[29] A.跟腱反射

[29] B.提睾反射

[29] C.膝腱反射

[29] D.肱二头肌反射

[30] 题型.单选题

[30] 题干.患者,女,32岁,车祸外伤后处于沉睡状态,不易被唤醒,仅在护士给其静脉输液扎针时苏醒片刻,但答非所问,很快又入睡。意识状态应评估为()

[30] 正确答案.C

[30] 难易度.易

[30] 选项数.4

[30] A.意识模糊

[30] B.谵妄

[30] C.昏睡

[30] D.嗜睡

[31] 题型.单选题

[31] 题干.患者,男,29岁,上腹部胀满不适、呕吐2天,上午八时空腹来院就诊,体格检查发现上腹部振水音,最可能是()

[31] 正确答案.B

[31] 难易度.易

[31] 选项数.4

[31] A.正常

[31] B.幽门梗阻

[31] C.腹腔积液

[31] D.肠梗阻

[32] 题型.单选题

[32] 题干.患者,女,22岁,发现颈部增粗3个月,颈部检查时触及肿大的甲状腺,位于胸锁乳突肌以内,该患者甲状腺肿大程度为()

[32] 正确答案.B

[32] 难易度.易

[32] 选项数.4

- [32] A. I 度肿大
 - [32] B. II 度肿大
 - [32] C. III 度肿大
 - [32] D. 轻度肿大
-

[33] 题型.单选题

[33] 题干.下列引起白细胞升高的疾病是...()

[33] 正确答案.A

[33] 难易度.易

[33] 选项数.4

[33] A.急性细菌感染

[33] B.流行性感冒

[33] C.再生障碍性贫血

[33] D.脾功能亢进

[34] 题型.单选题

[34] 题干.

患者,午餐后剧烈腹痛 6 小时,Murphy 征阳性,应考虑下列哪项疾病
()

[34] 正确答案.B

[34] 难易度.易

[34] 选项数.4

[34] A.

急性肝炎

[34] B.

急性胆囊炎

[34] C.

急性胃炎

[34] D.

急性胰腺炎

[35] 题型.单选题

[35] 题干.

大量腹水并发腹膜炎者的腹外形为

[35] 正确答案.B

[35] 难易度.易

[35] 选项数.4

[35] A.

蛙腹

[35] B.

尖腹

[35] C.

舟状腹

[35] D.

球状腹

[36] 题型.单选题

[36] 题干.

急性心肌梗死最具诊断价值的心电图改变是

[36] 正确答案.C

[36] 难易度.易

[36] 选项数.4

[36] A.

异常 Q 波

[36] B.

ST 段压低

[36] C.

ST 段弓背向上抬高

[36] D.

T波改变

[37] 题型.单选题

[37] 题干.

关于主诉的描述,错误的是()

[37] 正确答案.D

[37] 难易度.易

[37] 选项数.4

[37] A.

病人感觉最明显的症状

[37] B.

病人感觉最明显的体征

[37] C.

病人本次就诊最主要的原因

[37] D.

对病人痛苦感受的诊断性用语

[41] 题型.单选题

[41] 题干.下列属于肾性水肿的特点是()

[41] 正确答案.D

[41] 难易度.易

[41] 选项数.4

[41] A.机体下垂部位明显

[41] B.全身性水肿

[41] C.压陷性水肿

[41] D.从面部开始

[42] 题型.单选题

[42] 题干.病人,男性,60岁,心前区突然疼痛2小时,拟诊冠心病、心肌梗死,首先应进行的检查是()

[42] 正确答案.B

[42] 难易度.易

[42] 选项数.4

[42] A.心脏X线检查

[42] B.心电图及监护

[42] C.心脏超声

[42] D.血清酶学

[43] 题型.单选题

[43] 题干.粪便外观呈白陶土色,主要见于()

[43] 正确答案.B

[43] 难易度.易

[43] 选项数.4

[43] A.消化道溃疡

[43] B.阻塞性黄疸

[43] C.胃癌

[43] D.服用铁剂、炭粉

[44] 题型.单选题

[44] 题干.

男性,45岁,有慢性肝炎病史,近4个月肝区持续胀痛,体检:消瘦明显,贫血貌,巩膜黄染,右肋弓下及剑突下触及肿大肝脏,边缘不整,质硬结节多个。下述哪项检查对定性诊断最有意义()

[44] 正确答案.C

[44] 难易度.易

[44] 选项数.4

[44] A.

碱性磷酸酶

[44] B.

转氨酶

[44] C.

甲胎蛋白

[44] D.

癌胚抗原

[45] 题型.单选题

[45] 题干.

男性,45岁,有慢性肝炎病史,近4个月肝区持续胀痛,体检:消瘦明显,贫血貌,巩膜黄染,右肋弓下及剑突下触及肿大肝脏,边缘不整,质硬结节多个。病史与体检所见哪项最支持原发性肝癌的诊断()

[45] 正确答案.D

[45] 答案解析.

D

女性病人,32岁,反复反酸、暖气3年,外院胃镜检查提示胃窦部溃疡,溃疡处有新鲜出血灶,病人大便性状最支持诊断的是()

A. 果冻状便 B. 食糜便 C. 米泔水样便 D. 柏油便 D

[45] 难易度.易

[45] 选项数.4

[45] A.

消瘦明显,巩膜黄染

[45] B.

贫血貌

[45] C.

肝区疼痛

[45] D.

肝脏质硬有结节

[46] 题型.单选题

[46] 题干.

女性病人,32岁,反复反酸、暖气3年,外院胃镜检查提示胃窦部溃疡,溃疡处有新鲜出血灶,病人昨日起出现呕吐宿食,可能出现的并发症是
()

[46] 正确答案.C

[46] 难易度.易

[46] 选项数.4

[46] A.

出血

[46] B.

感染

[46] C.

幽门梗阻

[46] D.

恶变

[47] 题型.单选题

[47] 题干.金属音调咳嗽见于()

[47] 正确答案.B

[47] 难易度.易

[47] 选项数.4

[47] A.声带炎

[47] B.喉癌

[47] C.纵隔肿瘤

[47] D.支气管扩张

[48] 题型.单选题

[48] 题干.双侧上睑下垂见于()

[48] 正确答案.A

[48] 难易度.易

[48] 选项数.4

[48] A.重症肌无力

[48] B.脑脓肿

[48] C.白喉

[48] D.脑炎

[49] 题型.单选题

[49] 题干.肠鸣音消失常见于()

[49] 正确答案.B

[49] 难易度.易

[49] 选项数.4

[49] A.机械性肠梗阻

[49] B.麻痹性肠梗阻

[49] C.急性胆囊炎

[49] D.大量腹水

[50] 题型.单选题

[50] 题干.

少尿是指 24 小时尿量少于()

[50] 正确答案.D

[50] 答案解析.D

低血钾的心电图主要特征是()

A. ST 段弓背型上抬 B.U 波增高 C.T 波高耸 D.T 波倒置 B

[50] 难易度.易

[50] 选项数.4

[50] A.

100mL

[50] B.

250mL

[50] C.

50mL

[50] D.

400mL

[51] 题型.单选题

[51] 题干.MRI 的中文全称是()

[51] 正确答案.C

[51] 难易度.易

[51] 选项数.4

[51] A.数字减影血管造影术

[51] B.计算机体层摄影术

[51] C.磁共振成像术

[51] D.计算机摄影术

[52] 题型.单选题

[52] 题干.在心电图上 P 波反映的是()

[52] 正确答案.C

[52] 难易度.易

[52] 选项数.4

[52] A.窦房结除极

[52] B.窦房结复极

[52] C.心房除极

[52] D.心房复极

[53] 题型.单选题

[53] 题干.下列各种情况中,哪项易产生三凹征()

[53] 正确答案.A

[53] 难易度.易

[53] 选项数.4

[53] A.吸气性呼吸困难

- [53] B.呼气性呼吸困难
 - [53] C.血源性呼吸困难
 - [53] D.代谢性呼吸困难
-

[54] 题型.单选题

[54] 题干.诊断贫血及贫血程度的最重要指标是()

[54] 正确答案.C

[54] 难易度.易

[54] 选项数.4

[54] A.红细胞计数

[54] B.白细胞计数

[54] C.血红蛋白定量

[54] D.红细胞形态

[55] 题型.单选题

[55] 题干.气管移向患侧的是()

[55] 正确答案.A

[55] 难易度.易

[55] 选项数.4

[55] A.粘连性胸膜炎

[55] B.胸腔积液

[55] C.气胸

[55] D.支气管哮喘

[56] 题型.单选题

[56] 题干.血清肌钙蛋白测定有助于诊断的疾病是()

[56] 正确答案.D

[56] 难易度.易

[56] 选项数.4

[56] A.伤寒

- [56] B.风湿热
- [56] C.艾滋病
- [56] D.心肌梗死

-
- [57] 题型.单选题
 - [57] 题干.柏油样大便可见于()
 - [57] 正确答案.C
 - [57] 难易度.易
 - [57] 选项数.4
 - [57] A.痔出血
 - [57] B.霍乱
 - [57] C.上消化道出血
 - [57] D.感染

-
- [58] 题型.单选题
 - [58] 题干.Murphy 征阳性见于()
 - [58] 正确答案.C
 - [58] 难易度.易
 - [58] 选项数.4
 - [58] A.急性胰腺炎
 - [58] B.急性阑尾炎
 - [58] C.急性胆囊炎
 - [58] D.急性肝炎

-
- [59] 题型.单选题
 - [59] 题干.蜘蛛痣与下列哪种因素有关()
 - [59] 正确答案.D
 - [59] 难易度.易
 - [59] 选项数.4
 - [59] A.血管脆性增加

- [59] B.严重感染
 - [59] C.过敏
 - [59] D.血中雌激素增加
-

[60] 题型.单选题

[60] 题干.

患者,女,34岁,浅昏迷,出汗,呼气呈大蒜味,瞳孔直径1mm,应首先考虑
()

[60] 正确答案.C

[60] 难易度.易

[60] 选项数.4

[60] A.

吗啡中毒

[60] B.

糖尿病酮症酸中毒

[60] C.

有机磷农药中毒

[60] D.

低血糖昏迷

[61] 题型.单选题
[61] 题干.急性肺水肿典型痰液呈 ()
[61] 正确答案.A
[61] 难易度.易
[61] 选项数.4
[61] A.粉红色泡沫痰
[61] B.铁锈色痰
[61] C.脓臭痰
[61] D.砖红色胶冻样痰

[62] 题型.单选题
[62] 题干.关于心房颤动的特点,下列正确的是()
[62] 正确答案.A
[62] 难易度.易
[62] 选项数.4
[62] A.主要见于器质性心脏病
[62] B.心室率 350~600 次/分
[62] C.脉率大于心率
[62] D.心率快而规则

[63] 题型.单选题
[63] 题干.患者,女,18 岁,护理体检提示心前区局部隆起,最常见疾病是()
[63] 正确答案.B
[63] 难易度.易
[63] 选项数.4
[63] A.肺原性心脏病
[63] B.先天性心脏病

[63] C.心包积液

[63] D.肥厚型心肌病

[64] 题型.单选题

[64] 题干.

关于问诊内容的描述,错误的是()

[64] 正确答案.B

[64] 答案解析.B

下列哪项不属于周围血管征()

A.毛细血管搏动征 B.交替脉 C.枪击音 D.水冲脉 B

[64] 难易度.易

[64] 选项数.4

[64] A.

问诊一般应从主诉开始

[64] B.

问诊时应使用特定意义的医学术语

[64] C.

问诊时应及时核实患者陈述中的疑惑之处

[64] D.

问诊开始前护士应先作自我介绍

[65] 题型.单选题

[65] 题干.上肢扑翼样震颤见于()

[65] 正确答案.A

[65] 难易度.易

[65] 选项数.4

[65] A.肝昏迷

[65] B.甲状腺功能亢进

[65] C.糖尿病酮症酸中毒昏迷

[65] D.震颤性麻痹

[66] 题型.单选题

[66] 题干.大量咯血最危险的并发症是()

[66] 正确答案.C

[66] 难易度.易

[66] 选项数.4

[66] A.肺不张

[66] B.失血性休克

[66] C.窒息

[66] D.继发感染

[67] 题型.单选题

[67] 题干.患者,男,58岁,有慢性支气管炎病史20年,伴肺气肿。今晨因用力大便后突感右胸口疼痛,伴干咳、呼吸困难,并出现口唇发绀。体检见气管明显向左移位,此患者病变部位的叩诊音为()

[67] 正确答案.C

[67] 难易度.易

[67] 选项数.4

[67] A.清音

[67] B.浊音

[67] C.鼓音

[67] D.实音

[68] 题型.单选题

[68] 题干.女性患者,40岁,发现其面色晦暗,双颊紫红,口唇轻度发绀,可能的原因是()

[68] 正确答案.A

[68] 难易度.易

[68] 选项数.4

[68] A.二尖瓣狭窄

[68] B.甲状腺功能亢进

[68] C.三尖瓣狭窄

[68] D.贫血 E

[69] 题型.单选题

[69] 题干.

李某,男,50岁,发热、咳嗽、左侧胸痛,喜左侧卧位,自诉此卧位时胸部疼痛减轻。此卧位性质属于()

[69] 正确答案.C

[69] 难易度.易

[69] 选项数.4

[69] A.

主动卧位

[69] B.

被动卧位

[69] C.

被迫卧位

[69] D.

习惯卧位

[70] 题型.单选题

[70] 题干.

男，29岁，腹部剧烈阵发性绞痛1小时，伴呕吐，腹部检查发现肠鸣音8次/分钟，伴金属音。该患者最有可能的诊断是

[70] 正确答案.B

[70] 难易度.易

[70] 选项数.4

[70] A.

急性腹膜炎

[70] B.

机械性肠梗阻

[70] C.

急性肠炎

[70] D.

急性胃肠出血

[71] 题型.单选题

[71] 题干.

下列各种情况中, 哪项易产生三凹征()

[71] 正确答案.A

[71] 难易度.易

[71] 选项数.4

[71] A.

吸气性呼吸困难

[71] B.

呼气性呼吸困难

[71] C.

血源性呼吸困难

[71] D.

代谢性呼吸困难

[72] 题型.单选题

[72] 题干.

下列哪项不属于周围血管征()

[72] 正确答案.B

[72] 难易度.易

[72] 选项数.4

[72] A.

毛细血管搏动征

[72] B.

交替脉

[72] C.

枪击音

[72] D.

水冲脉

[79] 题型.单选题

[79] 题干.

右室明显肥大可出现

[79] 正确答案.A

[79] 难易度.易

[79] 选项数.4

[79] A.

负性心尖搏动

[79] B.

抬举样心尖搏动

[79] C.

心尖搏动消失

[79] D.

弥散性心尖搏动

[80] 题型.单选题

[80] 题干.

女性病人，32岁，反复反酸、暖气3年，外院胃镜检查提示胃窦部溃疡，溃疡处有新鲜出血灶，病人昨日起出现呕吐宿食，可能出现的并发症是

[80] 正确答案.C

[80] 难易度.中

[80] 选项数.4

[80] A.

出血

[80] B.

感染

[80] C.

幽门梗阻

[80] D.

穿孔

[81] 题型.单选题

[81] 题干.

语音震颤检查的方法是将双手

[81] 正确答案.B

[81] 难易度.易

[81] 选项数.4

[81] A.

食指和中指轻放于两侧胸壁对称部位

[81] B.

手掌尺侧缘轻放于两侧胸壁对称部位

[81] C.

指腹轻放于两侧胸壁对称部位

[81] D.

指尖轻放于两侧胸壁对称部位

[82] 题型.单选题

[82] 题干.出现移动性浊音提示腹腔内游离液体

[82] 正确答案.B

[82] 难易度.易

[82] 选项数.5

[82] A.500ml 以上

[82] B.1000ml 以上

[82] C.1500ml 以上

[82] D.2000ml 以上

[82] E.2500ml 以上

[83] 题型.单选题

[83] 题干.剧咳时突然发生剧烈胸痛伴呼吸困难常见于

[83] 正确答案.E

[83] 难易度.易

[83] 选项数.5

[83] A.肺炎球菌性肺炎

[83] B.心绞痛

- [83] C.急性心肌梗死
- [83] D.急性左心衰
- [83] E.自发性气胸

[84] 题型.单选题

[84] 题干.下列哪项可出现呼气性呼吸困难

[84] 正确答案.C

[84] 难易度.易

[84] 选项数.5

[84] A.喉痉挛

[84] B.胸腔积液

[84] C.支气管哮喘

[84] D.气管异物

[84] E.白喉

[85] 题型.单选题

[85] 题干.当毛细血管内还原血红蛋白绝对含量超过下列哪项时,皮肤粘膜可出现发绀

[85] 正确答案.C

[85] 难易度.易

[85] 选项数.5

[85] A.100g/L

[85] B.75g/L

[85] C.50g/L

[85] D.45g/L

[85] E.30g/L

[86] 题型.单选题

[86] 题干.肾源性水肿的特点是

[86] 正确答案.B

- [86] 难易度.易
- [86] 选项数.5
- [86] A.伴颈静脉怒张
- [86] B.伴低蛋白血症
- [86] C.首先出现在身体下垂部位
- [86] D.先消瘦,后水肿
- [86] E.伴肝大
-

[87] 题型.单选题

[87] 题干.男性,60岁。20年前曾患肝炎。近2个月来纳差、消瘦,肝区疼痛明显。查体:轻度黄疸,面部有蜘蛛痣,腹部膨隆:肝肋下2cm、剑突下4cm,质硬,压痛;脾肋下3cm;移动性浊音阳性。现首先应检测的是

- [87] 正确答案.B
- [87] 难易度.难
- [87] 选项数.5
- [87] A.血氨
- [87] B.甲胎蛋白
- [87] C.血清胆红素
- [87] D.血清白蛋白
- [87] E.血清ALT和AST
-

[88] 题型.单选题

[88] 题干.某肾病患者,长期用药治疗,检查面如满月,皮肤发红,伴痤疮。该患者面容属

- [88] 正确答案.B
- [88] 难易度.易
- [88] 选项数.5
- [88] A.肾病面容
- [88] B.满月面容

- [88] C.急性面容
- [88] D.慢性面容
- [88] E.二尖瓣面容

[89] 题型.单选题

[89] 题干.一患者心浊音界明显增大且随体位改变,最可能的疾病是

[89] 正确答案.E

[89] 难易度.中

[89] 选项数.5

[89] A.心肌病

[89] B.冠心病并心衰

[89] C.高血压心肌病

[89] D.重度主动脉瓣闭锁不全

[89] E.大量心包积液

[90] 题型.单选题

[90] 题干.男,48岁,长期吸烟,近2个月来咳嗽加重并咯血丝痰,检查右上肺局限性哮鸣音,余未见异常。该患者哪种可能性较大

[90] 正确答案.C

[90] 难易度.难

[90] 选项数.5

[90] A.支气管哮喘

[90] B.慢性支气管炎

[90] C.右上肺癌

[90] D.急性左心衰

[90] E.支气管扩张

[91] 题型.单选题

[91] 题干.男性,65岁,近3日无尿,下腹部渐隆起,并可触及一囊性球形包块,你考虑主要问题是

- [91] 正确答案.D
 - [91] 难易度.难
 - [91] 选项数.5
 - [91] A.肾结核
 - [91] B.输尿管结石
 - [91] C.腹主动脉瘤
 - [91] D.尿潴留
 - [91] E.结肠癌
-

- [92] 题型.单选题
 - [92] 题干.女性病人,52岁,体检发现气管偏左,右胸廓稍饱满,右侧语颤及呼吸音减弱,叩诊浊音,考虑可能是哪种情况是
 - [92] 正确答案.C
 - [92] 难易度.难
 - [92] 选项数.5
 - [92] A.右侧肺炎
 - [92] B.肺水肿
 - [92] C.右胸腔积液
 - [92] D.右肺不张
 - [92] E.右侧气胸
-

- [93] 题型.单选题
- [93] 题干.患者,女,21岁,发热、胸痛3天入院,考虑为结核性胸膜炎,听诊胸膜摩擦音的最佳部位是
- [93] 正确答案.A
- [93] 难易度.难
- [93] 选项数.5
- [93] A.前下侧胸壁
- [93] B.腋窝下
- [93] C.肺尖

[93] D.背部

[93] E.前胸上部

[94] 题型.单选题

[94] 题干.王先生,30岁,咳嗽、咳痰伴午后低热、乏力、盗汗、食欲减退、体重减轻已3个月,今晨患者一次咯出鲜红色血液约400ml急诊入院。此病人最可能的诊断是

[94] 正确答案.D

[94] 难易度.难

[94] 选项数.5

[94] A.慢性支气管炎

[94] B.支气管扩张症

[94] C.支气管肺癌

[94] D.肺结核

[94] E.风湿性心脏病二尖瓣狭窄

[95] 题型.单选题

[95] 题干.王先生,30岁,咳嗽、咳痰伴午后低热、乏力、盗汗、食欲减退、体重减轻已3个月,今晨患者一次咯出鲜红色血液约400ml急诊入院。此病人最易发生且危险的并发症是

[95] 正确答案.E

[95] 难易度.难

[95] 选项数.5

[95] A.继发感染

[95] B.肺不张

[95] C.失血性休克

[95] D.营养不良

[95] E.窒息

- [96] 题型.单选题
[96] 题干.奇脉见于哪种疾病
[96] 正确答案.A
[96] 难易度.易
[96] 选项数.5
[96] A.心包积液
[96] B.心律失常
[96] C.高血压性心脏病
[96] D.冠脉硬化性心脏病
[96] E.动脉导管未闭
-

- [97] 题型.单选题
[97] 题干.双侧眼睑闭合障碍见于
[97] 正确答案.A
[97] 难易度.易
[97] 选项数.5
[97] A.甲状腺功能亢进症
[97] B.重症肌无力
[97] C.面神经麻痹
[97] D.动眼神经麻痹
[97] E.沙眼
-

- [98] 题型.单选题
[98] 题干.用来衡量心界增大与否与增大程度常用的垂直标志线为
[98] 正确答案.B
[98] 难易度.易
[98] 选项数.5
[98] A.前正中线
[98] B.锁骨中线
[98] C.胸骨线

[98] D.胸骨旁线

[98] E.腋前线

[99] 题型.单选题

[99] 题干.靴形心见于

[99] 正确答案.E

[99] 难易度.易

[99] 选项数.5

[99] A.主动脉瓣狭窄

[99] B.肺动脉瓣关闭不全

[99] C.动脉导管未闭

[99] D.肺动脉瓣狭窄

[99] E.主动脉瓣关闭不全

[100] 题型.单选题

[100] 题干.听到开瓣音常提示

[100] 正确答案.E

[100] 难易度.易

[100] 选项数.5

[100] A.二尖瓣狭窄并二尖瓣关闭不全

[100] B.二尖瓣严重狭窄,瓣膜钙化

[100] C.二尖瓣狭窄分离术的禁忌症

[100] D.二尖瓣狭窄伴左心衰竭

[100] E.二尖瓣轻、中度狭窄,瓣膜弹性和活动性良好

[101] 题型.单选题

[101] 题干.淋巴结可被触及的大小通常为

[101] 正确答案.B

[101] 难易度.易

[101] 选项数.5

- [101] A.直径大于 0.5cm
 - [101] B.直径多在 0.2~0.5cm 之间
 - [101] C.直径小于 0.2mm
 - [101] D.直径在 0.5~1.0cm 之间
 - [101] E.直径大于 1.0cm
-

- [102] 题型.单选题
 - [102] 题干.强迫蹲位见于
 - [102] 正确答案.D
 - [102] 难易度.易
 - [102] 选项数.5
 - [102] A.急性腹膜炎
 - [102] B.冠心病
 - [102] C.高血压病
 - [102] D.发绀型先天性心脏病
 - [102] E.心肌梗死
-

- [103] 题型.单选题
 - [103] 题干.先天性脑积水的头颅畸形,可出现
 - [103] 正确答案.C
 - [103] 难易度.易
 - [103] 选项数.5
 - [103] A.尖颅
 - [103] B.方颅
 - [103] C.巨颅
 - [103] D.小颅
 - [103] E.颅骨塌陷
-

- [104] 题型.单选题
- [104] 题干.蜘蛛痣分布区域除外

- [104] 正确答案.D
 - [104] 难易度.易
 - [104] 选项数.5
 - [104] A.面颈部
 - [104] B.上肢
 - [104] C.前胸
 - [104] D.腹部
 - [104] E.背部
-

- [105] 题型.单选题
 - [105] 题干.桶状胸常见于下列哪种疾病
 - [105] 正确答案.E
 - [105] 难易度.易
 - [105] 选项数.5
 - [105] A.肺结核
 - [105] B.佝偻病
 - [105] C.一侧大量胸腔积液
 - [105] D.肺不张
 - [105] E.肺气肿
-

- [106] 题型.单选题
- [106] 题干.下列哪种疾病不会出现肝浊音界向上移
- [106] 正确答案.E
- [106] 难易度.易
- [106] 选项数.5
- [106] A.右肺纤维化
- [106] B.右下肺不张
- [106] C.气腹
- [106] D.肠胀气
- [106] E.右侧张力性气胸

[107] 题型.单选题
[107] 题干.肺部听诊有散在的哮鸣音,可见于
[107] 正确答案.C
[107] 难易度.易
[107] 选项数.5
[107] A.大叶性肺炎
[107] B.肺淤血
[107] C.支气管哮喘
[107] D.急性肺水肿
[107] E.肺结核

[108] 题型.单选题
[108] 题干.腹壁柔软并且有抵抗,不易压陷,称揉面感,见于
[108] 正确答案.B
[108] 难易度.易
[108] 选项数.5
[108] A.大量腹水
[108] B.结核性腹膜炎
[108] C.胃肠穿孔
[108] D.重症肌无力
[108] E.淋巴瘤

[109] 题型.单选题
[109] 题干.深吸气时,触诊脾脏,在肋缘下超过脐水平线,为
[109] 正确答案.D
[109] 难易度.易
[109] 选项数.5
[109] A.不肿大
[109] B.轻度肿大

- [109] C.中度肿大
- [109] D.重度肿大
- [109] E.特重度肿大

-
- [110] 题型.单选题
 - [110] 题干.McBurney 点压痛、反跳痛,提示
 - [110] 正确答案.E
 - [110] 难易度.易
 - [110] 选项数.5
 - [110] A.急性胃炎
 - [110] B.急性胰腺炎
 - [110] C.急性胆囊炎
 - [110] D.肠梗阻
 - [110] E.急性阑尾炎

-
- [111] 题型.单选题
 - [111] 题干.跟-膝-胫试验主要用于检查
 - [111] 正确答案.A
 - [111] 难易度.易
 - [111] 选项数.5
 - [111] A.共济运动
 - [111] B.不随意运动
 - [111] C.肌力
 - [111] D.肌张力
 - [111] E.随意运动

-
- [112] 题型.单选题
 - [112] 题干.下列哪项不会出现振水音
 - [112] 正确答案.C
 - [112] 难易度.易

- [112] 选项数.5
 - [112] A.正常人餐后 1 小时
 - [112] B.正常人大量饮水后
 - [112] C.正常人清晨空腹
 - [112] D.幽门梗阻
 - [112] E.胃扩张
-

- [113] 题型.单选题
 - [113] 题干.重度贫血时血红蛋白含量为
 - [113] 正确答案.C
 - [113] 难易度.易
 - [113] 选项数.5
 - [113] A.<90g/L
 - [113] B.<70g/L
 - [113] C.<60g/L
 - [113] D.<50g/L
 - [113] E.<40g/L
-

- [114] 题型.单选题
 - [114] 题干.临床检测肾小球滤过功能时,常选用的肾功能试验为
 - [114] 正确答案.A
 - [114] 难易度.易
 - [114] 选项数.5
 - [114] A.内生肌酐清除率
 - [114] B.浓缩稀释试验
 - [114] C.酚红排泌试验
 - [114] D.菊粉清除率
 - [114] E.尿渗量
-

[115] 题型.单选题

[115] 题干.脑脊液检查结果为细胞数和蛋白量显著增高,葡萄糖明显减少,见于

[115] 正确答案.A

[115] 难易度.易

[115] 选项数.5

[115] A.化脓性脑膜炎

[115] B.病毒性脑炎

[115] C.急性脊髓炎

[115] D.感染性多发性神经炎

[115] E.脑肿瘤

[116] 题型.单选题

[116] 题干.血清肌钙蛋白测定有助于诊断的疾病是

[116] 正确答案.E

[116] 难易度.易

[116] 选项数.5

[116] A.伤寒

[116] B.风湿热

[116] C.艾滋病

[116] D.原发性肝细胞癌

[116] E.心肌梗死

[117] 题型.单选题

[117] 题干.左心房肥大的诊断条件是

[117] 正确答案.B

[117] 难易度.易

[117] 选项数.5

[117] A.P 波时限 <0.11 秒

[117] B.PI、PⅡ、PaVL 有切迹,双峰间期 >0.04 秒

- [117] C.电轴右偏
- [117] D.P 波电压 $<2.5\text{mV}$
- [117] E.PⅡ、PⅢ、PaVF 较高尖

[118] 题型.单选题

[118] 题干.下列哪项心电图表现可以说明患者曾发生过心肌梗死

[118] 正确答案.E

[118] 难易度.易

[118] 选项数.5

[118] A.QRS 波群低电压

[118] B.冠状 T 波

[118] C.电轴显著左偏

[118] D.ST 段上抬

[118] E.V3~V5 的 Q 波 $>0.04\text{s}$

[119] 题型.单选题

[119] 题干.肺部疾病检查最常用的放射学检查方法是

[119] 正确答案.B

[119] 难易度.易

[119] 选项数.5

[119] A.透视

[119] B.摄片

[119] C.CT

[119] D.MRI

[119] E.造影

[120] 题型.单选题

[120] 题干.男,52 岁,2 周来饭后上腹胀痛不适,每晚或次晨发生呕吐,呕吐大量酸臭的宿食,吐后感舒适,食欲正常,腹部检查发现胃型及蠕动波。该患者最可能的诊断是

- [120] 正确答案.E
[120] 难易度.易
[120] 选项数.5
[120] A.急性胃扩张
[120] B.急性胃炎
[120] C.急性胆囊炎
[120] D.肠梗阻
[120] E.幽门梗阻
-

[121] 题型.单选题

[121] 题干.男,37岁,腹部剧痛5小时,腹部检查发现腹式呼吸运动减弱,腹部稍隆起,触诊全腹腹肌紧张,压痛和反跳痛(+).该患者最有可能的诊断是

- [121] 正确答案.E
[121] 难易度.易
[121] 选项数.5
[121] A.急性胆囊炎
[121] B.急性阑尾炎
[121] C.急性腹膜炎
[121] D.结核性腹膜炎
[121] E.门静脉性肝硬化
-

[122] 题型.单选题

[122] 题干.一患者,体检为:肝大,质韧,表面光滑,有压痛,肝颈静脉回流征(+),应首先考虑

- [122] 正确答案.A
[122] 难易度.易
[122] 选项数.5
[122] A.肝炎
[122] B.肝癌

- [122] C.肝脓肿
- [122] D.脂肪肝
- [122] E.肝淤血

[123] 题型.单选题

[123] 题干.某病人排出混浊不清尿液,尿标本镜检显示白细胞满视野,并有少许白细胞管型和大量上皮细胞,应考虑为

[123] 正确答案.E

[123] 难易度.易

[123] 选项数.5

[123] A.急性肾炎

[123] B.慢性肾炎

[123] C.急性肾盂肾炎

[123] D.肾脏肿瘤

[123] E.泌尿道结石

[124] 题型.单选题

[124] 题干.男,65岁,慢性咳嗽、咳痰20余年,近5年来反复气急伴夜间不能平卧,偶有下肢水肿。一周前因感冒后出现咳嗽、咳大量黄白色粘痰,气急,口唇发绀,球结膜水肿明显,半卧位。患者意识不清,经常处于睡眠状态,唤醒后有很快入睡,回答基本正确。患者意识障碍程度判断应为

[124] 正确答案.A

[124] 难易度.易

[124] 选项数.5

[124] A.嗜睡

[124] B.昏睡

[124] C.浅昏迷

[124] D.中度昏迷

[124] E.重度昏迷

[125] 题型.单选题

[125] 题干.男,65岁,慢性咳嗽、咳痰20余年,近5年来反复气急伴夜间不能平卧,偶有下肢水肿。一周前因感冒后出现咳嗽、咳大量黄白色粘痰,气急,口唇发绀,球结膜水肿明显,半卧位。肺心病的心电图改变中,下列哪项是不正确的

[125] 正确答案.D

[125] 难易度.易

[125] 选项数.5

[125] A.肺性P波

[125] B.肢体导联QRS波群低电压

[125] C.右心室肥大

[125] D.左心房肥大

[125] E.极度顺钟向转位

[126] 题型.单选题

[126] 题干.患者,女,20岁,车祸致头部外伤2天,昏迷状态,GCS 7分。脐周持续听诊3分钟,听到1次肠鸣音,判断为

[126] 正确答案.C

[126] 难易度.易

[126] 选项数.5

[126] A.肠鸣音活跃

[126] B.肠鸣音亢进

[126] C.肠鸣音减弱

[126] D.肠鸣音消失

[126] E.肠鸣音正常

[127] 题型.单选题

[127] 题干.患者,女,20岁,车祸致头部外伤2天,昏迷状态,GCS 7分。检查发现患者呼吸由浅慢逐渐变深快,然后由深快转为浅慢,随之出

现短时暂停,周而复始,应诊断为

- [127] 正确答案.C
- [127] 难易度.易
- [127] 选项数.5
- [127] A.间停呼吸
- [127] B.叹息样呼吸
- [127] C.潮式呼吸
- [127] D.酸中毒深大呼吸
- [127] E.呼吸过快

-
- [128] 题型.单选题
 - [128] 题干.恶液质是指
 - [128] 正确答案.B
 - [128] 难易度.易
 - [128] 选项数.5
 - [128] A.病危者
 - [128] B.极度消瘦者
 - [128] C.被动体位的患者
 - [128] D.高热昏迷者
 - [128] E.典型无力型者

[129] 题型.单选题
[129] 题干.醉酒步态,即行路时躯干重心不稳,步态紊乱不准确,如同酒醉状,见于

- [129] 正确答案.A
- [129] 难易度.易
- [129] 选项数.5
- [129] A.小脑疾病
- [129] B.脊髓疾病
- [129] C.佝偻病

[129] D.腓总神经麻痹

[129] E.脑性瘫痪

[130] 题型.单选题

[130] 题干.上消化道出血患者,出现黑便常提示出血量超过

[130] 正确答案.E

[130] 难易度.易

[130] 选项数.5

[130] A.5ml

[130] B.10ml

[130] C.15ml

[130] D.25ml

[130] E.50ml

[131] 题型.单选题

[131] 题干.关于肌张力增加的叙述,下列正确的是

[131] 正确答案.B

[131] 难易度.易

[131] 选项数.5

[131] A.触诊时肌肉松软

[131] B.触摸肌肉时有坚实感,伸曲其肢体时阻力增加

[131] C.指鼻试验不能完成

[131] D.轮替动作不协调

[131] E.有舞蹈样运动

[132] 题型.单选题

[132] 题干.关于肌张力增加的叙述,下列正确的是

[132] 正确答案.B

[132] 难易度.易

[132] 选项数.5

- [132] A.触诊时肌肉松软
 - [132] B.触摸肌肉时有坚实感,伸曲其肢体时阻力增加
 - [132] C.指鼻试验不能完成
 - [132] D.轮替动作不协调
 - [132] E.有舞蹈样运动
-

[133] 题型.单选题

[133] 题干.关于嗅神经检查,下列叙述不正确的是

[133] 正确答案.B

[133] 难易度.易

[133] 选项数.5

[133] A.嗅觉的灵敏度可通过问诊了解

[133] B.检查时双侧鼻孔同时进行

[133] C.用醋、酒、香皂等分别放于一侧鼻孔前,要求辨认气味

[133] D.嗅觉正常时可明确分辨测试物品气味

[133] E.如一侧嗅觉减退或丧失,则为同侧嗅神经的损害

[134] 题型.单选题

[134] 题干.做尿常规检查尿标本采集最好留取

[134] 正确答案.B

[134] 难易度.易

[134] 选项数.5

[134] A.夜间中段尿

[134] B.晨起中段尿

[134] C.白天中段尿

[134] D.何时尿液均可

[134] E.24 小时全部尿液

[135] 题型.单选题

[135] 题干.患者在闭眼情况下不能准确说出某一关节的位置,可能出

现了

- [135] 正确答案.D
- [135] 难易度.易
- [135] 选项数.5
- [135] A.浅感觉障碍
- [135] B.复合感觉障碍
- [135] C.触觉障碍
- [135] D.深感觉障碍
- [135] E.图形觉障碍

-
- [136] 题型.单选题
 - [136] 题干.肺炎球菌肺炎典型痰液呈
 - [136] 正确答案.B
 - [136] 难易度.易
 - [136] 选项数.5
 - [136] A.粉红色泡沫痰
 - [136] B.铁锈色痰
 - [136] C.脓臭痰
 - [136] D.砖红色胶冻样痰
 - [136] E.果酱样痰

-
- [137] 题型.单选题
 - [137] 题干.关于呕血,下列叙述哪项不正确
 - [137] 正确答案.D
 - [137] 难易度.易
 - [137] 选项数.5
 - [137] A.最常见的病因为消化性溃疡
 - [137] B.血色呈棕色或暗红色
 - [137] C.血中混有食物残渣和胃液

[137] D.出血前伴有喉部痒感、咳嗽等

[137] E.均伴有黑便

[138] 题型.单选题

[138] 题干.上消化道出血患者,出现黑便常提示出血量超过

[138] 正确答案.E

[138] 难易度.易

[138] 选项数.5

[138] A.5ml

[138] B.10ml

[138] C.15ml

[138] D.25ml

[138] E.50ml

[139] 题型.单选题

[139] 题干.关于心房颤动下列哪项错误

[139] 正确答案.B

[139] 难易度.易

[139] 选项数.5

[139] A.P 波消失

[139] B.f 波的频率多在 250~350 次/min

[139] C.R-R 间距绝对不等

[139] D.QRS 波群形态和时限正常

[139] E.心室律绝对不规则

[140] 题型.单选题

[140] 题干.心电图显示心率 180 次/min,QRS 波时间 0.10 秒,R-R 绝对整齐,应考虑为

[140] 正确答案.B

[140] 难易度.易

- [140] 选项数.5
[140] A.心房颤动
[140] B.阵发性室上性心动过速
[140] C.阵发性室性心动过速
[140] D.窦性心动过速
[140] E.心房扑动
-

- [141] 题型.单选题
[141] 题干.提示肺张力减弱而含气量增多的叩诊音是
[141] 正确答案.B
[141] 难易度.易
[141] 选项数.5
[141] A.清音
[141] B.过清音
[141] C.浊音
[141] D.实音
[141] E.鼓音
-