

儿科护理学-题库

1、脊髓灰质炎疫苗在服用 1 小时内禁用热开水。

答案： 正确

2、牛乳含较多的乙型乳糖。

答案： 正确

3、因小儿咳嗽反应弱，因此呼吸道炎症时应早期使用镇咳药，以避免呼吸困难。

答案： 错误

4、急性肾小球肾炎病人当水肿减轻后就可以上学。

答案： 错误

5、鹅口疮的致病菌是单纯疱疹病毒。

答案： 错误

6、日光照射不足是佝偻病的主要病因。

答案： 正确

7、母乳喂养应注意按需喂养。

答案： 正确

8、小儿时期患病以感染性疾病和慢性病为多见。

答案： 错误

9、出生时即存在, 终生不消失的反射包括瞳孔反射。

答案： 正确

10、生理性体重下降的范围是 15%。

答案： 错误

11、小儿最易发生意外的年龄是幼儿期。

答案： 正确

12、“患儿及家长的批评监督者”属于儿科护士的角色内容。

答案： 错误

13、中毒性菌痢只见于年长儿和成人。

答案： 错误

14、2个月小儿应接种麻疹疫苗。

答案： 错误

15、药物可以和食物混合喂服。

答案： 错误

16、孩子生后半个小时先试喂糖水，成功后再行母乳喂养。

答案： 错误

17、男婴进行蓝光治疗时，应遮盖会阴部。

答案： 正确

18、小儿应该于出生后一周添加辅食。

答案： 错误

19、儿童发热一般使用对乙酰氨基酚和布洛芬。

答案： 正确

20、Apgar 评分 2 分为轻度窒息。

答案： 错误

21、佝偻病初期的主要表现为神经兴奋性增高。

答案： 正确

22、溃疡性口腔炎的病原菌为白色念珠菌。

答案： 错误

23、轮状病毒性肠炎又称秋季腹泻。

答案： 正确

24、小儿腹泻的治疗原则主要为调整饮食、预防和纠正脱水，合理用药、控制感染和预防并发症发生。

答案： 正确

25、儿童左侧支气管粗短，走向垂直，异物容易进入。

答案： 错误

26、肺炎患儿使用抗生素一般要使用到体温正常后 15 天。

答案： 错误

27、心脏胚胎发育的 关键时期是胚胎 2-8 周。

答案： 正确

28、房间隔缺损是儿童最常见先天性心脏病。

答案： 错误

29、肾病综合征患儿易患各种感染。

答案： 正确

30、早产儿应从出生半年后开始补充元素铁。

答案： 错误