

内科学护理学-题库

[1] 题型.单选题

[1] 题干.俞先生,36岁。左胫骨骨折内固定术后3周,气促、呼吸困难4天,不伴发热、咳嗽、咳痰、胸痛、咯血等症状。双肺呼吸音粗,未闻及罗音,心率98次/分,律齐。血气分析:pH7.4, PaO₂66mmHg, PaCO₂31mmHg。该病人首先应考虑:

(1.0)

[1] 正确答案.C

[1] 难易度.易

[1] 选项数.5

[1] A.院内获得性肺炎

[1] B.急性支气管炎

[1] C.肺血栓栓塞症

[1] D.大叶性肺炎

[1] E.脂肪栓塞

[2] 题型.单选题

[2] 题干.胡女士,78岁。既往COPD病史20年,高血压10年,糖尿病3年。反复晕厥4天急诊入院。4天来晕厥4次,半小时前再发。查体:呼吸26次/分,心率109次/分,血压80/47mmHg,神清。血气分析:pH7.407, PaO₂58mmHg, PaCO₂46mmHg。该病人首先应考虑:

(1.0)

[2] 正确答案.D

[2] 难易度.易

[2] 选项数.5

[2] A.COPD急性发作伴肺性脑病

[2] B.急性脑血管意外

[2] C.主动脉夹层

[2] D.肺血栓栓塞症

[2] E.急性心肌梗死

[3] 题型.单选题

[3] 题干.男性,67岁,咳嗽,痰中带血2个月,咳嗽带金属音,请问该患者最可能出现了哪种疾病

(1.0)

[3] 正确答案.C

[3] 难易度.易

[3] 选项数.4

[3] A.支气管哮喘

[3] B.肺炎

[3] C.肺癌

[3] D.肺结核

[4] 题型.单选题

[4] 题干.患者,男性,34岁,有慢支病史,10天前拔牙后发冷发热不愈,咳嗽咳痰加重,2天来咳大量脓痰并带鲜血,胸片右上肺有大片密度增高的阴影,其中并有透光区。最可能的诊断是

(1.0)

[4] 正确答案.E

[4] 难易度.易

[4] 选项数.5

[4] A.肺炎球菌肺炎

[4] B.干酪性肺炎

[4] C.肺炎杆菌肺炎

[4] D.肺癌并发感染

[4] E.肺脓肿

[5] 题型.单选题

[5] 题干.休克型肺炎的患者应用抗生素和补液治疗。提示患者病情好转、血容量已经

补足的体征不包括

(1.0)

[5] 正确答案.E

[5] 难易度.易

[5] 选项数.5

[5] A.口唇红润

[5] B.肢端温暖

[5] C.尿量 > 30ml/h

[5] D.收缩压 > 90mmHg

[5] E.心率 120 次/分

[6] 题型.单选题

[6] 题干.下列对结核杆菌的认识错误的是

(1.0)

[6] 正确答案.C

[6] 难易度.易

[6] 选项数.4

[6] A.对外界抵抗力强

[6] B.培养时生长缓慢

[6] C.阳光下暴晒 2 小时也不能将其杀灭

[6] D.阴湿环境可生存 5 个月以上

[7] 题型.单选题

[7] 题干.女性,22 岁。因发热、干咳、乏力 20 天,咯血 2 天入院。
查体:T38.

5°C,消瘦,右上肺触觉语颤增强、叩诊浊音、可闻及支气管呼吸音。

PPD(1 单位)硬结 20mm.表面有水疱。x 线胸片于右上 2~4 前肋处见密度高、浓淡不均阴影。判断该患者有无传染性的主要方法是

(1.0)

- [7] 正确答案.D
- [7] 难易度.易
- [7] 选项数.5
- [7] A.PPD 试验
- [7] B.有无发热
- [7] C.病人有无咯血
- [7] D.查痰结核菌
- [7] E.拍胸片检查有无空洞

[8] 题型.单选题

[8] 题干.

某患者在结核治疗期间出现了四肢手套、袜套样的感觉减退,可能是那种药物导致的

(1.0)

- [8] 正确答案.A
- [8] 难易度.易
- [8] 选项数.5
- [8] A.

异烟肼

[8] B.

利福平

[8] C.

吡嗪酰胺

[8] D.

链霉素

[8] E.

乙胺丁醇

[9] 题型.单选题

[9] 题干.王女士,32岁。医疗诊断为支气管扩张,入院后呼吸急促,大量脓痰不易咳出,心悸乏力,表情淡漠。首要的护理措施是

(1.0)

[9] 正确答案.D

[9] 难易度.易

[9] 选项数.5

[9] A.湿化呼吸道

[9] B.全面护理体检

[9] C.体位引流

[9] D.机械吸痰

[9] E.有效咳嗽

[10] 题型.单选题

[10] 题干.病人,男性,40岁,因寒颤高热,咳嗽,胸痛,来院就诊。胸透右

上肺有云絮状阴影。查痰肺炎球菌(+),该病人血象

(1.0)

- [10] 正确答案.C
- [10] 难易度.易
- [10] 选项数.5
- [10] A.嗜酸粒细胞增加
- [10] B.淋巴细胞增加
- [10] C.中性粒细胞增加
- [10] D.单核细胞增加
- [10] E.嗜碱性细胞增加

[11] 题型.单选题

[11] 题干.患者男,25岁。患支气管扩张症,咯血约200ml后突然中断,呼吸极度困难,喉部有痰鸣音,表情惊恐,首选的处理是_____。

(1.0)

- [11] 正确答案.B
- [11] 难易度.易
- [11] 选项数.5
- [11] A.呼叫医生
- [11] B.清除呼吸道血块
- [11] C.应用止咳药
- [11] D.应用镇静剂
- [11] E.应用止血药

[12] 题型.单选题

[12] 题干.周奶奶,72岁。慢阻肺病史20年,加重1周入院。血气分析:PaO₂ 50mmHg,PaCO₂ 75mmHg。入院后医嘱给予多沙普仑静脉滴注,提示周奶奶出现:

(1.0)

- [12] 正确答案.D

- [12] 难易度.易
 - [12] 选项数.5
 - [12] A.心力衰竭
 - [12] B.洋地黄中毒
 - [12] C.肺性脑病
 - [12] D.呼吸中枢抑制
 - [12] E.消化道出血
-

- [13] 题型.单选题
 - [13] 题干.引起慢性呼吸衰竭最常见的原发病是
 - (1.0)
 - [13] 正确答案.D
 - [13] 难易度.易
 - [13] 选项数.5
 - [13] A.肺炎
 - [13] B.肺结核
 - [13] C.自发性气胸
 - [13] D.慢阻肺
 - [13] E.支气管肺癌
-

- [14] 题型.单选题
- [14] 题干.吴先生,72岁,因慢性阻塞性肺疾病、肺部感染、II型呼吸衰竭入院。入院第一天晚上,因咳嗽、痰多、呼吸困难,并对医院环境不适应而无法入睡。下列护理措施错误的是:
- (1.0)
- [14] 正确答案.B
- [14] 难易度.易
- [14] 选项数.5
- [14] A.减少夜间操作,保证病人睡眠
- [14] B.给镇咳、镇静药,帮助入睡

- [14] C.给低流量持续吸氧
- [14] D.合理安排白天的睡眠时间
- [14] E.适当解释宣传,帮助熟悉环境

[15] 题型.单选题

[15] 题干.直接导致咯血病人致死的主要原因是

(1.0)

- [15] 正确答案.A
- [15] 难易度.易
- [15] 选项数.5
- [15] A.窒息
- [15] B.恐惧
- [15] C.休克
- [15] D.肺部感染
- [15] E.肺不张

[16] 题型.单选题

[16] 题干.女,41岁。1周前受凉后干咳、胸闷,接触冷空气后明显。无发热,自服“阿奇霉素”无效。既往皮肤常出现瘙痒并起风团,服用“扑尔敏”症状可好转。查体:双肺呼吸音清。胸部X线未见异常。为明确诊断首选的检查是

(1.0)

- [16] 正确答案.A
- [16] 难易度.易
- [16] 选项数.5
- [16] A.肺功能检查
- [16] B.血IgE
- [16] C.皮肤过敏原试验
- [16] D.胸部CT
- [16] E.痰涂片嗜酸性粒细胞计数

[17] 题型.单选题

[17] 题干.男性,35岁,因支气管哮喘发作住院治疗一周,症状得到控制。今晨花园散步后突发胸痛、胸闷,用氨茶碱、甲基强的松龙静滴后仍不能缓解,此时考虑可能有

(1.0)

[17] 正确答案.E

[17] 难易度.易

[17] 选项数.5

[17] A.支气管哮喘急性发作

[17] B.肺不张

[17] C.继发感染

[17] D.心力衰竭

[17] E.自发性气胸

[18] 题型.单选题

[18] 题干.患者女性,50岁,因咳嗽、咳痰、尿少、呼吸困难加重,既往有风湿性心脏病二尖瓣狭窄、心力衰竭。医生考虑患者有急性左心衰,其咳嗽、咳痰的性质是

(1.0)

[18] 正确答案.C

[18] 难易度.易

[18] 选项数.5

[18] A.白色浆液样痰

[18] B.偶尔咳嗽,咳粉红色泡沫样痰

[18] C.频繁咳嗽,咳大量粉红色泡沫样痰

[18] D.偶尔咳嗽,咳白色泡沫状痰

[18] E.痰中带血丝

[19] 题型.单选题

[19] 题干.患者女性,50岁,因胸闷、咳嗽、咳痰、呼吸困难、尿少就诊,既往有风湿性心脏病二尖瓣狭窄。考虑患者出现了心力衰竭,下列检查不能反映心功能状态的是(1.0)

[19] 正确答案.C

[19] 难易度.易

[19] 选项数.5

[19] A.X线检查

[19] B.超声心动图

[19] C.胸部CT

[19] D.放射性核素检查

[19] E.有创性血流动力学检查

[20] 题型.单选题

[20] 题干.男性,52岁,慢性支气管炎病史20年,劳力性心悸,呼吸困难两年,近日发生肺部感染,昨晚突然呼吸困难,坐起,咳大量粉红色泡沫痰,查体:口唇发绀,心尖区触及震颤,听诊心尖区闻舒张期隆隆样杂音,第一心音增强,两肺布满哮鸣音和湿性罗音,则该病人应考虑为:

(1.0)

[20] 正确答案.E

[20] 难易度.易

[20] 选项数.5

[20] A.二尖瓣关闭不全伴肺部感染

[20] B.二尖瓣关闭不全伴心力衰竭

[20] C.二尖瓣狭窄伴肺部感染

[20] D.二尖瓣狭窄伴急性左心功能衰竭

[20] E.二尖瓣狭窄伴急性肺水肿

[21] 题型.单选题

[21] 题干.女士,47岁,患风湿性心脏病二尖瓣狭窄6年余,近日上呼

吸道感染后出现心力衰竭表现,乏力、稍事活动就心慌、憋气,伴有食欲不振,肝区胀痛,双下肢轻度水肿,双肺底湿啰音,心率 128 次/分,护士应如何指导病人休息(1.0)

- [21] 正确答案.E
- [21] 难易度.易
- [21] 选项数.5
- [21] A.活动不受限制
- [21] B.从事轻体力活动
- [21] C.增加睡眠时间,可起床做轻微活动
- [21] D.卧床休息,限制活动量
- [21] E.严格卧床休息,采取半卧位

[22] 题型.单选题

[22] 题干.某 30 岁男性病人,突感心慌,听诊心率每分钟 210 次,心律规则,强弱相等,8 分钟后发作突然停止。最可能是发生是(1.0)

- [22] 正确答案.A
- [22] 难易度.易
- [22] 选项数.5
- [22] A.室上性阵发性心动过速
- [22] B.心房颤动
- [22] C.窦性心动过速
- [22] D.室性阵发性心动过速
- [22] E.心室颤动

[23] 题型.单选题

[23] 题干.女性,40 岁,患有风湿性心脏瓣膜病。突然出现一侧下肢剧痛,动脉搏动消失,局部皮肤苍白,发凉,应考虑是(1.0)

- [23] 正确答案.D
- [23] 难易度.易

- [23] 选项数.4
 - [23] A.下肢静脉炎
 - [23] B.脑栓塞
 - [23] C.肺栓塞
 - [23] D.下肢动脉栓塞
-

- [24] 题型.单选题
 - [24] 题干.右心衰竭最常见的症状是
 - (1.0)
 - [24] 正确答案.A
 - [24] 难易度.易
 - [24] 选项数.5
 - [24] A.恶心呕吐
 - [24] B.劳力性呼吸困难
 - [24] C.咳嗽、咳痰、咯血
 - [24] D.少尿
 - [24] E.疲倦乏力
-

- [25] 题型.单选题
 - [25] 题干.慢性心力衰竭治疗的首选药物是:
 - (1.0)
 - [25] 正确答案.C
 - [25] 难易度.易
 - [25] 选项数.5
 - [25] A.双氢克尿噻
 - [25] B.螺内酯
 - [25] C.卡托普利
 - [25] D.厄贝沙坦
 - [25] E.地高辛
-

[26] 题型.单选题

[26] 题干.给病人服用洋地黄类药物前应测量

(1.0)

[26] 正确答案.B

[26] 难易度.易

[26] 选项数.5

[26] A.体温

[26] B.脉搏

[26] C.呼吸

[26] D.血压

[26] E.体重

[27] 题型.单选题

[27] 题干.心力衰竭病人使用利尿剂时应特别注意

(1.0)

[27] 正确答案.C

[27] 难易度.易

[27] 选项数.5

[27] A.心率变化

[27] B.血压变化

[27] C.电解质变化

[27] D.肾功能变化

[27] E.肝功能变化

[28] 题型.单选题

[28] 题干.刘女士,65岁,既往有高血压史20年,间断胸闷1周,1天前于夜间突然呼吸困难被迫坐起,呼吸可达30~40次/分,咳嗽、咳痰,咳大量粉红色泡沫痰。考虑其发生了急性肺水肿,为减少回心血量、减轻呼吸困难首先应采取

(1.0)

- [28] 正确答案.C
 - [28] 难易度.易
 - [28] 选项数.5
 - [28] A.高浓度吸氧
 - [28] B.利尿
 - [28] C.端坐,双腿下垂
 - [28] D.平卧,抬高下肢
 - [28] E.皮下注射吗啡
-

- [29] 题型.单选题
 - [29] 题干.洋地黄中毒最严重、最主要的不良反应是
 - (1.0)
 - [29] 正确答案.C
 - [29] 难易度.易
 - [29] 选项数.5
 - [29] A.恶心、呕吐
 - [29] B.视物模糊、黄视
 - [29] C.心律失常
 - [29] D.血药浓度增高
 - [29] E.心力衰竭
-

- [30] 题型.单选题
- [30] 题干.循环系统疾病病人出现呼吸困难的情况主要见于
- (1.0)
- [30] 正确答案.B
- [30] 难易度.易
- [30] 选项数.5
- [30] A.心肌梗死
- [30] B.左心衰竭
- [30] C.右心衰竭

[30] D.心律失常

[30] E.冠心病

[31] 题型.单选题

[31] 题干.心室颤动的脉搏特征是(1.0)

[31] 正确答案.E

[31] 难易度.易

[31] 选项数.5

[31] A.快而不规则

[31] B.慢而规则

[31] C.快而规则

[31] D.慢而不规则

[31] E.不能测到

[32] 题型.单选题

[32] 题干.溃疡性结肠炎病变常见的累及部位是(1.0)

[32] 正确答案.A

[32] 难易度.易

[32] 选项数.5

[32] A.直肠和结肠

[32] B.回盲部

[32] C.盲肠

[32] D.结肠

[32] E.升结肠

[33] 题型.单选题

[33] 题干.Crohn 病最常见的并发症是(1.0)

[33] 正确答案.C

[33] 难易度.易

[33] 选项数.5

- [33] A.吸收不良综合征
- [33] B.腹腔内脓肿
- [33] C.肠梗阻
- [33] D.中毒性巨结肠
- [33] E.癌变

[34] 题型.单选题

[34] 题干.患者,男性,38岁。与朋友聚餐大量饮酒、吃肉后出现上腹持续性刀割样疼痛,阵发性加剧,伴恶心呕吐,发热,体温 38.5°C,急查血,血清淀粉酶超过正常值 4 倍,诊断为急性胰腺炎。急诊收入院后,护士收集的患者资料中与急性胰腺炎的发病有关的是(1.0)

- [34] 正确答案.C
- [34] 难易度.易
- [34] 选项数.5
- [34] A.父母双方均有高血压病史
- [34] B.睡眠欠佳
- [34] C.有胆绞痛史
- [34] D.19 岁时曾患甲型肝炎
- [34] E.青霉素过敏史

[35] 题型.单选题

[35] 题干.男性,36岁,饱食后突感上腹部剧痛,迅即扩展至全腹,伴恶心、呕吐,呕吐后腹痛无减轻,发病 2 小时后来院急诊。体检:痛苦貌,血压 85/50mmHg,P124 次/分钟,全腹肌紧张,压痛、反跳痛,肠鸣音消失,白细胞 $16 \times 10^9/L$,中性粒细胞比例 0.90,既往身体健康,无消化性溃疡史、有胆石症病史。若诊断明确,最先采取的措施是(1.0)

- [35] 正确答案.A
- [35] 难易度.易
- [35] 选项数.5
- [35] A.禁食、胃肠减压、抗休克同时完善各项术前准备

- [35] B.密切观察病情变化
- [35] C.积极抗休克治疗,暂不宜手术
- [35] D.积极抗感染治疗
- [35] E.解痉镇痛治疗

[36] 题型.单选题

[36] 题干.消化性溃疡出血治疗时应用抑制胃酸分泌的药物,主要目的是()

(1.0)

- [36] 正确答案.E
- [36] 难易度.易
- [36] 选项数.5
- [36] A.促进溃疡面愈合
- [36] B.避免溃疡面损伤加重
- [36] C.减少溃疡面的血流量
- [36] D.避免胃粘膜应激性损伤
- [36] E.促进血小板在出血部位的聚集

[37] 题型.单选题

[37] 题干.李先生有消化性溃疡病史多年,昨夜开始出现呕血和排黑便多次,今晨家人发现其神情恍惚、四肢厥冷而送入院。以下护理诊断应优先考虑()

(1.0)

- [37] 正确答案.E
- [37] 难易度.易
- [37] 选项数.5
- [37] A.急性意识障碍
- [37] B.潜在并发症:血容量不足
- [37] C.疼痛

[37] D.心输出量减少

[37] E.体液不足

[38] 题型.单选题

[38] 题干.生长抑素用于治疗食管胃底静脉曲张破裂出血的主要机制是()

(1.0)

[38] 正确答案.A

[38] 难易度.易

[38] 选项数.5

[38] A.降低门静脉的血流量

[38] B.促进破裂部位的静脉收缩

[38] C.减少内脏血流量

[38] D.降低局部的血流速度

[38] E.促进破裂部位血栓形成

[39] 题型.单选题

[39] 题干.张先生,45岁,上消化道出血,烦躁、尿少、面色苍白、四肢湿冷,血压 10.6/8.0kPa,出血量约在 700ml。上消化道出血多的病人应先用“生理盐水”快速静脉输入,其作用为(1.0)

[39] 正确答案.B

[39] 难易度.易

[39] 选项数.5

[39] A.维持胶体渗透压

[39] B.扩充血容量

[39] C.纠正酸中毒

[39] D.补充热量

[39] E.为输血做准备

[40] 题型.单选题

[40] 题干.患者男,45岁。肝硬化门静脉高压症伴上消化道出血入院。给予三腔管压迫止血12小时后出血停止。患者主诉三腔管刺激不适,要求拔除,护士的做法错误的是

(1.0)

[40] 正确答案.E

[40] 难易度.易

[40] 选项数.5

[40] A.加强与患者沟通,安抚患者情绪

[40] B.嘱其听音乐,看报纸等转移注意力,减轻不适感

[40] C.安慰鼓励患者,增强其带管的信心

[40] D.耐心解释三腔管的必要性及拔管可能造成的危害

[40] E.安慰患者并满足患者要求,轻柔正确拔出三腔管

[41] 题型.单选题

[41] 题干.患者,女性,45岁,肝硬化8年。近1个月来肝大、持续肝区疼痛、明显消瘦。查体:腹部膨隆,移动性浊音(+),肝大、质硬,表面凹凸不平。患者最可能并发了(1.0)

[41] 正确答案.C

[41] 难易度.易

[41] 选项数.5

[41] A.上消化道出血

[41] B.电解质紊乱和酸中毒

[41] C.原发性肝癌

[41] D.胆管感染

[41] E.胆管阻塞并腹水

[42] 题型.单选题

[42] 题干.一肝硬化病人,述乏力、食欲不振。查体:神清、消瘦、轻度黄疸,肝脾轻度肿大,移动

性浊音阳性。X 线钡餐检查提示食道胃底静脉曲张。请问该病人的饮食护理中不恰当的是

(1.0)

- [42] 正确答案.C
- [42] 难易度.易
- [42] 选项数.5
- [42] A.低盐饮食
- [42] B.适量脂肪饮食
- [42] C.丰富粗纤维粗粮饮食
- [42] D.高热量饮食
- [42] E.高蛋白饮食

[43] 题型.单选题

[43] 题干.某肝硬化病人,护士发现其表情淡漠,怀疑为肝性脑病,下列食物组合适合该患者的是

(1.0)

- [43] 正确答案.A
- [43] 难易度.易
- [43] 选项数.5
- [43] A.白吐司+豆浆
- [43] B.煎蛋+香草奶昔
- [43] C.牛肉披萨+红茶
- [43] D.牛排+色拉
- [43] E.排骨+咖啡

[44] 题型.单选题

[44] 题干.患者男性,56 岁,有肝硬化病史 10 余年。近日食欲明显减退,黄疸加重。今晨因剧烈咳嗽突然呕咖啡色液体约 1200ml,伴头晕、眼花、心悸。为防止发生肝性脑病,下列治疗措施最重要的是

(1.0)

- [44] 正确答案.E
- [44] 难易度.易
- [44] 选项数.5
- [44] A.左旋多巴
- [44] B.肝脑清
- [44] C.极化液应用
- [44] D.脱水药
- [44] E.弱酸溶液灌肠

[45] 题型.单选题

[45] 题干.患者男性,62岁,普查发现肝左叶占位病变约3cm×3cm,体检无阳性体征发现,肝肾功能正常。患者突然出现腹部剧痛及腹膜刺激征。首先考虑(1.0)

- [45] 正确答案.D
- [45] 难易度.易
- [45] 选项数.5
- [45] A.急性胆囊炎
- [45] B.肝癌腹膜转移
- [45] C.急性胃穿孔
- [45] D.肝癌结节破裂
- [45] E.急性胰腺炎

[46] 题型.单选题

[46] 题干.消化性溃疡具有特征性的临床表现是:
(1.0)

- [46] 正确答案.B
- [46] 难易度.易
- [46] 选项数.5
- [46] A.恶心呕吐
- [46] B.反复发作性上腹疼痛

- [46] C.反酸暖气
- [46] D.食欲不振
- [46] E.大便隐血试验阳性

[47] 题型.单选题

[47] 题干.男性,32岁,反复发生腹痛,反酸12年。2周来上述症状加重,并出现夜间痛,进食后能部分缓解。对该患者的诊断首先考虑

(1.0)

- [47] 正确答案.D
- [47] 难易度.易
- [47] 选项数.5
- [47] A.胃癌
- [47] B.反流性食管炎
- [47] C.浅表性胃炎
- [47] D.十二指肠球部溃疡
- [47] E.胃溃疡合并幽门梗阻

[48] 题型.单选题

[48] 题干.男性,35岁,既往有胃溃疡史,今晨上腹突发刀割样疼痛,波及全腹,体温38.7℃,腹部呈板状腹,有压痛、反跳痛及肌紧张,肝浊音界消失,肠鸣音消失。最可能的诊断是

(1.0)

- [48] 正确答案.B
- [48] 难易度.易
- [48] 选项数.5
- [48] A.肝囊肿破裂
- [48] B.胃、十二指肠溃疡穿孔
- [48] C.急性阑尾炎穿孔
- [48] D.急性出血坏死性胰腺炎
- [48] E.急性梗阻性化脓性胆管炎

[49] 题型.单选题

[49] 题干.男性,27岁,自去年冬季以来每日发生腹痛,平时伴有恶心、打嗝、反酸,查体在剑突右侧有局限压痛,无反跳痛,诊断“十二指肠溃疡”。十二指肠溃疡疼痛的特点是:

(1.0)

[49] 正确答案.D

[49] 难易度.易

[49] 选项数.5

[49] A.餐后即痛,持续2小时后缓解

[49] B.餐后1小时开始,持续2小时后缓解

[49] C.餐后2小时开始,持续2小时后缓解

[49] D.餐后3-4小时开始,进餐后缓解

[49] E.无规律性

[50] 题型.单选题

[50] 题干.全身黄疸,粪便呈白陶土色,可见于

(1.0)

[50] 正确答案.A

[50] 难易度.易

[50] 选项数.5

[50] A.胰头癌

[50] B.溶血性贫血

[50] C.钩端螺旋体病肝硬化

[50] D.肝硬化

[50] E.重症肝炎

[51] 题型.单选题

[51] 题干.肾病综合症患者应给予的饮食类型为(1.0)

- [51] 正确答案.C
- [51] 难易度.易
- [51] 选项数.5
- [51] A.低蛋白、低脂肪饮食
- [51] B.高蛋白、高脂肪饮食
- [51] C.正常蛋白、低脂肪饮食
- [51] D.低胆固醇饮食
- [51] E.低蛋白、高脂肪饮食
-

- [52] 题型.单选题
- [52] 题干.患者,男,22岁。无明显诱因出现双下肢水肿2周,尿蛋白(+++),测血压142/86mmHg。导致其水肿最主要的因素是(1.0)
- [52] 正确答案.B
- [52] 难易度.易
- [52] 选项数.5
- [52] A.肾小球滤过率下降
- [52] B.血浆胶体渗透压下降
- [52] C.继发醛固酮增多
- [52] D.抗利尿激素增多
- [52] E.有效滤过压降低
-

- [53] 题型.单选题
- [53] 题干.患者,女48岁。以慢性肾小球肾炎入院,查体,血压182/104mmHg,神志清楚,实验室检查,血肌酐708 μ mol/L,Hb80g/L,肾小球率过滤10ml/min,血钙1.6mmol/L,该患者最有可能发生(1.0)
- [53] 正确答案.A
- [53] 难易度.易
- [53] 选项数.5
- [53] A.肾性骨病
- [53] B.内分泌失调

- [53] C.运动神经损害
- [53] D.营养不良
- [53] E.脑血管意外

[54] 题型.单选题

[54] 题干.患者,女,38岁。患慢性肾小球肾炎不会加重肾损害的因素是(1.0)

- [54] 正确答案.E
- [54] 难易度.易
- [54] 选项数.5
- [54] A.妊娠
- [54] B.劳累
- [54] C.感染
- [54] D.预防接种
- [54] E.心脏早搏

[55] 题型.单选题

[55] 题干.男性,25岁。主诉心前区疼痛2天,向左肩放射,吸气时疼痛加重,坐位时减轻,伴有畏寒、发热就诊。体检:血压14/10kPa (105/75mmHg),体温38°C,心率110次/min,规则,心脏无杂音,两肺阴性。有血吸虫病史。入院第3天,血压为12/10kPa (90/75mmHg),颈静脉怒张,气急不能平卧。病情变化应考虑为(1.0)

- [55] 正确答案.C
- [55] 难易度.易
- [55] 选项数.5
- [55] A.再次肺栓塞
- [55] B.心肌梗死扩大范围.
- [55] C.心包填塞

[55] D.败血症

[55] E.心脏腱索断裂

[56] 题型.单选题

[56] 题干.患者,女,28岁。近3天发热,腰痛,伴尿急,尿频,尿痛,尿镜检,白细胞增多,达25个/HP。针对该患者的护理措施,错误的是(1.0)

[56] 正确答案.E

[56] 难易度.易

[56] 选项数.5

[56] A.第一周卧床休息

[56] B.鼓励多饮水

[56] C.加强营养,补充多种维生素

[56] D.避免劳累

[56] E.憋尿,减少尿频、尿痛的症状

[57] 题型.单选题

[57] 题干.肾衰竭病人出现电解质失调,危害最严重是:

(1.0)

[57] 正确答案.E

[57] 难易度.易

[57] 选项数.5

[57] A.低钠血症

[57] B.高磷血症

[57] C.低钙血症

[57] D.高镁血症

[57] E.高钾血症

[58] 题型.单选题

[58] 题干.患者女,20岁,因缺铁性贫血入院。护士为其进行饮食指导

时,告知其最恰当的食物组合是

(1.0)

[58] 正确答案.C

[58] 难易度.易

[58] 选项数.5

[58] A.鱼、咖啡

[58] B.瘦肉、牛奶

[58] C.橙汁、猪肝

[58] D.鸡蛋、可乐

[58] E.豆腐、绿茶

[59] 题型.单选题

[59] 题干.患者,男,26岁,因特发性血小板减少性紫癜入院。血常规显示血小板 $30 \times 10^9/l$,护士对其进行健康教育不恰当的是

(1.0)

[59] 正确答案.D

[59] 难易度.易

[59] 选项数.5

[59] A.预防各种外伤

[59] B.禁用阿司匹林

[59] C.不可自行停药

[59] D.卧床休息,避免活动

[59] E.定期检查

[60] 题型.单选题

[60] 题干.患者男,诊断为急性白血病,遵医嘱给予环磷酰胺,柔红霉素,长春新碱静脉化疗,甲氨蝶呤鞘内注射,别嘌醇片口服。静脉化疗 20 分钟后,患者主诉输液处疼痛,护士见输液处肢体肿胀,首先应()(1.0)

[60] 正确答案.D

[60] 难易度.易

- [60] 选项数.5
 - [60] A.减慢低速继续滴注
 - [60] B.减慢低速后,局部热敷
 - [60] C.避免血液流出,应直接拔针
 - [60] D.停止输液,连接注射器,边抽吸边拔针
 - [60] E.给液体加温
-

[61] 题型.单选题

[61] 题干.某急性白血病病人,出现高热 39°C,有咳嗽、咳痰、抽搐一次,目前最适合的降温措施是()(1.0)

- [61] 正确答案.D
 - [61] 难易度.易
 - [61] 选项数.5
 - [61] A.温水擦浴
 - [61] B.遵医嘱给退热药
 - [61] C.乙醇擦浴
 - [61] D.大血管处放冰袋
 - [61] E.冰水灌肠
-

[62] 题型.单选题

[62] 题干.彻底治疗缺铁性贫血的关键在于(1.0)

- [62] 正确答案.D
- [62] 难易度.易
- [62] 选项数.5
- [62] A.给予含铁丰富食物
- [62] B.口服铁剂
- [62] C.注射铁剂
- [62] D.去除病因
- [62] E.应用应用糖皮质激素

[63] 题型.单选题

[63] 题干.女,40岁,石油化工工人,长期与苯接触,一年来全身乏力,Hb60g/l,血小板 $50 \times 10^9/l$,网织红细胞低于正常,肝脾不肿大,骨髓增生低下。该患者最可能的诊断是()(1.0)

[63] 正确答案.C

[63] 难易度.易

[63] 选项数.5

[63] A.缺铁性贫血

[63] B.巨幼细胞性贫血

[63] C.再生障碍性贫血

[63] D.溶血性贫血

[63] E.地中海贫血

[64] 题型.单选题

[64] 题干.甲亢患者清晨初醒时血压 140/80mmHg,脉搏 100 次每分,计算基础代谢率后判断甲亢程度为(1.0)

[64] 正确答案.C

[64] 难易度.易

[64] 选项数.5

[64] A.正常范围

[64] B.轻度甲亢

[64] C.中度甲亢

[64] D.重度甲亢

[64] E.特重度甲亢

[65] 题型.单选题

[65] 题干.甲亢病人循环系统临床表现中正确的是(1.0)

[65] 正确答案.E

[65] 难易度.易

- [65] 选项数.5
 - [65] A.脉搏慢而弱
 - [65] B.第一心音减弱
 - [65] C.心搏出量减少
 - [65] D.周围血管收缩,脉压减少
 - [65] E.休息时脉率大于 100 次/分
-

[66] 题型.单选题

[66] 题干.日常生活中使用加碘食盐,多食海带、紫菜等含碘丰富的食物,主要是预防(1.0)

- [66] 正确答案.B
 - [66] 难易度.易
 - [66] 选项数.5
 - [66] A.甲状腺腺癌
 - [66] B.单纯性甲状腺肿
 - [66] C.甲状腺功能亢进
 - [66] D.甲状腺囊肿
 - [66] E.甲状舌骨囊肿
-

[67] 题型.单选题

[67] 题干.单纯甲状腺肿发病的主要临床表现有(1.0)

- [67] 正确答案.D
 - [67] 难易度.易
 - [67] 选项数.5
 - [67] A.心悸
 - [67] B.食欲亢进
 - [67] C.消瘦、乏力
 - [67] D.双侧甲状腺对称性弥漫性肿大
 - [67] E.声嘶
-

[68] 题型.单选题

[68] 题干.甲状腺危象的原因主要由于

(1.0)

[68] 正确答案.B

[68] 难易度.易

[68] 选项数.5

[68] A.手术时过多挤压甲状腺

[68] B.术前准备未达要求

[68] C.切除腺体过多

[68] D.切除腺体不足

[68] E.手术中过度紧张

[69] 题型.单选题

[69] 题干.胰岛素治疗最常见的不良反应是

(1.0)

[69] 正确答案.C

[69] 难易度.易

[69] 选项数.5

[69] A.抗体形成

[69] B.轻度水肿

[69] C.低血糖

[69] D.局部脂肪萎缩

[69] E.过敏反应

[70] 题型.单选题

[70] 题干.胡爷爷,74岁,有糖尿病史近20年。医生检查右脚底发现有一 $3\times 3\text{cm}^2$ 的溃烂,探及深度约1cm,右足X线检查无骨组织病变。该病人的糖尿病足分级属于

(1.0)

[70] 正确答案.B

[70] 难易度.易

[70] 选项数.5

[70] A.1 级

[70] B.2 级

[70] C.3 级

[70] D.4 级

[70] E.5 级

[71] 题型.单选题

[71] 题干.糖化血红蛋白 A1 测定可反映病人取血前几周的血糖总体水平(1.0)

[71] 正确答案.B

[71] 难易度.易

[71] 选项数.5

[71] A.4-8 周

[71] B.8-12 周

[71] C.12-16 周

[71] D.16-20 周

[71] E.20-24 周

[72] 题型.单选题

[72] 题干.张女士,52 岁,诊断糖尿病已 3 年,生活干预 1 年左右效果差,给予口服降糖药治疗,血糖时高时正常,近 1 月来多次监测餐后 2 小时血糖在 12.0~15.0mmol/L,病人感到不满意,说都吃了药了,血糖也降不到正常,医生在与病人的沟通中发现,张女士以为吃药了就不需要生活干预。针对该病人最重要的健康教育内容是(1.0)

[72] 正确答案.B

[72] 难易度.易

[72] 选项数.5

- [72] A.控制饮食
 - [72] B.生活干预是基础,再是遵医嘱用药
 - [72] C.增加药物剂量
 - [72] D.增加运动量
 - [72] E.控制饮食,增加运动量和药物剂量
-

[73] 题型.单选题

[73] 题干.吴先生,56岁。糖尿病病人,不规则服药治疗,血糖常波动于8.6~9.8 mmol/L,尿糖++~+++。近几日感尿频、尿痛,昨日起突然神志不清。查血糖28mmol/L,尿素氮7.8mmol/L,血钠148mmol/L,尿糖+++ ,尿酮++。其诊断为

(1.0)

- [73] 正确答案.E
 - [73] 难易度.易
 - [73] 选项数.5
 - [73] A.低血糖昏迷
 - [73] B.脑出血
 - [73] C.高渗性非酮症糖尿病昏迷
 - [73] D.乳酸性酸中毒
 - [73] E.糖尿病酮症酸中毒
-

[74] 题型.单选题

[74] 题干.2型糖尿病的控制目标中,血压应控制在:

(1.0)

- [74] 正确答案.E
- [74] 难易度.易
- [74] 选项数.5
- [74] A.<125/70mmHg
- [74] B.<125/75 mmHg
- [74] C.<130/80 mmHg

[74] D.<135/85 mmHg

[74] E.<140/80 mmHg

[75] 题型.单选题

[75] 题干.原发性醛固酮增多症出现的代谢紊乱为(1.0)

[75] 正确答案.B

[75] 难易度.易

[75] 选项数.5

[75] A.高血钾

[75] B.尿钾排出增加

[75] C.高血浆肾素

[75] D.低尿钾

[75] E.血醛固酮水平降低

[76] 题型.单选题

[76] 题干.皮质醇增多症的特征性表现是(1.0)

[76] 正确答案.D

[76] 难易度.易

[76] 选项数.5

[76] A.皮肤粘膜色素沉着

[76] B.脊柱变形

[76] C.多毛与痤疮

[76] D.向心性肥胖

[76] E.皮肤紫纹

[77] 题型.单选题

[77] 题干.下列何种治疗在内分泌功能减退中首选(1.0)

[77] 正确答案.D

[77] 难易度.易

[77] 选项数.5

- [77] A.病因治疗
- [77] B.对症治疗
- [77] C.支持治疗
- [77] D.替代治疗
- [77] E.放疗及化疗

[78] 题型.单选题

[78] 题干.张先生, 50 岁, 6 年前诊断为类风湿性关节炎。近日出现外周小关节肿痛、晨僵。该患者目前的护理措施错误的是(1.0)

- [78] 正确答案.D
- [78] 难易度.易
- [78] 选项数.5
- [78] A.注意保暖
- [78] B.避免关节受压
- [78] C.关节肿痛时卧床休息
- [78] D.加强受累关节锻炼
- [78] E.遵医嘱用药

[79] 题型.单选题

[79] 题干.施先生,69 岁。患类风湿性关节炎 3 年,护士指导患者要密切自我观察,下列项目中与病情活动程度密切相关的是(1.0)

- [79] 正确答案.E
- [79] 难易度.易
- [79] 选项数.5
- [79] A.关节痛持续时间
- [79] B.关节肿胀程度
- [79] C.有无类风湿结节
- [79] D.关节皮肤颜色改变
- [79] E.晨僵的持续时间

[80] 题型.单选题

[80] 题干.系统性红每狼疮患者应忌食(1.0)

[80] 正确答案.E

[80] 难易度.易

[80] 选项数.5

[80] A.豆制品

[80] B.鸡蛋

[80] C.牛奶

[80] D.动物内脏

[80] E.芹菜

[81] 题型.单选题

[81] 题干.系统性红斑狼疮患者皮肤护理哪项是错误的(1.0)

[81] 正确答案.E

[81] 难易度.易

[81] 选项数.5

[81] A.常用清水清洗

[81] B.忌用碱性皂液

[81] C.忌用化妆品

[81] D.避免阳光照射

[81] E.10°C冷水湿敷

[82] 题型.单选题

[82] 题干.脑干一侧受损害时可出现
(1.0)

[82] 正确答案.C

[82] 难易度.易

[82] 选项数.5

[82] A.单瘫

- [82] B.偏瘫
- [82] C.交叉瘫
- [82] D.截瘫
- [82] E.四肢瘫

[83] 题型.单选题

[83] 题干.下列瘫痪病人的护理措施中不正确的是

(1.0)

- [83] 正确答案.B
- [83] 难易度.易
- [83] 选项数.5
- [83] A.做好心理护理
- [83] B.早期使用留置尿管
- [83] C.防止压疮发生
- [83] D.保持瘫痪肢体功能位
- [83] E.预防便秘

[84] 题型.单选题

[84] 题干.陶女士,78岁。今晨因与家人发生口角时跌倒在地,不省人事被立即送入医院。护理查体:血压 200/120mmHg,浅昏迷,右侧偏瘫。行颅脑 CT 检查示:左基底节部位高密度影。既往有多年高血压病史。下列措施不正确的是:

(1.0)

- [84] 正确答案.E
- [84] 难易度.易
- [84] 选项数.5
- [84] A.抬高头部
- [84] B.头置冰袋
- [84] C.保持呼吸道通畅

- [84] D.避免搬动体位
- [84] E.迅速降低血压至正常

[85] 题型.单选题

[85] 题干.贾先生,56岁。因TIA反复发作,症状渐趋加重就诊。拟给予抗凝治疗。下列护理评估内容,可除外:

(1.0)

- [85] 正确答案.B
- [85] 难易度.易
- [85] 选项数.5
- [85] A.血小板计数
- [85] B.头部CT
- [85] C.肝肾功能
- [85] D.有无消化性溃疡
- [85] E.出、凝血时间

[86] 题型.单选题

[86] 题干.章先生,55岁。1年内出现3次突然说话不流利,每次持续30分钟左右,第3次伴右侧肢体麻木。神经系统检查正常。有动脉硬化病史。最可能的诊断是

(1.0)

- [86] 正确答案.E
 - [86] 难易度.易
 - [86] 选项数.5
 - [86] A.癫痫部分性发作
 - [86] B.偏头痛
 - [86] C.颈椎病
 - [86] D.顶叶肿瘤
 - [86] E.短暂性脑缺血发作
-

[87] 题型.单选题

[87] 题干.周先生,68岁,脑出血。2天突然出现呼吸变慢、两侧瞳孔大小不等时,此时考虑病人最可能出现的病情变化是(1.0)

[87] 正确答案.B

[87] 难易度.易

[87] 选项数.5

[87] A.窒息

[87] B.脑疝

[87] C.室颤先兆

[87] D.呼吸衰竭

[87] E.脑出血加重

[88] 题型.单选题

[88] 题干.下列有关左侧面神经炎表现的描述,错误的是(1.0)

[88] 正确答案.E

[88] 难易度.易

[88] 选项数.5

[88] A.左侧鼻唇变浅

[88] B.左侧闭眼不全

[88] C.左侧额纹消失

[88] D.左侧鼓腮不能

[88] E.口角偏向左侧

[89] 题型.单选题

[89] 题干.黄先生,22岁,从事IT行业。1天前在加班时突感头部剧烈疼痛,立即晕倒在地,被同事送人医院急诊科。护理查体:血压136/90mmHg,浅昏迷,脑膜刺激征阳性。对该病人的诊断最有意义的检查是(1.0)

[89] 正确答案.A

[89] 难易度.易

- [89] 选项数.5
 - [89] A.头颅 CT
 - [89] B.头颅摄片
 - [89] C.腰椎穿刺术
 - [89] D.头颅多普勒
 - [89] E.脑血管造影
-

- [90] 题型.单选题
 - [90] 题干.癫痫全身强直阵挛发作,应特别强调的处理措施是
(1.0)
 - [90] 正确答案.D
 - [90] 难易度.易
 - [90] 选项数.5
 - [90] A.把病人送到医院救治
 - [90] B.保暖
 - [90] C.注射抗癫痫药物
 - [90] D.保持气道通畅
 - [90] E.吸氧
-

- [91] 题型.单选题
- [91] 题干.吉兰-巴雷综合征病人的首发症状是
(1.0)
- [91] 正确答案.C
- [91] 难易度.易
- [91] 选项数.5
- [91] A.面神经麻痹
- [91] B.心律失常
- [91] C.四肢对称性无力
- [91] D.肢体远端感觉异常
- [91] E.四肢麻木

[92] 题型.单选题

[92] 题干.陆先生,54岁,高血压18年。上班中出现头晕、头痛,血压180/100mmHg,同事将其送往医院治疗,不久症状好转,诊断为TIA,该疾病最常见的病因是

(1.0)

[92] 正确答案.E

[92] 难易度.易

[92] 选项数.5

[92] A.情绪激动

[92] B.高血压

[92] C.吸烟

[92] D.饮酒

[92] E.动脉粥样硬化

[93] 题型.单选题

[93] 题干.吉兰-巴雷综合征最早出现的临床表现是(1.0)

[93] 正确答案.A

[93] 难易度.易

[93] 选项数.5

[93] A.下肢远端迟缓性瘫痪

[93] B.肌肉萎缩

[93] C.呼吸肌麻痹

[93] D.大小便潴留

[93] E.四肢手套袜子状感觉障碍

[94] 题型.单选题

[94] 题干.孙先生,癫痫病史5年,曾有强直阵挛发作。其最适宜的职业是_____。(1.0)

[94] 正确答案.D

- [94] 难易度.易
 - [94] 选项数.5
 - [94] A.汽车驾驶员
 - [94] B.邮递员
 - [94] C.游泳运动员
 - [94] D.办公室职员
 - [94] E.电工
-

[95] 题型.单选题

[95] 题干.男性 40 岁,不规则发热半年余,反复抗菌无效,明显消瘦,侨居国外多年,临床考虑是否同艾滋病有关,下列哪检查既便捷又具特性(1.0)

- [95] 正确答案.C
 - [95] 难易度.易
 - [95] 选项数.5
 - [95] A.血培养
 - [95] B.胸部 CT
 - [95] C.血清抗-HIV
 - [95] D.HIV 分离
 - [95] E.CD4/CD8 比值,CD4 计数
-

[96] 题型.单选题

[96] 题干.急性重型肝炎病情观察中最突出、最有诊断意义的早期表现是(1.0)

- [96] 正确答案.E
- [96] 难易度.易
- [96] 选项数.5
- [96] A.黄疸进行性加深
- [96] B.极度乏力
- [96] C.恶心呕吐

- [96] D.出血倾向
- [96] E.神经精神症状

[97] 题型.单选题

[97] 题干.患儿,4岁,高热3小时伴抽搐4次入院。患儿意识不清,初步诊断为中毒性痢疾,为了确诊须做的检查是(1.0)

- [97] 正确答案.C
- [97] 难易度.易
- [97] 选项数.5
- [97] A.粪便培养
- [97] B.血常规
- [97] C.肛门拭子检查便常规
- [97] D.头颅CT
- [97] E.结肠镜检查

[98] 题型.单选题

[98] 题干.伤寒患者的饮食护理中,以下哪项错误(1.0)

- [98] 正确答案.E
- [98] 难易度.易
- [98] 选项数.5
- [98] A.给予易消化、少纤维、营养丰富饮食
- [98] B.发热期间富含维生素的清淡流质饮食
- [98] C.热退1周后可食低渣、半流质或软饭
- [98] D.发热期间尽量少吃易在肠腔内产气的食物
- [98] E.疾病恢复期患者常有饥饿感,不限制饮食量

[99] 题型.单选题

[99] 题干.我国《传染病防治法》规定的甲类传染病是(1.0)

- [99] 正确答案.A
- [99] 难易度.易

- [99] 选项数.5
 - [99] A.鼠疫、霍乱
 - [99] B.鼠疫、艾滋病
 - [99] C.霍乱、艾滋病
 - [99] D.鼠疫、炭疽病
 - [99] E.霍乱、炭疽病
-

- [100] 题型.单选题
 - [100] 题干.流脑患者体温过高的护理措施中, 下列哪项不正确(1.0)
 - [100] 正确答案.C
 - [100] 难易度.易
 - [100] 选项数.5
 - [100] A.密切观察病情
 - [100] B.给予冰敷降温
 - [100] C.给予乙醇擦浴降温
 - [100] D.必要时给予解热镇痛剂
 - [100] E.必要时给予亚冬眠疗法
-

- [101] 题型.单选题
- [101] 题干.病人慢性咳喘 8 年,有肺气肿征,一周来黄痰不易咳出,气促加重,发绀,血气分析二氧化碳分压 66mmHg,氧分压 52mmHg,改善病人缺氧的措施是:
- [101] 正确答案.D
- [101] 难易度.易
- [101] 选项数.5
- [101] A.立即吸入高浓度氧气
- [101] B.间歇吸入纯氧
- [101] C.立即呼气末正压通气
- [101] D.低浓度持续给氧
- [101] E.给高压氧舱

-
- [102] 题型.单选题
- [102] 题干.肺结核病人痰结核菌阳性转阴,提示:
- [102] 正确答案.C
- [102] 难易度.易
- [102] 选项数.5
- [102] A.病变已纤维化
- [102] B.治疗药物可减量
- [102] C.不需隔离
- [102] D.可恢复体力活动
- [102] E.需接种卡介苗

-
- [103] 题型.单选题
- [103] 题干.肺心病急性加重期的关键治疗措施是:
- [103] 正确答案.A
- [103] 难易度.易
- [103] 选项数.5
- [103] A.改善呼吸功能
- [103] B.控制呼吸道感染
- [103] C.利尿减轻心负荷
- [103] D.给洋地黄制剂
- [103] E.控制心律失常

-
- [104] 题型.单选题
- [104] 题干.某心脏病病人,突发严重的呼吸困难,强迫坐位.极度烦躁.频繁咳嗽,咳出大量粉红色泡沫痰。此时最主要的护理诊断是:
- [104] 正确答案.C
- [104] 难易度.易
- [104] 选项数.5
- [104] A.有受伤的危险

- [104] B.焦虑
 - [104] C.气体交换受损
 - [104] D.潜在并发症:心源性休克
 - [104] E.潜在并发症:高血压危象
-

[105] 题型.单选题

[105] 题干.某冠心病病人,不能从事任何体力活动,休息时也乏力.心悸气急。其心功能属:

- [105] 正确答案.D
 - [105] 难易度.易
 - [105] 选项数.5
 - [105] A.一级
 - [105] B.二级
 - [105] C.三级
 - [105] D.四级
 - [105] E.无法分级
-

[106] 题型.单选题

[106] 题干.关于室性期前收缩的心电图表现,下述错误的是:

- [106] 正确答案.C
 - [106] 难易度.易
 - [106] 选项数.5
 - [106] A.有提前出现的宽大畸形的 QRS 波
 - [106] B.T 波方向与 QRS 波主波方向相反
 - [106] C.QRS 波群前、后可出现逆行的 P 波
 - [106] D.代偿间歇完全
 - [106] E.室性融合波
-

[107] 题型.单选题

[107] 题干.某夜班护士查房时发现一左心衰竭病人心衰尚未完全控

制,为预防阵发性呼吸困难的发生,宜采取最重要的措施是:

- [107] 正确答案.C
- [107] 难易度.易
- [107] 选项数.5
- [107] A.睡前给少量镇静剂
- [107] B.夜间继续吸 O₂
- [107] C.保持半卧位睡眠
- [107] D.注意保暖
- [107] E.睡前口服镇静剂

[108] 题型.单选题

[108] 题干.下列心绞痛发作时的处理,不正确的是:

- [108] 正确答案.A
- [108] 难易度.易
- [108] 选项数.5
- [108] A.立即送医院治疗
- [108] B.舌下含化硝异山梨醇酯
- [108] C.半卧位
- [108] D.吸氧
- [108] E.监测生命体征的变化

[109] 题型.单选题

[109] 题干.58 岁女性病人,突起持续性胸骨后疼痛 5 小时,含服硝酸甘油无效。心电图为急性广泛前壁心肌梗塞,室性早搏每分钟 8 次。下列应迅速采取的措施为:

- [109] 正确答案.D
- [109] 难易度.易
- [109] 选项数.5
- [109] A.心律平静脉推注
- [109] B.地高辛口服

- [109] C.同步电除颤
 - [109] D.利多卡因静脉推注
 - [109] E.阿托品肌肉注射
-

[110] 题型.单选题

[110] 题干.钱先生,60岁。慢支并发肺气肿病史20年,近2周来出现发热、咳嗽、咳大量粘液脓痰,伴心悸、气喘、全身乏力。神志清晰、呼吸急促、发绀明显、颈静脉怒张、下肢浮肿。根据首优原则,该病人最主要的护理诊断是:

- [110] 正确答案.B
 - [110] 难易度.易
 - [110] 选项数.5
 - [110] A.体温过高
 - [110] B.清理呼吸道无效
 - [110] C.气体交换受损
 - [110] D.低效性呼吸形态
 - [110] E.体液过多
-

[111] 题型.单选题

[111] 题干.许女士,67岁,发现高血压15年,胸痛间歇发作3年诊断为高血压病、冠心病。给予普萘洛尔10mg,每天3次治疗。今日突然出现胸闷、气急、咯泡沫痰。查体:端坐位,心率115次/分,双肺底湿罗音,双下肢无浮肿。该病人目前的诊断为:

- [111] 正确答案.E
- [111] 难易度.易
- [111] 选项数.5
- [111] A.并发肺炎
- [111] B.急性心肌梗塞
- [111] C.心绞痛发作

[111] D.全心衰竭

[111] E.急性左心衰竭

[112] 题型.单选题

[112] 题干.某病人甲亢 3 年,短期服他巴唑后病情好转,自行停药,其后又复发,3 日来腹泻,每日 5-7 次,高热多汗,诊断为甲状腺危象,下列护理应除外:

[112] 正确答案.A

[112] 难易度.易

[112] 选项数.5

[112] A.停用抗甲状腺药

[112] B.绝对卧床

[112] C.采取物理降温措施

[112] D.必要时人工冬眠降温

[112] E.补充足够液体

[113] 题型.单选题

[113] 题干.某男性病人,70 岁。因活动中突然跌倒,昏迷 1 小时入院。体检:左侧鼻唇沟变浅,左上、下肢瘫痪,错误的护理是:

[113] 正确答案.B

[113] 难易度.易

[113] 选项数.5

[113] A.暂禁食

[113] B.去枕平卧

[113] C.吸氧

[113] D.控制入液量

[113] E.保持呼吸通畅

[114] 题型.单选题

[114] 题干.某消化性溃疡病人,出院时咨询有关食用汤类中,哪种对

他较适宜:

- [114] 正确答案.B
- [114] 难易度.易
- [114] 选项数.5
- [114] A.咖啡牛肉汤
- [114] B.菜末蛋花汤
- [114] C.榨菜肉丝汤
- [114] D.老母鸡汤
- [114] E.竹笋肉汤

-
- [115] 题型.单选题
 - [115] 题干.最能提示急性胰腺炎预后不良的一项是:
 - [115] 正确答案.D
 - [115] 难易度.易
 - [115] 选项数.5
 - [115] A.血淀粉酶增高
 - [115] B.尿淀粉酶增高
 - [115] C.血糖增高
 - [115] D.血钙降低
 - [115] E.体温 40°C

-
- [116] 题型.单选题
 - [116] 题干.肝硬化患者,3 小时前呕鲜红色血 800ml 而急诊入院,血压 90/60mmhg,脉率 124 次/分。护理中不妥的是:
 - [116] 正确答案.C
 - [116] 难易度.易
 - [116] 选项数.5
 - [116] A.去枕平卧
 - [116] B.密切观察生命体征及神志变化
 - [116] C.流质饮食

[116] D.建立静脉通路

[116] E.备好双气囊三腔管待用

[117] 题型.单选题

[117] 题干.贾先生,55岁。患慢性肾衰竭,在纠正酸中毒后,出现手足抽搐。其原因是

[117] 正确答案.D

[117] 难易度.易

[117] 选项数.5

[117] A.代谢性碱中毒

[117] B.呼吸性碱中毒

[117] C.血钾降低

[117] D.游离钙降低

[117] E.血磷过高

[118] 题型.单选题

[118] 题干.64岁胡先生,6年前胃肠钡餐造影检查发现胃小弯溃疡,上腹部节律性疼痛时好时坏。近来中上腹有饱胀感,大便隐血试验多次阳性,有贫血体征。你在家访时首选建议是

[118] 正确答案.D

[118] 难易度.易

[118] 选项数.5

[118] A.继续用药

[118] B.注意饮食卫生

[118] C.劳逸结合

[118] D.立即就医

[118] E.适当服用抗生素

[119] 题型.单选题

[119] 题干.

控制轻度哮喘发作的首选药是

[119] 正确答案.E

[119] 难易度.易

[119] 选项数.5

[119] A.

氨茶碱

[119] B.

地塞米松

[119] C.

色甘酸钠

[119] D.

青霉素

[119] E.

沙丁胺醇

[120] 题型.单选题

[120] 题干.自发性气胸典型的临床表现是

- [120] 正确答案.A
- [120] 难易度.易
- [120] 选项数.5
- [120] A.突发胸痛,刺激性干咳和呼吸困难
- [120] B.咳嗽、咯血
- [120] C.寒战高热
- [120] D.咳大量脓臭痰
- [120] E.咳粉红色泡沫样痰
-

[121] 题型.单选题

[121] 题干.女,18岁,有基础代谢增高及交感神经兴奋症状,突眼,甲状腺肿大,质软,无压痛,可闻及血管杂音及震颤,手眼震颤,听诊房颤律。以下哪项体征对该病最具诊断意义

- [121] 正确答案.B
- [121] 难易度.易
- [121] 选项数.5
- [121] A.体重减轻
- [121] B.弥漫性甲状腺肿伴血管杂音及震颤
- [121] C.房颤
- [121] D.突眼
- [121] E.手眼震颤
-

[122] 题型.单选题

[122] 题干.女,18岁,有基础代谢增高及交感神经兴奋症状,突眼,甲状腺肿大,质软,无压痛,可闻及血管杂音及震颤,手眼震颤,听诊房颤律。既能阻断甲状腺素合成,又能阻止外周组织中的T₄转化为T₃的药物是

- [122] 正确答案.D
- [122] 难易度.易
- [122] 选项数.5
- [122] A.他巴唑

- [122] B.心得安
 - [122] C.甲亢平
 - [122] D.丙基硫氧嘧啶
 - [122] E.大剂量碘
-

[123] 题型.单选题

[123] 题干.慢性支气管炎并发阻塞性肺气肿的临床表现,主要是自原有症状的基础上又出现

- [123] 正确答案.B
 - [123] 难易度.易
 - [123] 选项数.5
 - [123] A.反复发热
 - [123] B.逐渐加重的呼吸困难
 - [123] C.剧烈咳嗽
 - [123] D.咳多量脓痰
 - [123] E.反复发绀
-

[124] 题型.单选题

[124] 题干.支气管哮喘长期反复发作,最常见的并发症是

- [124] 正确答案.D
 - [124] 难易度.易
 - [124] 选项数.5
 - [124] A.肺结核
 - [124] B.肺癌
 - [124] C.上呼吸道感染
 - [124] D.阻塞性肺气肿
 - [124] E.呼吸衰竭
-

[125] 题型.单选题

[125] 题干.对肺结核患者进行病情观察时,发现下列何种情况提示病

情较重,应加强护理

- [125] 正确答案.D
- [125] 难易度.易
- [125] 选项数.5
- [125] A.低热盗汗,颧部潮红
- [125] B.软弱疲乏,精神不振
- [125] C.食欲减退,体重减轻
- [125] D.高热不退,脉搏快速
- [125] E.胸闷不适,咳嗽咳痰

[126] 题型.单选题

[126] 题干.长期卧床的心源性水肿病人其水肿最早、最明显的部位在

- [126] 正确答案.C
- [126] 难易度.易
- [126] 选项数.5
- [126] A.眼睑
- [126] B.颜面部
- [126] C.腰骶部
- [126] D.足踝部
- [126] E.头枕部

[127] 题型.单选题

[127] 题干.关于室性期前收缩的心电图表现,下述错误的是

- [127] 正确答案.C
- [127] 难易度.易
- [127] 选项数.5
- [127] A.提前出现宽大畸形 QRS 波
- [127] B.T 波与 QRS 波主波方向相反
- [127] C.QRS 波群前、后可出现逆行的 P 波

- [127] D.代偿间歇完全
[127] E.QRS 波时限超过 0.12s

-
- [128] 题型.单选题
[128] 题干.高血压心脏病患者,出现下列哪项提示早期左心功能不全
[128] 正确答案.C
[128] 难易度.易
[128] 选项数.5
[128] A.心尖区Ⅲ级收缩期杂音
[128] B.左心室增大
[128] C.心尖区舒张早期奔马律
[128] D.室性早搏
[128] E.主动脉瓣区第二音亢进

-
- [129] 题型.单选题
[129] 题干.急性胰腺炎的预防措施重点为
[129] 正确答案.E
[129] 难易度.易
[129] 选项数.5
[129] A.应用阿托品类药物减少胰液分泌
[129] B.服用制酸剂减少胃酸
[129] C.应用硫唑嘌呤减少免疫反应
[129] D.应用抑肽酶制剂
[129] E.治疗胆道疾病,避免暴饮暴食及酗酒

-
- [130] 题型.单选题
[130] 题干.下列哪项不是门脉高压的表现
[130] 正确答案.E
[130] 难易度.易
[130] 选项数.5

- [130] A.腹水
 - [130] B.食管静脉曲张
 - [130] C.脾大
 - [130] D.腹壁静脉曲张
 - [130] E.蜘蛛痣,肝掌
-

[131] 题型.单选题

[131] 题干.尿毒症病人血肌酐明显增高,晨起时恶心、呕吐,为减轻晨间呕吐,有效的护理措施是

- [131] 正确答案.B
 - [131] 难易度.易
 - [131] 选项数.5
 - [131] A.加强晨间口腔护理
 - [131] B.睡前饮水 1~2 次
 - [131] C.优质低蛋白饮食
 - [131] D.控制进水量
 - [131] E.晨间生理盐水漱口
-

[132] 题型.单选题

[132] 题干.急性肾盂肾炎患者一般不会出现护理诊断是

- [132] 正确答案.C
 - [132] 难易度.易
 - [132] 选项数.5
 - [132] A.舒适改变
 - [132] B.体温异常
 - [132] C.体液过多
 - [132] D.缺乏知识
 - [132] E.焦虑
-

- [133] 题型.单选题
[133] 题干.再生障碍性贫血一般不出现
[133] 正确答案.B
[133] 难易度.易
[133] 选项数.5
[133] A.网织红细胞减少
[133] B.红细胞形态改变
[133] C.红细胞减少
[133] D.白细胞减少
[133] E.血小板减少
-

- [134] 题型.单选题
[134] 题干.甲亢患者应限制摄入的食物是
[134] 正确答案.A
[134] 难易度.易
[134] 选项数.5
[134] A.芹菜
[134] B.白糖
[134] C.鸡肉
[134] D.苹果
[134] E.西瓜
-

- [135] 题型.单选题
[135] 题干.系统性红斑狼疮病人不正确的皮肤护理方法是
[135] 正确答案.D
[135] 难易度.易
[135] 选项数.5
[135] A.常用清水清洗
[135] B.忌用碱性肥皂
[135] C.忌用化妆品

[135] D.每日用 50°C水局部湿敷

[135] E.注意遮阳

[136] 题型.单选题

[136] 题干.吉兰—巴雷综合征病人的首发症状是

[136] 正确答案.E

[136] 难易度.易

[136] 选项数.5

[136] A.面神经麻痹

[136] B.心律失常

[136] C.意识障碍

[136] D.肢体远端感觉异常

[136] E.四肢对称性无力

[137] 题型.单选题

[137] 题干.肢体能抬离床面,但不能对抗医生的阻力,肌力为

[137] 正确答案.C

[137] 难易度.易

[137] 选项数.5

[137] A.1 级

[137] B.2 级

[137] C.3 级

[137] D.4 级

[137] E.5 级

[138] 题型.单选题

[138] 题干.女性,35 岁,诊断为支气管哮喘 3 年,护士在给患者做健康宣教时,错误的是

[138] 正确答案.A

[138] 难易度.易

- [138] 选项数.5
- [138] A.告知患者哮喘可以根治,使其树立战胜疾病的信心
- [138] B.按照医嘱合理用药
- [138] C.正确使用定量吸入器吸入治疗
- [138] D.动员家人或好朋友参与哮喘患者管理
- [138] E.做到自我监测病情
-

[139] 题型.单选题

[139] 题干.患者男性,60岁,患有胃溃疡10年,突然感到剧烈腹痛,腹肌强直,有明显的压痛和反跳痛,此时病人最有可能的并发症是

[139] 正确答案.E

[139] 难易度.易

[139] 选项数.5

[139] A.出血

[139] B.癌变

[139] C.幽门梗阻

[139] D.肠道感染

[139] E.溃疡穿孔

[140] 题型.单选题

[140] 题干.患者男性,60岁,精神紧张后突然出现全身抽搐、口吐白沫,同时出现意识丧失,此时首要的急救的措施是

[140] 正确答案.E

[140] 难易度.易

[140] 选项数.5

[140] A.口对口人工呼吸

[140] B.闭胸心脏按压

[140] C.挤压简易呼吸器

[140] D.氧气吸入

[140] E.清除呼吸道异物和分泌物

[141] 题型.单选题
[141] 题干.中毒性肺炎最突出的表现为
[141] 正确答案.D
[141] 难易度.易
[141] 选项数.5
[141] A.发热胸痛
[141] B.咳痰气急
[141] C.恶心、呕吐
[141] D.低血压、少尿
[141] E.呼吸困难

[142] 题型.单选题
[142] 题干.呼吸衰竭病人如表现为头痛、昼眠夜醒、神志恍惚等,应考虑
[142] 正确答案.E
[142] 难易度.易
[142] 选项数.5
[142] A.呼吸性酸中毒
[142] B.休克早期
[142] C.窒息先兆
[142] D.颅内感染
[142] E.肺性脑病

[143] 题型.单选题
[143] 题干.支气管哮喘病人“清理呼吸道无效”的相关因素除外下列哪项
[143] 正确答案.C
[143] 难易度.易
[143] 选项数.5

- [143] A.气道炎症
 - [143] B.气管粘液栓形成
 - [143] C.频繁咳嗽
 - [143] D.失水、分泌物粘稠
 - [143] E.疲乏无力
-

- [144] 题型.单选题
 - [144] 题干.鉴别心源性哮喘与支气管哮喘的要点是
 - [144] 正确答案.C
 - [144] 难易度.易
 - [144] 选项数.5
 - [144] A.肺部哮鸣音
 - [144] B.呼气性呼吸困难
 - [144] C.咯粉红色泡沫样痰
 - [144] D.端坐呼吸
 - [144] E.紫绀
-

- [145] 题型.单选题
 - [145] 题干.急性心肌梗死起病后 24 小时内死亡的主要原因是
 - [145] 正确答案.D
 - [145] 难易度.易
 - [145] 选项数.5
 - [145] A.心力衰竭
 - [145] B.肺部感染
 - [145] C.急性肺水肿
 - [145] D.心律失常
 - [145] E.低血压休克
-

- [146] 题型.单选题
- [146] 题干.长期卧床的心力衰竭病人,形成下肢静脉血栓时,当下床

活动,易栓塞的脏器是

[146] 正确答案.C

[146] 难易度.易

[146] 选项数.5

[146] A.心脏

[146] B.脑组织

[146] C.肺组织

[146] D.肾脏

[146] E.脾脏

[147] 题型.单选题

[147] 题干.给肝性脑病患者灌肠时应避免用

[147] 正确答案.B

[147] 难易度.易

[147] 选项数.5

[147] A.生理盐水

[147] B.肥皂水

[147] C.石蜡油

[147] D.弱酸溶液

[147] E.新霉素液

[148] 题型.单选题

[148] 题干.溃疡性结肠炎首选的药物是

[148] 正确答案.B

[148] 难易度.易

[148] 选项数.5

[148] A.糖皮质激素

[148] B.柳氮磺胺吡啶

[148] C.免疫抑制剂

- [148] D.抗生素
[148] E.乳酸杆菌制剂
-

- [149] 题型.单选题
[149] 题干.尿毒症患者输注 5%NaHCO₃ 时,应特别注意观察
[149] 正确答案.C
[149] 难易度.易
[149] 选项数.5
[149] A.血压
[149] B.尿量
[149] C.四肢抽搐
[149] D.神志
[149] E.体温
-

- [150] 题型.单选题
[150] 题干.糖尿病酮症酸中毒昏迷患者经胰岛素治疗后意识恢复,之后突然感到心悸、饥饿、出汗,随即又意识不清,应立即
[150] 正确答案.D
[150] 难易度.易
[150] 选项数.5
[150] A.加大胰岛素剂量
[150] B.加用格列本脲
[150] C.静脉滴注碳酸氢钠
[150] D.测指尖血糖
[150] E.应用呼吸兴奋药
-

- [151] 题型.单选题
[151] 题干.系统性红斑狼疮患者最常见的死亡原因是
[151] 正确答案.C
[151] 难易度.易

- [151] 选项数.5
 - [151] A.心肌炎
 - [151] B.颅内高压
 - [151] C.尿毒症
 - [151] D.上消化道大出血
 - [151] E.胸膜炎
-

[152] 题型.单选题

[152] 题干.类风湿性关节炎的关节症状,与其它关节炎相比其具有特征性的是

- [152] 正确答案.C
 - [152] 难易度.易
 - [152] 选项数.5
 - [152] A.肿胀明显
 - [152] B.局部发热
 - [152] C.晨起僵硬
 - [152] D.疼痛明显
 - [152] E.关节发红
-

[153] 题型.单选题

[153] 题干.脑出血急性期的病人,定时翻身应注意的最主要的问题是

- [153] 正确答案.C
 - [153] 难易度.易
 - [153] 选项数.5
 - [153] A.动作轻柔
 - [153] B.保护关节
 - [153] C.防止牵动头部
 - [153] D.观察受压情况
 - [153] E.抬高下肢
-

[154] 题型.单选题

[154] 题干.格林-巴利综合征患者, 出现下列哪种情况表示病情危急

[154] 正确答案.B

[154] 难易度.易

[154] 选项数.5

[154] A.四肢由轻瘫转为全瘫

[154] B.呼吸费力

[154] C.腱反射完全消失

[154] D.腰腿出现牵拉性疼痛

[154] E.脉搏快速

[155] 题型.单选题

[155] 题干.患者男性,75 岁,患冠心病全心衰,治疗期间出现恶心、视力模糊、黄绿视,应及时向医生报告,并考虑原因是

[155] 正确答案.E

[155] 难易度.易

[155] 选项数.5

[155] A.心力衰竭加重,胃肠道淤血

[155] B.脑血管意外

[155] C.扩血管药物引起的低血压

[155] D.利尿药物引起的电解质紊乱

[155] E.洋地黄药物中毒

[156] 题型.单选题

[156] 题干.患者女性,22 岁,急性白血病住院 1 周后,护士在夜间巡视病区时,发现患者突然出现烦躁不安、呕吐,此时护士应立即采取的措施是

[156] 正确答案.B

[156] 难易度.易

[156] 选项数.5

- [156] A.高流量吸氧
- [156] B.通知医生,备齐抢救物品
- [156] C.镇静、止吐
- [156] D.补液输血
- [156] E.给予止血药物

[157] 题型.单选题

[157] 题干.病人,女,39岁.患类风湿性关节炎7年,现关节肿痛已减轻,但两肘、指关节呈屈曲畸形,并有消瘦、失眠、乏力,该病人最主要的护理诊断是

- [157] 正确答案.A
- [157] 难易度.易
- [157] 选项数.5
- [157] A.自理能力下降
- [157] B.慢性疼痛
- [157] C.自我形象紊乱
- [157] D.睡眠型态紊乱
- [157] E.活动无耐力

[158] 题型.单选题

[158] 题干.患者,45岁,因剧烈头痛3h,病人主诉“头痛是一生中最剧烈的疼痛”,检查腰穿结果为脑积液为血性,诊断为蛛网膜下腔出血入院。病人的卧床时间应该为

- [158] 正确答案.D
- [158] 难易度.易
- [158] 选项数.5
- [158] A.1周
- [158] B.2周
- [158] C.3周

[158] D.4-6周

[158] E.3-4个月

[159] 题型.单选题

[159] 题干.患者,45岁,因剧烈头痛3h,病人主诉“头痛是一生中最剧烈的疼痛”,检查腰穿结果为脑积液为血性,诊断为蛛网膜下腔出血入院。蛛网膜下腔出血的最常见的病因

[159] 正确答案.C

[159] 难易度.易

[159] 选项数.5

[159] A.高血压

[159] B.冠心病

[159] C.动脉瘤

[159] D.动静脉畸形

[159] E.脑血管炎

[160] 题型.单选题

[160] 题干.类风湿关节炎关节表现的基本病理改变是_____。

[160] 正确答案.A

[160] 难易度.易

[160] 选项数.5

[160] A.关节滑膜炎

[160] B.血管炎

[160] C.周围神经病变

[160] D.骨质增生

[160] E.软骨增生

[161] 题型.单选题

[161] 题干.类风湿关节炎应用非甾体类消炎止痛药的机制是_____。

- [161] 正确答案.B
- [161] 难易度.易
- [161] 选项数.5
- [161] A.抑制滑膜炎
- [161] B.抑制体内前列腺素的合成
- [161] C.抑制 T 细胞功能
- [161] D.抑制 B 细胞功能
- [161] E.抑制细胞内二氢叶酸还原酶
-

[162] 题型.单选题

[162] 题干.患者男性,60 岁。有关节炎 2 年,初期为腕掌指关节疼痛,后有膝关节疼痛,最近两手指在掌指关节处偏向尺侧形成关节活动障碍,影响患者的日常生活,经查 C 反应蛋白升高,说明目前疾病处在_____。

- [162] 正确答案.C
- [162] 难易度.易
- [162] 选项数.4
- [162] A.康复期
- [162] B.稳定期
- [162] C.活动期
- [162] D.缓解期
-

[163] 题型.单选题

[163] 题干.某类风湿关节炎病人近几天来手、足及膝关节肿胀,疼痛加重,活动后疼痛减轻,伴有食欲不振,乏力等不适。缓解期间,指导病人活动的目的是_____。

- [163] 正确答案.E
- [163] 难易度.易
- [163] 选项数.5
- [163] A.防止疾病复发
- [163] B.保持关节功能位

- [163] C.防止关节畸形
- [163] D.减少晨僵发生
- [163] E.避免关节失用

[164] 题型.单选题

[164] 题干.张先生, 50 岁, 6 年前诊断为类风湿性关节炎。近日出现外周小关节肿痛、晨僵。该患者目前的护理措施错误的是

- [164] 正确答案.D
- [164] 难易度.易
- [164] 选项数.4
- [164] A.注意保暖
- [164] B.避免关节受压
- [164] C.关节肿痛时卧床休息
- [164] D.加强受累关节锻炼

[165] 题型.单选题

[165] 题干.患者女性,15 岁,学生。主因双肘、腕、手指近端指间关节肿痛 3 年,加重 2 个月,以类风湿关节炎收入院。经休息、药物治疗后,现在病情缓解,下一步最主要的护理是

- [165] 正确答案.B
- [165] 难易度.易
- [165] 选项数.5
- [165] A.嘱患者卧床休息,避免疲劳
- [165] B.指导患者进行功能锻炼,要循序渐进
- [165] C.向患者做饮食指导,增进营养
- [165] D.向患者介绍如何观察药物疗效
- [165] E.介绍预防药物不良反应的方法

[166] 题型.单选题

[166] 题干.晨僵在哪类关节炎中表现最为突出

- [166] 正确答案.B
[166] 难易度.易
[166] 选项数.4
[166] A.退行性骨关节炎
[166] B.风湿性关节炎
[166] C.类风湿关节炎.
[166] D.强直性脊柱炎
-

- [167] 题型.单选题
[167] 题干.类风湿关节炎最常侵犯的关节是
[167] 正确答案.B
[167] 难易度.易
[167] 选项数.5
[167] A.肘关节
[167] B.四肢小关节
[167] C.髋关节
[167] D.肩关节
[167] E.膝关节
-

- [168] 题型.单选题
[168] 题干.下列类风湿关节炎病人活动期关节护理的措施中,哪项是错误的
[168] 正确答案.D
[168] 难易度.易
[168] 选项数.5
[168] A.卧床休息,避免劳累
[168] B.足底放置足板,防止足下垂
[168] C.保持关节功能位
[168] D.四肢关节应保持伸直位
[168] E.注意关节保暖

[169] 题型.单选题
[169] 题干.诊断系统性红斑狼疮特异性最高的是
[169] 正确答案.B
[169] 难易度.易
[169] 选项数.5
[169] A.抗核抗体(ANA)
[169] B.抗 Sm 抗体
[169] C.抗双链 DNA 抗体
[169] D.C 反应蛋白
[169] E.血红蛋白

[170] 题型.单选题
[170] 题干.下列哪项不是风湿病的共同特点
[170] 正确答案.B
[170] 难易度.易
[170] 选项数.5
[170] A.同一疾病表现可有很大个体差异
[170] B.病程多呈急性
[170] C.多有复杂的免疫学改变
[170] D.病程可有发作与缓解相交替
[170] E.可累及多器官、多系统

[171] 题型.单选题
[171] 题干.系统性红斑狼疮患者应忌食
[171] 正确答案.E
[171] 难易度.易
[171] 选项数.5
[171] A.豆制品
[171] B.鸡蛋

- [171] C.牛奶
- [171] D.动物内脏
- [171] E.芹菜

[172] 题型.单选题

[172] 题干.邢女士,22岁,患“系统性红斑狼疮”2年,鼻梁及面颊两侧呈蝶形水肿性红斑。不正确的护理措施是_____。

[172] 正确答案.C

[172] 难易度.易

[172] 选项数.5

[172] A.病人床位安置在没有阳光直射的地方

[172] B.外出穿长袖衣裤,打伞遮阳

[172] C.适当使用化妆品掩饰红斑

[172] D.忌用碱性肥皂清洗面部

[172] E.避免服用普鲁卡因酰胺等药物

[173] 题型.单选题

[173] 题干.某患者,女性,30岁。因患系统性红斑狼疮两次住院。本次住院面部红斑明显,有少许鳞屑,尿常规阴性,肾功能正常,血抗核抗体阳性,抗双链DNA抗体阳性。诊断本病最有意义的实验室检查是_____。

[173] 正确答案.D

[173] 难易度.易

[173] 选项数.5

[173] A.血沉增快

[173] B.免疫球蛋白增高

[173] C.抗核抗体阳性

[173] D.抗双链DNA抗体阳性

[173] E.狼疮细胞现象阳性

[174] 题型.单选题

[174] 题干.患者女性,33岁。有系统性红斑狼疮5年,一直服用药物治疗,最近主诉视力下降,可能因为服用了_____。

[174] 正确答案.C

[174] 难易度.易

[174] 选项数.5

[174] A.阿司匹林

[174] B.吲哚美辛

[174] C.羟氯喹

[174] D.布洛芬

[174] E.地塞米松

[175] 题型.单选题

[175] 题干.患者女性,28岁,因全身关节痛,面部蝶形红斑,查血抗体,确诊为SLE,健康教育的重点是避免日光直射,原因是_____。

[175] 正确答案.B

[175] 难易度.易

[175] 选项数.5

[175] A.紫外线可致雌激素作用增强

[175] B.紫外线是本病的重要诱因

[175] C.紫外线直接破坏细胞

[175] D.紫外线加重关节滑膜炎

[175] E.紫外线直接损害骨髓

[176] 题型.单选题

[176] 题干.系统性红斑狼疮皮肤损害常见于_____。

[176] 正确答案.E

[176] 难易度.易

[176] 选项数.5

[176] A.胸部

- [176] B.背部
 - [176] C.腹部
 - [176] D.下肢
 - [176] E.暴露部位
-

- [177] 题型.单选题
 - [177] 题干.系统性红斑狼疮最常见的死亡原因是
 - [177] 正确答案.A
 - [177] 难易度.易
 - [177] 选项数.5
 - [177] A.尿毒症
 - [177] B.胸膜炎
 - [177] C.颅内高压
 - [177] D.心肌炎
 - [177] E.上消化道大出血
-

- [178] 题型.单选题
 - [178] 题干.系统性红斑狼疮患者皮肤护理哪项是错误的
 - [178] 正确答案.E
 - [178] 难易度.易
 - [178] 选项数.5
 - [178] A.常用清水清洗
 - [178] B.忌用碱性皂液
 - [178] C.忌用化妆品
 - [178] D.避免阳光照射
 - [178] E.10°C冷水湿敷
-

- [179] 题型.单选题
- [179] 题干.某系统性红斑狼疮女病人,病史 2 年,近日体温升高,关节红肿有压痛,出现面部红斑、蛋白尿而入院治疗。以下不符合 SLE 的护

理要求的是

- [179] 正确答案.B
- [179] 难易度.易
- [179] 选项数.5
- [179] A.床单位清洁干燥
- [179] B.床单位阳光充足
- [179] C.病室空气流通
- [179] D.病室内温度 18°C~20°C
- [179] E.病室内湿度 50%~60%

[180] 题型.单选题

[180] 题干.患者女性,20岁,1周前因睡眠不好,服用氯丙嗪,出现乏力、发热,体温 38°C,面部蝶形红斑,Sm 抗体阳性,抗双链 DNA 抗体阳性,查患者口腔有白色点状物质,考虑真菌感染,需进行口腔护理,可选用哪种漱口液

- [180] 正确答案.A
- [180] 难易度.易
- [180] 选项数.5
- [180] A.1%~4%碳酸氢钠溶液
- [180] B.2%~3%硼酸溶液
- [180] C.1%~3%过氧化氢溶液
- [180] D.0.1%醋酸溶液
- [180] E.0.08%甲硝唑溶液

[181] 题型.单选题

[181] 题干.患者女性,25岁,面部有蝶形红斑,严重关节疼痛,最近查 Hb90g/L。乏力,Sm 抗体阳性,抗双链 DNA 抗体阳性,需要首先解决的护理问题是

- [181] 正确答案.B
- [181] 难易度.易

- [181] 选项数.5
- [181] A.乏力
- [181] B.疼痛
- [181] C.皮肤完整性受损
- [181] D.有感染的危险
- [181] E.营养失调

[182] 题型.单选题

[182] 题干.患者女性,35岁,面部有严重的蝶形红斑,关节疼痛,最近查出尿毒症,患者情绪低落,对治疗与护理不配合。当前最重要的护理措施是

- [182] 正确答案.C
- [182] 难易度.易
- [182] 选项数.5
- [182] A.禁止日光浴
- [182] B.清水洗脸
- [182] C.心理疏导,增强战胜疾病信心
- [182] D.高蛋白饮食
- [182] E.告知患者疾病的诱因

[183] 题型.单选题

[183] 题干.癫痫强直阵挛发作呈持续状态时,最重要的护理措施是_____。

- [183] 正确答案.E
- [183] 难易度.易
- [183] 选项数.5
- [183] A.注意保暖
- [183] B.吸氧 3~5L/min
- [183] C.防止跌伤

[183] D.防止继发感染

[183] E.保持呼吸道通畅

[184] 题型.单选题

[184] 题干.某癫痫病人经治疗后症状控制,准备出院,对其健康指导以下错误的是_____。

[184] 正确答案.B

[184] 难易度.易

[184] 选项数.5

[184] A.戒烟酒

[184] B.可参加体力活动,如游泳

[184] C.要坚持服药 3~5 年

[184] D.定期检查肝功能

[184] E.介绍本病的基本知识

[185] 题型.单选题

[185] 题干.对癫痫病人进行健康教育计划的内容,哪项错误_____。

[185] 正确答案.A

[185] 难易度.易

[185] 选项数.5

[185] A.开车要有人陪同

[185] B.适当参加脑力活动

[185] C.禁用神经兴奋剂

[185] D.游泳有危险

[185] E.需长期正规用药

[186] 题型.单选题

[186] 题干.诊断癫痫的主要依据是_____。

[186] 正确答案.E

- [186] 难度度.易
 - [186] 选项数.5
 - [186] A.体格检查
 - [186] B.头颅 X 线片
 - [186] C.脑 CT、MRI
 - [186] D.脑脊液检查
 - [186] E.病史和脑电图
-

- [187] 题型.单选题
 - [187] 题干.强直阵挛性发作的主要临床特征是_____。
 - [187] 正确答案.C
 - [187] 难度度.易
 - [187] 选项数.5
 - [187] A.发作性头痛
 - [187] B.发作性意识障碍
 - [187] C.发作性强直-阵挛及意识障碍
 - [187] D.发作性多动
 - [187] E.发作性偏瘫
-

- [188] 题型.单选题
- [188] 题干.癫痫大发作患者在完全控制发作后应再持续用药_____。
- [188] 正确答案.C
- [188] 难度度.易
- [188] 选项数.5
- [188] A.半年
- [188] B.1~2 年
- [188] C.4~5 年
- [188] D.6~7 年
- [188] E.8 年

[189] 题型.单选题

[189] 题干.患者,女性,38岁。无任何诱因突发四肢抽搐,呼吸急促、面色发绀、两眼上翻、口吐白沫、呼之不应。急诊就医时,再次发作,此时不正确的做法是_____。

[189] 正确答案.D

[189] 难易度.易

[189] 选项数.5

[189] A.解开衣领

[189] B.将患者的头部侧向一边

[189] C.使用牙垫或压舌板

[189] D.按压患者的肢体以制止抽搐

[189] E.床旁加床档

[190] 题型.单选题

[190] 题干.患者,男性,29岁。因突然发作性全身抽搐,口吐白沫,大小便失禁入院,既往有癫痫病史。针对患者进行健康教育指导,叙述错误的是_____。

[190] 正确答案.C

[190] 答案解析.C

11 患儿,男,9岁,做作业时,突然中断,发呆,手中铅笔落地,约10秒后又能继续做作业,近来连续发作,一周内发作4次,但每次发作均无记忆,最可能的诊断是_____。

A. 癫痫失神发作

B. 肌阵挛发作

C. 无张力发作

D. 癫痫精神运动性发作

E. 癫痫单纯部分性发作 A

[190] 难易度.易

- [190] 选项数.5
- [190] A.生活有规律,劳逸结合
- [190] B.不能从事攀高、驾驶等工作
- [190] C.癫痫停止发作 3 个月后及时停药
- [190] D.随身携带有患者姓名、住址、联系电话的个人卡片
- [190] E.定期复查血常规、肝肾功能
-

[191] 题型.单选题

[191] 题干.患者男性,28 岁,原有癫痫大发作史,今晨起有多次抽搐发作。间歇期意识模糊,两便失禁,中午来院急诊,紧急处理措施是_____。

- [191] 正确答案.B
- [191] 难易度.易
- [191] 选项数.5
- [191] A.鼻饲抗癫痫药
- [191] B.静脉推注地西洋
- [191] C.肌注苯巴比妥
- [191] D.0.1%水和氯醛保留灌肠
- [191] E.20%甘露醇静脉滴注
-

[192] 题型.单选题

[192] 题干.上消化大量出血后多数病人会出现发热,其原因是

- [192] 正确答案.B
- [192] 难易度.易
- [192] 选项数.5
- [192] A.肠道内积血
- [192] B.循环血量减少,导致体温调节中枢功能障碍
- [192] C.感染
- [192] D.血尿素氮升高
- [192] E.机体抵抗力减弱

[193] 题型.单选题

[193] 题干.下列哪项表明上消化道出血已停止()

[193] 正确答案.E

[193] 难易度.易

[193] 选项数.5

[193] A.听诊肠鸣音 10~12 次/分

[193] B.黑便次数增多,粪质稀薄

[193] C.血红蛋白测定下降

[193] D.尿量正常,血尿素氮持续增高

[193] E.网织红细胞下降

[194] 题型.单选题

[194] 题干.留置三腔二囊管的病人突然出现呼吸困难和发绀,此时首要的护理措施是()

[194] 正确答案.D

[194] 难易度.易

[194] 选项数.5

[194] A.给予吸氧

[194] B.给予吸痰

[194] C.扶病人坐起

[194] D.将气囊放气并拔管

[194] E.将气囊管再插入 20cm

[195] 题型.单选题

[195] 题干.李先生有消化性溃疡病史多年,昨夜开始出现呕血和排黑便多次,今晨家人发现其神情恍惚、四肢厥冷而送入院。依据病人的临床表现,提示其出血量至少为()

[195] 正确答案.D

[195] 难易度.易

- [195] 选项数.5
[195] A.300ml
[195] B.500ml
[195] C.800ml
[195] D.1000ml
[195] E.2000ml
-

[196] 题型.单选题

[196] 题干.李先生有消化性溃疡病史多年,昨夜开始出现呕血和排黑便多次,今晨家人发现其神情恍惚、四肢厥冷而送入院。以下护理诊断应优先考虑()

- [196] 正确答案.E
[196] 答案解析.E

患者男性,52岁,因上消化道出血使用三腔二囊管为其止血。压迫3天后出血停止,考虑拔管。此时需留管应再观察()

- A.6小时
B.8小时
C.12小时
D.24小时
E.48小时 D

患者男,45岁。肝硬化门静脉高压症伴上消化道出血入院。给予三腔管压迫止血12小时后出血停止。患者主诉三腔管刺激不适,要求拔除,护士的做法错误的是()

- A.加强与患者沟通,安抚患者情绪
B.嘱其听音乐,高8? ? 喘?1第03讲

- [196] 难易度.易
[196] 选项数.5
[196] A.急性意识障碍

- [196] B.潜在并发症:血容量不足
 - [196] C.疼痛
 - [196] D.心输出量减少
 - [196] E.体液不足
-

[197] 题型.单选题

[197] 题干.急性胰腺炎的最主要和首发的临床表现___。

[197] 正确答案.A

[197] 难易度.易

[197] 选项数.5

[197] A.突然发生的腹痛

[197] B.腹胀

[197] C.低血压

[197] D.发热

[197] E.恶心呕吐

[198] 题型.单选题

[198] 题干.急性胰腺炎病人禁用的药物为___。

[198] 正确答案.A

[198] 难易度.易

[198] 选项数.5

[198] A.吗啡

[198] B.西咪替丁

[198] C.生长抑素

[198] D.杜冷丁

[198] E.阿托品

[199] 题型.单选题

[199] 题干.下列哪项不是急性胰腺炎的体征___。

[199] 正确答案.D

- [199] 难易度.易
[199] 选项数.5
[199] A.上腹或全腹压痛明显
[199] B.腹肌紧张
[199] C.反跳痛
[199] D.肝浊音界消失
[199] E.肠鸣音减弱或消失
-

- [200] 题型.单选题
[200] 题干.关于急性胰腺炎叙述不正确的是__。
[200] 正确答案.B
[200] 难易度.易
[200] 选项数.5
[200] A.腹痛常为首发症状
[200] B.常恶心呕吐,呕吐后腹痛即减轻
[200] C.多数患者出现中度以上发热
[200] D.部分患者出现一过性黄疸
[200] E.病情的严重性与淀粉酶升高的程度不一致
-

- [201] 题型.单选题
[201] 题干.下列哪项可以判断急性坏死型胰腺炎预后不佳__。
[201] 正确答案.D
[201] 难易度.易
[201] 选项数.5
[201] A.急性胰腺炎
[201] B.休克
[201] C.高热
[201] D.低钙抽搐
[201] E.代谢性酸中毒
-

[202] 题型.单选题

[202] 题干.一腹痛 10 小时患者赶至急诊,下列哪一项检查有助于急性胰腺炎的诊断__。

[202] 正确答案.A

[202] 难易度.易

[202] 选项数.5

[202] A.血淀粉酶

[202] B.血脂肪酶

[202] C.血糖

[202] D.血钙

[202] E.C-反应蛋白

[203] 题型.单选题

[203] 题干.一腹痛 3 天的患者来就诊,怀疑是急性胰腺炎,下列哪一项检查有助于诊断__。

[203] 正确答案.B

[203] 难易度.易

[203] 选项数.5

[203] A.血淀粉酶

[203] B.血脂肪酶

[203] C.血糖

[203] D.血钙

[203] E.C-反应蛋白

[204] 题型.单选题

[204] 题干.轻症急性胰腺炎最基本的治疗方法__。

[204] 正确答案.B

[204] 难易度.易

[204] 选项数.5

[204] A.手术治疗

- [204] B.禁食补液
 - [204] C.抗生素
 - [204] D.抑肽酶
 - [204] E.糖皮质激素
-

[205] 题型.单选题

[205] 题干.急性胰腺炎患者禁食,胃肠减压的主要目的__。

[205] 正确答案.B

[205] 难易度.易

[205] 选项数.5

[205] A.防止感染

[205] B.减少胰液分泌

[205] C.减轻腹痛

[205] D.减少胃酸分泌

[205] E.避免胃扩张

[206] 题型.单选题

[206] 题干.急性胰腺炎患者,为减轻疼痛,可协助其采取的卧位是

[206] 正确答案.C

[206] 难易度.易

[206] 选项数.5

[206] A.去枕平卧

[206] B.俯卧

[206] C.屈膝侧卧

[206] D.头低脚高

[206] E.半坐卧位

[207] 题型.单选题

[207] 题干.下面关于急性胰腺炎胰酶变化的叙述不正确的是

[207] 正确答案.D

- [207] 难易度.易
- [207] 选项数.5
- [207] A.血清淀粉酶在发病后 2~12h 开始升高,48h 下降
- [207] B.血清脂肪酶较淀粉酶升高晚
- [207] C.尿淀粉酶在发病 12~14h 开始升高,持续 1~2 周
- [207] D.淀粉酶越高,病变越重
- [207] E.尿淀粉酶的值可受尿量的影响
-

[208] 题型.单选题

[208] 题干.男,38 岁。大量饮酒后出现上腹部持续性剧痛并向左肩、腰背部放射,伴恶心呕吐、血清淀粉酶升高。治疗中要求患者禁食的目的是

- [208] 正确答案.A
- [208] 难易度.易
- [208] 选项数.5
- [208] A.减少胰液分泌
- [208] B.防止出血
- [208] C.解除胰管痉挛
- [208] D.减轻胰管水肿
- [208] E.控制饮食
-

[209] 题型.单选题

[209] 题干.女,56 岁。因急性型胰腺炎入院,病情已趋稳定,给予非手术治疗,目前患者禁食 3 天,血淀粉酶正常,腹痛、呕吐基本缓解,此时宜进的饮食是

- [209] 正确答案.B
- [209] 难易度.易
- [209] 选项数.5
- [209] A.普食
- [209] B.低脂半流质

- [209] C.低脂流质
- [209] D.高糖高蛋白流质
- [209] E.软食

[210] 题型.单选题

[210] 题干.患者,男性,38岁。与朋友聚餐大量饮酒、吃肉后出现上腹持续性刀割样疼痛,阵发性加剧,伴恶心呕吐,发热,体温 38.5°C,急查血,血清淀粉酶超过正常值 4 倍,诊断为急性胰腺炎。急诊收入院后,护士收集的患者资料中与急性胰腺炎的发病有关的是

- [210] 正确答案.C
- [210] 难易度.易
- [210] 选项数.5
- [210] A.父母双方均有高血压病史
- [210] B.睡眠欠佳
- [210] C.有胆绞痛史
- [210] D.19 岁时曾患甲型肝炎
- [210] E.青霉素过敏史

[211] 题型.单选题

[211] 题干.患者女性,56岁,有胆石症病史 15 年。上腹部剧痛 4 小时,呕吐 3 次,呕吐物中有胆汁。急诊入院,查血白细胞 $2 \times 10^9/L$,中性粒细胞 0.8,怀疑为急性胰腺炎。护士应严密观察的项目不包括

- [211] 正确答案.E
- [211] 难易度.易
- [211] 选项数.5
- [211] A.生命体征
- [211] B.神志变化
- [211] C.C.24 小时出入量
- [211] D.血、尿淀粉酶
- [211] E.大便隐血试验

[212] 题型.单选题

[212] 题干.患者男性,36岁,饱食后突感上腹部剧痛,迅即扩展至全腹,伴恶心、呕吐,呕吐后腹痛无减轻,发病2小时后来院急诊。体检:痛苦貌,体温38°C,血压85/50mmHg,P124次/分钟,全腹肌紧张,压痛、反跳痛,肠鸣音消失,白细胞 $16 \times 10^9/L$,中性粒细胞比例0.90,既往身体健康,无消化性溃疡史、有胆石症病史。该患者目前首优的护理诊断是

[212] 正确答案.B

[212] 难易度.易

[212] 选项数.5

[212] A.体液过多

[212] B.体液不足

[212] C.急性疼痛

[212] D.个人应对无效

[212] E.焦虑、恐惧

[213] 题型.单选题

[213] 题干.男性,36岁,饱食后突感上腹部剧痛,迅即扩展至全腹,伴恶心、呕吐,呕吐后腹痛无减轻,发病2小时后来院急诊。体检:痛苦貌,血压85/50mmHg,P124次/分钟,全腹肌紧张,压痛、反跳痛,肠鸣音消失,白细胞 $16 \times 10^9/L$,中性粒细胞比例0.90,既往身体健康,无消化性溃疡史、有胆石症病史。若诊断明确,最先采取的措施是

[213] 正确答案.A

[213] 难易度.易

[213] 选项数.5

[213] A.禁食、胃肠减压、抗休克同时完善各项术前准备

[213] B.密切观察病情变化

[213] C.积极抗休克治疗,暂不宜手术

[213] D.积极抗感染治疗

[213] E.解痉镇痛治疗

[214] 题型.单选题

[214] 题干.急性白血病发生贫血的最主要因素是_____。

[214] 正确答案.B

[214] 难易度.易

[214] 选项数.5

[214] A.脾脏肿大,破坏红细胞过多

[214] B.骨髓造血受白血病细胞干扰

[214] C.化疗后胃肠功能紊乱,营养缺乏

[214] D.红细胞寿命缩短

[214] E.产生抗红细胞抗体

[215] 题型.单选题

[215] 题干.急性白血病引起出血的最主要因素是_____。

[215] 正确答案.C

[215] 难易度.易

[215] 选项数.4

[215] A.纤溶亢进

[215] B.白血病细胞浸润血管

[215] C.血小板生成减少

[215] D.弥散性血管内凝血

[216] 题型.单选题

[216] 题干.最易发生 DIC 的白血病是_____。

[216] 正确答案.D

[216] 难易度.易

[216] 选项数.5

[216] A.AML-M1

[216] B.ALL-L2

[216] C.AML-M5

[216] D.AML-M3

[216] E.CML

[217] 题型.单选题

[217] 题干.急性白血病最常见的感染部位是_____。

[217] 正确答案.C

[217] 难易度.易

[217] 选项数.5

[217] A.肺部感染

[217] B.肛周炎

[217] C.口腔炎

[217] D.败血症

[217] E.尿路感染

[218] 题型.单选题

[218] 题干.患者女,28岁,诊断为急性白血病,经治疗后症状体征消失,外周血象无幼稚细胞,出院回家疗养,近日头晕、有呕吐、感觉视物不清、偶有抽搐。首先要考虑的情况是_____。

[218] 正确答案.D

[218] 难易度.易

[218] 选项数.5

[218] A.脑栓塞

[218] B.颅内出血

[218] C.脑血管痉挛

[218] D.中枢神经系统白血病

[218] E.脑血栓形成

[219] 题型.单选题

[219] 题干.急性白血病病人缓解期出现中枢神经系统白血病的主要原因是_____。

- [219] 正确答案.C
- [219] 难易度.易
- [219] 选项数.4
- [219] A.进入脑组织的白血病细胞对化疗药耐受
- [219] B.化疗方案不彻底,不能杀死白血病细胞
- [219] C.多数化疗药物不能透过血脑屏障
- [219] D.化疗不够早,白血病细胞大量繁殖
-

[220] 题型.单选题

[220] 题干.患者女,21岁,诊断为急性白血病,红细胞 $2.2 \times 10^{12}/L$,白细胞 $18 \times 10^9/L$,血小板 $12 \times 10^9/L$,因家庭经济条件不好,欲放弃治疗,与家属争执过程中,突发剧烈头痛,呕吐,视物不清,左侧肢体活动障碍。请问该患者最可能发生了什么_____。

- [220] 正确答案.A
- [220] 难易度.易
- [220] 选项数.5
- [220] A.颅内出血
- [220] B.脑血栓形成
- [220] C.血栓脱落导致脑栓塞
- [220] D.脑血管痉挛
- [220] E.脑膜炎
-

[221] 题型.单选题

[221] 题干.患儿,7岁。因发热2天、鼻腔牙龈出血1天入院。经诊断为急性淋巴细胞白血病。化疗期间给予别嘌醇治疗,护士向患者解释该药的作用是_____。

- [221] 正确答案.D
- [221] 难易度.易
- [221] 选项数.5
- [221] A.减少血细胞的破坏

- [221] B.降低白细胞
 - [221] C.预防原症状复发
 - [221] D.预防尿酸性肾病
 - [221] E.预防免疫疾病
-

[222] 题型.单选题

[222] 题干.某急性白血病患者,化疗后 1 周出现高热,已用抗生素治疗 5 天,今检查病人口腔,发现舌面及上腭有白色膜状物,用棉签拭去附着物,可见创面有轻微出血,该病人口腔改变可能是_____。

[222] 正确答案.C

[222] 难易度.易

[222] 选项数.4

[222] A.细菌感染

[222] B.凝血功能障碍

[222] C.真菌感染

[222] D.维生素缺乏

[223] 题型.单选题

[223] 题干.某急性白血病患者在化疗期,24 小时尿量为 1000ml,此时需采取的护理措施是_____。

[223] 正确答案.A

[223] 难易度.易

[223] 选项数.5

[223] A.嘱患者多饮水,每日尿量大于 2000ml,必要时遵医嘱输液

[223] B.让病人听流水声诱导排尿

[223] C.记录出入量

[223] D.留置导尿管

[223] E.观察生命体征

[224] 题型.单选题

[224] 题干.白血病初诊患者,白细胞为 $56 \times 10^9/L$,今日行第 1 次化疗,下列护理措施中哪项为最需要关注的_____。

[224] 正确答案.D

[224] 难易度.易

[224] 选项数.5

[224] A.正确使用止吐药

[224] B.心理护理

[224] C.预防感染

[224] D.充分水化、碱化,预防尿酸性肾病

[224] E.预防出血

[225] 题型.单选题

[225] 题干.者女性,36 岁,诊断为特发性血小板减少性紫癜,入院后告知患者禁用的药物是

[225] 正确答案.B

[225] 难易度.易

[225] 选项数.5

[225] A.泼尼松

[225] B.阿司匹林

[225] C.红霉素

[225] D.阿莫西林

[225] E.地西洋

[226] 题型.单选题

[226] 题干.患者男性,50 岁,以特发性血小板减少性紫癜收入院,最常见的出血部位为

[226] 正确答案.A

[226] 难易度.易

[226] 选项数.5

- [226] A.皮肤黏膜
- [226] B.消化道
- [226] C.泌尿道
- [226] D.生殖道
- [226] E.颅内

[227] 题型.单选题

[227] 题干.患者女性,30岁。1年多来反复发生双下肢瘀斑,月经量增多。血红蛋白 90g/L,红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$,血小板 $50 \times 10^9/L$ 。既往身体健康。初步诊断“慢性型特发性血小板减少性紫癜”。治疗时应首选

- [227] 正确答案.A
- [227] 难易度.易
- [227] 选项数.5
- [227] A.糖皮质激素
- [227] B.脾切除
- [227] C.血浆置换
- [227] D.大剂量丙种球蛋白
- [227] E.静脉输注血小板悬液

[228] 题型.单选题

[228] 题干.患者女性,30岁。1年多来反复发生双下肢瘀斑,月经量增多。血红蛋白 90g/L,红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$,血小板 $50 \times 10^9/L$ 。既往身体健康。初步诊断“慢性型特发性血小板减少性紫癜”。与目前病情不符的护理诊断或合作性问题是

- [228] 正确答案.E
- [228] 难易度.易
- [228] 选项数.5
- [228] A.组织完整性受损
- [228] B.有受伤的危险

- [228] C.有感染的危险
- [228] D.知识缺乏
- [228] E.潜在并发症:颅内出血

[229] 题型.单选题

[229] 题干.对特发性血小板减少性紫癜急性型临床特征,叙述不正确的是

[229] 正确答案.E

[229] 难易度.易

[229] 选项数.5

[229] A.起病急

[229] B.常有畏寒发热

[229] C.全身广泛出血

[229] D.血小板多在 $20 \times 10^9/L$ 以下

[229] E.骨髓象巨核细胞数减少

[230] 题型.单选题

[230] 题干.某女青年反复出现皮肤瘀点,并有鼻衄、月经过多,近来出现贫血、脾大,血小板 $30 \times 10^9/L$,错误的护理措施是

[230] 正确答案.D

[230] 难易度.易

[230] 选项数.5

[230] A.适当限制活动

[230] B.预防各种创伤

[230] C.尽量减少肌肉注射

[230] D.鼻腔内血痂应剥去

[230] E.高蛋白、高维生素低渣饮食

[231] 题型.单选题

[231] 题干.慢性支气管炎最突出的症状是_____。 正确答案:()

- [231] 正确答案.B
[231] 难易度.易
[231] 选项数.5
[231] A.少量咯血
[231] B.长期反复咳嗽
[231] C.反复咳脓性痰
[231] D.逐渐加重的呼吸困难
[231] E.活动后喘息
-

[232] 题型.单选题

[232] 题干.慢性支气管炎合并肺气肿的主要临床表现是_____。

正确答案:()

- [232] 正确答案.D
[232] 难易度.易
[232] 选项数.5
[232] A.心悸
[232] B.疲乏
[232] C.突然发作呼吸困难
[232] D.逐渐加重的呼吸困难
[232] E.咳粉红色痰
-

[233] 题型.单选题

[233] 题干.男性.69岁。反复咳嗽、咳痰20年,活动后气短10余年。动脉血气分析示 PaO₂ 50mmHg,PaCO₂ 45mmHg)。能够延长该患者寿命,防止肺动脉高压发展最有效的家庭治疗是_____。 正确答案:()

- [233] 正确答案.D
[233] 难易度.易
[233] 选项数.5
[233] A.抗生素控制感染

- [233] B.支气管扩张剂治疗
- [233] C.吸入激素
- [233] D.长期家庭氧疗
- [233] E.呼吸肌锻炼

[234] 题型.单选题

[234] 题干.慢性呼吸衰竭并发肺性脑病,不宜吸高浓度氧的主要原因是_____。 正确答案:()

[234] 正确答案.C

[234] 难易度.易

[234] 选项数.5

[234] A.防止引起氧中毒

[234] B.缺氧不是主要原因

[234] C.高浓度氧可解除颈内动脉窦化学感受器的兴奋性

[234] D.促使二氧化碳排出过快

[234] E.诱发代谢性碱中毒

[235] 题型.单选题

[235] 题干.患者男性,65岁,有慢性咳嗽史20余年,已并发肺气肿。近2天来因受凉而致发热,咳嗽剧烈,痰呈黄脓色且不易咳出,伴气促;听诊两肺底有散在湿啰音。对该患者的首要治疗措施为_____。 正确答案:()

[235] 正确答案.A

[235] 难易度.易

[235] 选项数.5

[235] A.控制感染

[235] B.止咳

[235] C.祛痰

[235] D.降温

[235] E.氧气吸入

[236] 题型.单选题

[236] 题干.张女士,35岁。风心二狭合并房颤,病程中突然右侧肢体瘫痪,有一过性神志不清。最可能发生的情况是_____。正确答案:()

[236] 正确答案.B

[236] 难易度.易

[236] 选项数.4

[236] A.心力衰竭

[236] B.脑栓塞

[236] C.阿-斯综合征

[236] D.肺动脉栓塞

[237] 题型.单选题

[237] 题干.风湿热的发病与哪种致病菌的关系密切_____。正确答案:()

[237] 正确答案.B

[237] 难易度.易

[237] 选项数.5

[237] A.草绿色链球菌

[237] B.A组 β 溶血性链球菌

[237] C.葡萄球菌

[237] D.病毒

[237] E.支原体

[238] 题型.单选题

[238] 题干.肝硬化病人出现内分泌紊乱症状,下列哪项不正确_____。正确答案:()

[238] 正确答案.C

[238] 难易度.易

[238] 选项数.5

- [238] A.雌激素增多
- [238] B.胰岛素增多
- [238] C.肾上腺皮质激素增多
- [238] D.醛固酮增多
- [238] E.抗利尿激素增多

[解析]无

[239] 题型.单选题

[239] 题干.蜘蛛痣的形成与下列何种因素有关_____。正确答案:()

[239] 正确答案.B

[239] 难易度.易

[239] 选项数.5

[239] A.血小板减少

[239] B.血中雌激素增加

[239] C.毛细血管脆性增加

[239] D.凝血机制障碍

[239] E.严重感染

[解析]无

[240] 题型.单选题

[240] 题干.下面哪一项不是门脉高压的常见表现_____。正确答案:()

[240] 正确答案.B

[240] 难易度.易

[240] 选项数.5

[240] A.脾肿大

[240] B.肝肿大

[240] C.食管静脉曲张破裂出血

[240] D.腹水

[240] E.痔核形成

[解析]无

[241] 题型.单选题

[241] 题干.肝硬化的最可靠诊断指标是_____。正确答案:()

[241] 正确答案.E

[241] 难易度.易

[241] 选项数.5

[241] A.腹水

[241] B.脾肿大

[241] C.肝掌、蜘蛛痣

[241] D.白蛋白与球蛋白比值倒置

[241] E.肝穿刺活检有假小叶形成

[解析]无

[242] 题型.单选题

[242] 题干.肝硬化最常见的并发症是_____。正确答案:()

[242] 正确答案.A

[242] 难易度.易

[242] 选项数.5

[242] A.上消化道出血

[242] B.肝性脑病

[242] C.肝肾综合征

[242] D.感染

[242] E.肝癌

[解析]无

[243] 题型.单选题

[243] 题干.一肝硬化病人,述乏力、食欲不振。查体:神清、消瘦、轻度黄疸,肝脾轻度肿大,移动

性浊音阳性。X线钡餐检查提示食道胃底静脉曲张。请问该病人的饮食护理中不恰当的是_____。正确答案:()

- [243] 正确答案.C
- [243] 难易度.易
- [243] 选项数.5
- [243] A.低盐饮食
- [243] B.适量脂肪饮食
- [243] C.丰富粗纤维粗粮饮食
- [243] D.高热量饮食
- [243] E.高蛋白饮食

[解析]无

[244] 题型.单选题

[244] 题干.男,45岁,诊断为肝硬化。既往有乙肝病史10年。查体:睑结膜苍白,腹部静脉曲张,脾脏肿大,移动性浊音阳性。血小板 $50 \times 10^9/L$,该患者血小板降低的原因是_____。正确答案:()

- [244] 正确答案.C
- [244] 难易度.易
- [244] 选项数.5
- [244] A.营养不良
- [244] B.溶血
- [244] C.脾功能亢进
- [244] D.出血
- [244] E.骨髓抑制

[解析]无

[245] 题型.单选题

[245] 题干.一右下肺支气管扩张患者行体位引流,宜采取

- [245] 正确答案.D
- [245] 难易度.易

- [245] 选项数.5
[245] A.半坐卧位
[245] B.平卧位
[245] C.左侧卧位
[245] D.头低足高位,左侧卧位
[245] E.头低足高位,右侧卧位
-

- [246] 题型.单选题
[246] 题干.关于急性呼吸窘迫综合征(ARDS)说法错误的是
[246] 正确答案.C
[246] 难易度.易
[246] 选项数.5
[246] A.进行性呼吸困难
[246] B.一般起病急
[246] C.一般氧疗可以纠正缺氧
[246] D.病情进展快
[246] E.正位胸片可见双侧肺浸润
-

- [247] 题型.单选题
[247] 题干.风心病二尖瓣狭窄随右心功能不全加重,下列哪项表现减轻
[247] 正确答案.C
[247] 难易度.易
[247] 选项数.5
[247] A.肝脏肿大
[247] B.心率增快
[247] C.呼吸困难
[247] D.心尖区舒张期隆隆样杂音
[247] E.恶心、呕吐
-

- [248] 题型.单选题
- [248] 题干.阿—斯综合征心电图可表现为
- [248] 正确答案.C
- [248] 难易度.易
- [248] 选项数.5
- [248] A.室速、室颤
- [248] B.心跳停止
- [248] C.窦性静止、室速、室颤或严重窦缓等
- [248] D.窦性静止、室速、事颤等
- [248] E.各种心律失常
-

- [249] 题型.单选题
- [249] 题干.为使心力衰竭病人保持大便通畅,不宜采用
- [249] 正确答案.E
- [249] 难易度.易
- [249] 选项数.5
- [249] A.训练排便习惯
- [249] B.口服小剂量镁乳
- [249] C.开塞露塞肛
- [249] D.给纤维素含量多的食物
- [249] E.盐水灌肠
-

- [250] 题型.单选题
- [250] 题干.确诊慢性胃炎的主要依据是
- [250] 正确答案.C
- [250] 难易度.易
- [250] 选项数.5
- [250] A.消化道症状
- [250] B.胃液分析
- [250] C.纤维胃镜检查

- [250] D.胃脱落细胞检查
- [250] E.胃肠钡餐 X 线检查

-
- [251] 题型.单选题
 - [251] 题干.有关呕血与黑粪的叙述正确的是
 - [251] 正确答案.A
 - [251] 难易度.易
 - [251] 选项数.5
 - [251] A.下消化道出血仅有黑粪
 - [251] B.呕血一般不伴黑粪
 - [251] C.上消化道出血只有呕血
 - [251] D.出血量至少在 5ml 以上才会有黑粪
 - [251] E.黑粪一定伴呕血

-
- [252] 题型.单选题
 - [252] 题干.尿毒症病人的护理措施不包括
 - [252] 正确答案.B
 - [252] 难易度.易
 - [252] 选项数.5
 - [252] A.避免劳累,预防感染
 - [252] B.皮肤瘙痒时用乙醇擦洗
 - [252] C.准确记录 24h 出入液量
 - [252] D.给予心理支持,增强治疗信心
 - [252] E.饮食清淡、易消化、优质低蛋白

-
- [253] 题型.单选题
 - [253] 题干.肾病综合征的诊断标准不包括
 - [253] 正确答案.E
 - [253] 难易度.易
 - [253] 选项数.5

- [253] A.大量蛋白尿 24 小时尿蛋白总量 $\geq 3.5\text{g}$
 - [253] B.低蛋白血症,血浆白蛋白 $\leq 30\text{g/l}$
 - [253] C.高脂血症
 - [253] D.明显水肿
 - [253] E.高血压
-

[254] 题型.单选题

[254] 题干.胰岛素注射吸收速度最快的部位是

[254] 正确答案.A

[254] 难易度.易

[254] 选项数.5

[254] A.腹部

[254] B.上臂

[254] C.臀部

[254] D.背部下方

[254] E.大腿外侧

[255] 题型.单选题

[255] 题干.以下不符合系统性红斑狼疮的护理要求的是

[255] 正确答案.B

[255] 难易度.易

[255] 选项数.5

[255] A.床单应清洁干燥

[255] B.室内阳光充足

[255] C.病室内空气流通

[255] D.室内温度 $18-20^{\circ}\text{C}$

[255] E.室内湿度 $50\%-60\%$

[256] 题型.单选题

[256] 题干.癫痫大发作处理关键是

- [256] 正确答案.C
[256] 难易度.易
[256] 选项数.5
[256] A.立即静脉注射苯妥英钠
[256] B.防止自伤
[256] C.防止窒息
[256] D.防治脑水肿
[256] E.防治酸中毒
-

- [257] 题型.单选题
[257] 题干.一般区别脑出血与蛛网膜下腔出血的主要依据是
[257] 正确答案.D
[257] 难易度.易
[257] 选项数.5
[257] A.有无高血压
[257] B.年龄大小
[257] C.脑脊液是否呈血性
[257] D.是否有偏瘫定位体征
[257] E.有无脑膜刺激症
-

- [258] 题型.单选题
[258] 题干.男性,56岁,突然心悸,气促,咯粉红色泡沫痰,血压26/12kPa(195/90mmHg),心率136次/min,你应首先备好下列哪组药物
[258] 正确答案.B
[258] 难易度.易
[258] 选项数.5
[258] A.西地兰,硝酸甘油,异丙肾上腺素
[258] B.硝普钠,西地兰,速尿
[258] C.毒毛旋花子素 K,硝普钠,心得安

[258] D.胍乙啶,酚妥拉明,西地兰

[258] E.硝酸甘油,西地兰,多巴胺

[259] 题型.单选题

[259] 题干.尿毒症患者在静脉滴注 5%碳酸氢钠溶液过程中,突然出现手足抽搐,下列治疗首选

[259] 正确答案.E

[259] 难易度.易

[259] 选项数.5

[259] A.静脉注射地西洋

[259] B.静脉注射苯妥英钠

[259] C.口服碳酸钙

[259] D.肌内注射 1,25-二羟维生素 D3

[259] E.静脉注射葡萄糖酸钙

[260] 题型.单选题

[260] 题干.患者女性,30 岁,急性腹痛发作 10h 入院,考虑急性胰腺炎,对诊断有意义的检查

[260] 正确答案.A

[260] 难易度.易

[260] 选项数.5

[260] A.血清淀粉酶测定

[260] B.血清脂肪酶测定

[260] C.尿淀粉酶测定

[260] D.血糖测定

[260] E.血清谷丙转氨酶测定

[261] 题型.单选题

[261] 题干.患者女性,65 岁。有肝硬化病史 5 年,因饮食不当出现呕血、黑便 1 天入院。呕吐暗红色液体 3 次,量约 800ml,解黑便 2 次,量

约 500g。查体:体温 38.5°C,脉搏 120 次/分,呼吸 22 次/分,血压 85/60mmHg,神志萎靡,面色苍白,四肢湿冷。医嘱予以输血 800ml。

该患者出血最可能的原因为

- [261] 正确答案.D
- [261] 难易度.易
- [261] 选项数.5
- [261] A.胃溃疡
- [261] B.十二指肠球部溃疡
- [261] C.急性糜烂出血性胃炎
- [261] D.食管胃底静脉曲张破裂出血
- [261] E.胃癌

[262] 题型.单选题

[262] 题干.患者女性,65 岁。有肝硬化病史 5 年,因饮食不当出现呕血、黑便 1 天入院。呕吐暗红色液体 3 次,量约 800ml,解黑便 2 次,量约 500g。查体:体温 38.5°C,脉搏 120 次/分,呼吸 22 次/分,血压 85/60mmHg,神志萎靡,面色苍白,四肢湿冷。医嘱予以输血 800ml 最有可能出现的并发症为

- [262] 正确答案.C
- [262] 难易度.易
- [262] 选项数.5
- [262] A.肝肾综合征
- [262] B.肝肺综合征
- [262] C.肝性脑病
- [262] D.上消化道出血
- [262] E.水电解质酸碱平衡紊乱

[263] 题型.单选题

[263] 题干.

女,18岁,有基础代谢增高及交感神经兴奋症状,突眼,甲状腺肿大,质软,无压痛,可闻及血管杂音及震颤,手眼震颤,听诊房颤律。该病人最可能的诊断是

[263] 正确答案.E

[263] 难易度.易

[263] 选项数.5

[263] A.

地方性甲状腺肿

[263] B.

亚急性甲状腺炎

[263] C.

碘甲亢

[263] D.

慢性淋巴细胞性甲状腺炎

[263] E.

Graves病

[264] 题型.单选题

[264] 题干.患者,45岁,因剧烈头痛3h,病人主诉“头痛是一生中最剧烈的疼痛”,检查腰穿结果为脑积液为血性,诊断为蛛网膜下腔出血入院。蛛网膜下腔出血的诱因不包括

[264] 正确答案.D

[264] 难易度.易

[264] 选项数.5

[264] A.用力排便

[264] B.咳嗽

[264] C.情绪激动

[264] D.腰椎穿刺

[264] E.打喷嚏

[265] 题型.单选题

[265] 题干.肺脓肿的关键性治疗方法是

[265] 正确答案.A

[265] 难易度.易

[265] 选项数.5

[265] A.抗菌和痰液引流

[265] B.营养支持

[265] C.手术治疗

[265] D.处理原发病灶

[265] E.对症治疗

[266] 题型.单选题

[266] 题干.肺源性心脏病肺动脉高压形成的最主要因素

[266] 正确答案.E

[266] 难易度.易

[266] 选项数.5

[266] A.肺部毛细血管床减少

- [266] B.血液粘稠度增加
 - [266] C.血容量增加
 - [266] D.肺部毛细血管微小栓子形成
 - [266] E.缺氧引起的肺小血管收缩痉挛
-

[267] 题型.单选题

[267] 题干.呼吸衰竭缺 O₂ 伴 CO₂ 潴留患者不可能出现

[267] 正确答案.A

[267] 难易度.易

[267] 选项数.5

[267] A.皮肤干燥

[267] B.呼吸深快

[267] C.发绀

[267] D.球结膜充血水肿

[267] E.头晕、头痛

[268] 题型.单选题

[268] 题干.卡托普利最常见的副作用是

[268] 正确答案.C

[268] 难易度.易

[268] 选项数.5

[268] A.肝功能损害

[268] B.直立性低血压

[268] C.干咳

[268] D.高血钾

[268] E.白细胞减少

[269] 题型.单选题

[269] 题干.输液过程中患者咳大量粉红色泡沫痰,应取

[269] 正确答案.D

- [269] 难易度.易
[269] 选项数.5
[269] A.侧卧位
[269] B.平卧位
[269] C.头低足高位
[269] D.端坐位,两腿下垂
[269] E.半坐卧位
-

- [270] 题型.单选题
[270] 题干.心律绝对不规则,第一心音强弱不一,脉搏短绌的心律失常是
[270] 正确答案.C
[270] 难易度.易
[270] 选项数.5
[270] A.窦性心动过速
[270] B.房性期前收缩
[270] C.心房颤动
[270] D.室性期前收缩
[270] E.心室颤动
-

- [271] 题型.单选题
[271] 题干.消化性溃疡所引起的疼痛,以何者最具特征性
[271] 正确答案.D
[271] 难易度.易
[271] 选项数.5
[271] A.中上腹疼痛
[271] B.饥饿性疼痛
[271] C.反复发作性疼痛
[271] D.节律性疼痛
[271] E.长期疼痛

[272] 题型.单选题

[272] 题干.上消化道出血最常见的病因是

[272] 正确答案.D

[272] 难易度.易

[272] 选项数.5

[272] A.肝硬化

[272] B.胰腺癌

[272] C.胃癌

[272] D.消化性溃疡

[272] E.食管癌

[273] 题型.单选题

[273] 题干.尿毒症时哪项临床表现主要是由肾脏内分泌功能障碍所致

[273] 正确答案.E

[273] 难易度.易

[273] 选项数.5

[273] A.氮质血症

[273] B.代谢性酸中毒

[273] C.胃肠道症状

[273] D.精神、神经症状

[273] E.贫血

[274] 题型.单选题

[274] 题干.急性肾小球肾炎最常见的临床表现为

[274] 正确答案.E

[274] 难易度.易

[274] 选项数.5

[274] A.少尿、水肿

- [274] B.少尿、高血压
 - [274] C.血尿、水肿、高血压
 - [274] D.血尿、水肿、高血压、肾功能衰竭
 - [274] E.水肿、高血压
-

- [275] 题型.单选题
 - [275] 题干.关于 1 型糖尿病,下列何项是错误的
 - [275] 正确答案.B
 - [275] 难易度.易
 - [275] 选项数.5
 - [275] A.起病较急,症状明显
 - [275] B.对胰岛素不敏感
 - [275] C.大多消瘦
 - [275] D.有发生酮症酸中毒的倾向
 - [275] E.血浆胰岛素水平显著降低,依赖胰岛素治疗
-

- [276] 题型.单选题
 - [276] 题干.有关类风湿性关节炎的关节症状,下列不符合的是
 - [276] 正确答案.D
 - [276] 难易度.易
 - [276] 选项数.5
 - [276] A.多双侧对称
 - [276] B.发作期关节呈梭形肿胀
 - [276] C.晨僵显著
 - [276] D.关节畸形少见
 - [276] E.多累及肢端小关节
-

- [277] 题型.单选题
- [277] 题干.下列哪项是癫痫大发作的正确护理措施
- [277] 正确答案.E

- [277] 难易度.易
[277] 选项数.5
[277] A.及时喂饮,以防脱水
[277] B.按压肢体,制止抽搐
[277] C.口表测温,及时降温
[277] D.注意吸痰,气道通畅
[277] E.记录时间,注意保护
-

- [278] 题型.单选题
[278] 题干.一般区别脑出血与蛛网膜下腔出血的主要依据是
[278] 正确答案.C
[278] 难易度.易
[278] 选项数.5
[278] A.有无高血压
[278] B.年龄大小
[278] C.脑脊液是否呈血性
[278] D.是否有偏瘫定位体征
[278] E.有无脑膜刺激症
-

- [279] 题型.单选题
[279] 题干.某慢性支气管炎并发肺气肿病人在一阵剧咳后突然感到左上胸剧烈刺痛,出现明显的呼吸困难,不能平卧。听诊左肺呼吸音明显减弱,心率增快达 130/min.你考虑发生了下列哪种情况。
[279] 正确答案.B
[279] 难易度.易
[279] 选项数.5
[279] A.急性肺炎
[279] B.自发性气胸
[279] C.渗出性胸膜炎

[279] D.肺不张

[279] E.心肌梗死

[280] 题型.单选题

[280] 题干.杜先生,男,45岁,患甲状腺机能亢进,需进行¹³¹I治疗,你应如何进行卫生指导

[280] 正确答案.B

[280] 难易度.易

[280] 选项数.5

[280] A.治疗中忌食绿色蔬菜

[280] B.治疗前后一个月禁食海带、紫菜类食物

[280] C.治疗前3天禁食含碘高的食物

[280] D.治疗当日禁用碘酒消毒皮肤

[280] E.治疗前1月食用高纤维素食物

[281] 题型.单选题

[281] 题干.病人,女,39岁。既往有风湿性心脏病病史10余年。本次突然发生口角歪斜,口齿不清,左上肢无力。考虑诊断是

[281] 正确答案.D

[281] 难易度.易

[281] 选项数.5

[281] A.脑出血

[281] B.脑血栓形成

[281] C.风湿活动

[281] D.脑栓塞

[281] E.蛛网膜下腔出血

[282] 题型.单选题

[282] 题干.68岁男性患者因胸骨后闷痛1小时入院,心电图示急性广泛前壁心肌梗死。住院当夜,你发现其反应迟钝、面色苍白、皮肤湿

冷、脉搏细弱,应首先考虑

- [282] 正确答案.A
- [282] 难易度.易
- [282] 选项数.5
- [282] A.心源性休克
- [282] B.急性肺水肿
- [282] C.并发脑栓塞
- [282] D.心室颤动征象
- [282] E.心肌梗死后综合征

-
- [283] 题型.单选题
 - [283] 题干.处理肺结核病人的痰液最简易的方法是
 - [283] 正确答案.A
 - [283] 难易度.易
 - [283] 选项数.5
 - [283] A.用纸包裹后焚烧
 - [283] B.乙醇消毒
 - [283] C.阳光下曝晒
 - [283] D.掩埋
 - [283] E.消毒液浸泡

-
- [284] 题型.单选题
 - [284] 题干.肺癌转移出现 Horner 综合征的临床表现是
 - [284] 正确答案.C
 - [284] 难易度.易
 - [284] 选项数.5
 - [284] A.眼球外凸
 - [284] B.声音嘶哑
 - [284] C.同侧瞳孔缩小

[284] D.胸部瘀血

[284] E.头痛

[285] 题型.单选题

[285] 题干.肺癌转移出现 Horner 综合征的临床表现是

[285] 正确答案.C

[285] 难易度.易

[285] 选项数.5

[285] A.眼球外凸

[285] B.声音嘶哑

[285] C.同侧瞳孔缩小

[285] D.胸部瘀血

[285] E.头痛

[286] 题型.单选题

[286] 题干.慢性支气管炎最突出的表现是

[286] 正确答案.A

[286] 难易度.易

[286] 选项数.5

[286] A.长期反复咳嗽、咳痰

[286] B.间歇少量咯血

[286] C.反复咳脓痰

[286] D.逐渐加重的呼吸困难

[286] E.活动后心悸气急

[287] 题型.单选题

[287] 题干.心肌梗死病人心电图描记在Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联出现 ST 段抬高及出现宽而深的 Q 波,病人容易出现下列哪种心律失常

[287] 正确答案.B

[287] 难易度.易

- [287] 选项数.5
 - [287] A.室性期前收缩
 - [287] B.房室传导阻滞
 - [287] C.室性心动过速
 - [287] D.预激综合症
 - [287] E.室上性心动过速
-

- [288] 题型.单选题
 - [288] 题干.引起心源性水肿的主要原因是
 - [288] 正确答案.A
 - [288] 难易度.易
 - [288] 选项数.5
 - [288] A.右心功能不全
 - [288] B.有效循环血量减少
 - [288] C.肾血流量降低
 - [288] D.继发醛固酮增多
 - [288] E.静脉压升高
-

- [289] 题型.单选题
 - [289] 题干.风心病病人腿部适当活动的目的是
 - [289] 正确答案.E
 - [289] 难易度.易
 - [289] 选项数.5
 - [289] A.减轻心脏负担
 - [289] B.预防风湿复发
 - [289] C.防止附壁血栓形成
 - [289] D.防止动脉栓塞
 - [289] E.防止下肢静脉血栓形成
-

- [290] 题型.单选题
[290] 题干.十二指肠球部溃疡的疼痛规律
[290] 正确答案.B
[290] 难易度.易
[290] 选项数.5
[290] A.疼痛—进食—疼痛
[290] B.疼痛—进食—缓解
[290] C.进食—疼痛—疼痛
[290] D.进食—疼痛—缓解
[290] E.较少出现空腹痛
-

- [291] 题型.单选题
[291] 题干.上消化道呕出大量鲜红色血且不易控制的常见病因为
[291] 正确答案.C
[291] 难易度.易
[291] 选项数.5
[291] A.消化性溃疡出血
[291] B.应激性溃疡出血
[291] C.食管胃底静脉曲张破裂出血
[291] D.胆道出血
[291] E.胃癌出血
-

- [292] 题型.单选题
[292] 题干.慢性肾炎患者饮食中蛋白质的多少,主要取决于患者的
[292] 正确答案.D
[292] 难易度.易
[292] 选项数.5
[292] A.血压高低
[292] B.水肿程度
[292] C.全身营养状况

[292] D.肾功能情况

[292] E.尿量

[293] 题型.单选题

[293] 题干.甲状腺功能亢进症患者消化系统一般不出现的身体状况为

[293] 正确答案.E

[293] 难易度.易

[293] 选项数.5

[293] A.易饥多食

[293] B.肝脏肿大

[293] C.体重锐减

[293] D.营养不良

[293] E.大便干结

[294] 题型.单选题

[294] 题干.下列关于脑血栓形成的叙述正确的是

[294] 正确答案.D

[294] 难易度.易

[294] 选项数.5

[294] A.常在运动或情绪激动时发病

[294] B.头部使用冰袋冷敷

[294] C.急性期抬高床头

[294] D.发病 6 小时内可做溶栓治疗

[294] E.发病 1 个月后开始进行康复训练

[295] 题型.单选题

[295] 题干.患者男性,55 岁,患“幽门管溃疡” 1 个月,现原有疼痛节律消失,出现餐后上腹部饱胀,频繁呕吐宿食,最可能的并发症为

[295] 正确答案.C

- [295] 难易度.易
[295] 选项数.5
[295] A.出血
[295] B.穿孔
[295] C.幽门梗阻
[295] D.急性胃肠炎
[295] E.癌变
-

[296] 题型.单选题

[296] 题干.患者女性,30岁。3天来发热、咳嗽,极度乏力,全身皮肤广泛点片状出血急诊入院。Hb 8g/dl,白细胞 $15 \times 10^9/L$,分类 80%为原始、幼稚淋巴细胞。血小板 $20 \times 10^9/L$,骨髓象为增生极度活跃,分类中见大量原、幼淋巴细胞增生。该病人的诊断为

- [296] 正确答案.E
[296] 难易度.易
[296] 选项数.5
[296] A.急性重型再生障碍性贫血
[296] B.慢性再生障碍性贫血
[296] C.慢性淋巴细胞白血病
[296] D.急性粒细胞性白血病
[296] E.急性淋巴细胞白血病
-

[297] 题型.单选题

[297] 题干.胡先生,男性,20岁。因寒战、高热、嗜睡来院急诊。检查:体温 40°C 、脉搏每分钟 10 次、呼吸每分钟 24 次、血压 $60/50\text{mmHg}$,诊断为中毒性肺炎。急诊护士首先给病人

- [297] 正确答案.D
[297] 难易度.易
[297] 选项数.5
[297] A.吸氧

- [297] B.物理降温
- [297] C.做青霉素皮试
- [297] D.建立静脉通路
- [297] E.抽血化验

[298] 题型.单选题

[298] 题干.白血病患者发生感染的最主要原因是_____。

[298] 正确答案.D

[298] 难易度.易

[298] 选项数.5

[298] A.贫血

[298] B.骨髓抑制

[298] C.血小板减少

[298] D.成熟粒细胞缺乏

[298] E.白细胞过度增生

[299] 题型.单选题

[299] 题干.中枢神经系统白血病常用的治疗方法是_____。

[299] 正确答案.B

[299] 难易度.易

[299] 选项数.5

[299] A.环磷酰胺静脉滴注

[299] B.甲氨蝶呤鞘内注射

[299] C.阿糖胞苷静脉滴注

[299] D.泼尼松口服

[299] E.阿糖胞苷肌肉注射

[300] 题型.单选题

[300] 题干.某急性白血病患者,因“乏力、食欲减退、消瘦1个月余,伴发热1周”收入院。行化疗后出现恶心,但无呕吐。血常规检查:白细

胞 $2 \times 10^9/L$, 血小板 $150 \times 10^9/L$ 。该患者的护理问题不包括_____。

- [300] 正确答案.E
- [300] 难易度.易
- [300] 选项数.5
- [300] A.潜在并发症:感染
- [300] B.营养失调:低于机体需要量
- [300] C.活动无耐力
- [300] D.舒适的改变:发热、恶心
- [300] E.潜在并发症:颅内出血

[301] 题型.单选题

[301] 题干.患者女性,30岁。诊断特发性血小板减少性紫癜。血常规显示红细胞 $3.6 \times 10^{12}/L$, 血红蛋白 $90g/L$, 白细胞 $6.8 \times 10^9/L$, 血小板 $15 \times 10^9/L$, 该患者最大的危险是

- [301] 正确答案.C
- [301] 难易度.易
- [301] 选项数.5
- [301] A.贫血
- [301] B.继发感染
- [301] C.颅内出血
- [301] D.心衰
- [301] E.牙龈出血

[302] 题型.单选题

[302] 题干.

符合慢性阻塞性肺气肿的体征是_____。

[302] 正确答案.E

[302] 难易度.易

[302] 选项数.5

[302] A.

叩诊呈鼓音

[302] B.

单侧语颤减弱

[302] C.

单侧呼吸运动减弱

[302] D.

气管偏移

[302] E.

呼气时间延长

[303] 题型.单选题

[303] 题干.

确诊早期阻塞性肺气肿最有价值的一项是_____。

[303] 正确答案.B

[303] 难易度.易

[303] 选项数.5

[303] A.

病史、体征

[303] B.

肺功能测定

[303] C.

痰菌培养

[303] D.

血气分析

[303] E.

X线检查

[304] 题型.单选题

[304] 题干.

女,50岁,慢性支气管炎、肺气肿病史20年。于剧烈咳嗽后突然出现呼吸困难,右胸刺痛,逐渐加重。该患者最可能是发生了_____。

[304] 正确答案.C

[304] 难易度.易

[304] 选项数.5

[304] A.

急性心肌梗死

[304] B.

慢性支气管炎急性发作

[304] C.

气胸

[304] D.

支气管哮喘

[304] E.

胸腔积液

[305] 题型.单选题

[305] 题干.

某老年患者以肺气肿、Ⅱ型呼吸衰竭收入院,入院第一天晚上,因痰多、咳嗽、呼吸困难,并对医院环境不适应而不能入睡,不正确的护理措施是_____。

[305] 正确答案.A

[305] 难易度.易

[305] 选项数.5

[305] A.

给镇咳和镇静药,帮助入睡

[305] B.

减少夜间操作,保证病人睡眠

[305] C.

给低流量持续吸氧

[305] D.

减少白天睡眠时间和次数

[305] E.

和病人一起制定白天活动计划

[306] 题型.单选题

[306] 题干.

某呼吸衰竭病人,应用辅助呼吸和呼吸兴奋剂过程中,出现恶心、面颊潮红、肌肉颤动等现象,应考虑_____。

[306] 正确答案.C

[306] 难易度.易

[306] 选项数.5

[306] A.

通气过量

[306] B.

肺性脑病先兆

[306] C.

呼吸兴奋剂过量

[306] D.

气胸

[306] E.

痰液阻塞

[307] 题型.单选题

[307] 题干.

心脏听诊若闻及心尖部舒张期隆隆样杂音提示_____。

[307] 正确答案.A

[307] 难易度.易

[307] 选项数.5

[307] A.

二尖瓣狭窄

[307] B.

二尖瓣关闭不全

[307] C.

主动脉瓣狭窄

[307] D.

主动脉瓣关闭不全

[307] E.

三尖瓣狭窄

[308] 题型.单选题

[308] 题干.

肝硬化失代偿期最突出的临床表现是_____。

[308] 正确答案.B

[308] 难易度.易

[308] 选项数.5

[308] A.

消化道症状

[308] B.

腹水

[308] C.

出血倾向

[308] D.

脾功能亢进

[308] E.

电解质紊乱

[309] 题型.单选题

[309] 题干.

下列哪项不属于门脉高压的侧支循环开放的表现_____。

[309] 正确答案.D

[309] 难易度.易

[309] 选项数.5

[309] A.

食管下端静脉曲张

[309] B.

脐周静脉曲张

[309] C.

腹壁静脉曲张

[309] D.

下肢静脉曲张

[309] E.

痔静脉曲张

[310] 题型.单选题

[310] 题干.

肝硬化晚期病人血清中常出现_____。

[310] 正确答案.C

[310] 难易度.易

[310] 选项数.5

[310] A.

白蛋白增加,球蛋白增加

[310] B.

白蛋白减少,球蛋白减少

[310] C.

白蛋白/球蛋白比值倒置

[310] D.

白蛋白增加,球蛋白减少

[310] E.

白蛋白/球蛋白比值增大

[311] 题型.单选题

[311] 题干.一右下肺支气管扩张患者行体位引流,宜采取

[311] 正确答案.D

[311] 难易度.易

[311] 选项数.5

[311] A.半坐卧位

[311] B.平卧位

[311] C.左侧卧位

[311] D.头低足高位,左侧卧位

[311] E.头低足高位,右侧卧位

[312] 题型.单选题

[312] 题干.关于急性呼吸窘迫综合征(ARDS)说法错误的是

[312] 正确答案.C

[312] 难易度.易

[312] 选项数.5

[312] A.进行性呼吸困难

[312] B.一般起病急

[312] C.一般氧疗可以纠正缺氧

[312] D.病情进展快

[312] E.正位胸片可见双侧肺浸润

[313] 题型.单选题

[313] 题干.风心病二尖瓣狭窄随右心功能不全加重,下列哪项表现减轻

[313] 正确答案.C

[313] 难易度.易

[313] 选项数.5

[313] A.肝脏肿大

- [313] B.心率增快
 - [313] C.呼吸困难
 - [313] D.心尖区舒张期隆隆样杂音
 - [313] E.恶心、呕吐
-

- [314] 题型.单选题
 - [314] 题干.阿—斯综合征心电图可表现为
 - [314] 正确答案.C
 - [314] 难易度.易
 - [314] 选项数.5
 - [314] A.室速、室颤
 - [314] B.心跳停止
 - [314] C.窦性静止、室速、室颤或严重窦缓等
 - [314] D.窦性静止、室速、事颤等
 - [314] E.各种心律失常
-

- [315] 题型.单选题
 - [315] 题干.为使心力衰竭病人保持大便通畅,不宜采用
 - [315] 正确答案.E
 - [315] 难易度.易
 - [315] 选项数.5
 - [315] A.训练排便习惯
 - [315] B.口服小剂量镁乳
 - [315] C.开塞露塞肛
 - [315] D.给纤维素含量多的食物
 - [315] E.盐水灌肠
-

- [316] 题型.单选题
- [316] 题干.确诊慢性胃炎的主要依据是
- [316] 正确答案.C

- [316] 难易度.易
 - [316] 选项数.5
 - [316] A.消化道症状
 - [316] B.胃液分析
 - [316] C.纤维胃镜检查
 - [316] D.胃脱落细胞检查
 - [316] E.胃肠钡餐 X 线检查
-

- [317] 题型.单选题
 - [317] 题干.有关呕血与黑粪的叙述正确的是
 - [317] 正确答案.A
 - [317] 难易度.易
 - [317] 选项数.5
 - [317] A.下消化道出血仅有黑粪
 - [317] B.呕血一般不伴黑粪
 - [317] C.上消化道出血只有呕血
 - [317] D.出血量至少在 5ml 以上才会有黑粪
 - [317] E.黑粪一定伴呕血
-

- [318] 题型.单选题
 - [318] 题干.尿毒症病人的护理措施不包括
 - [318] 正确答案.B
 - [318] 难易度.易
 - [318] 选项数.5
 - [318] A.避免劳累,预防感染
 - [318] B.皮肤瘙痒时用乙醇擦洗
 - [318] C.准确记录 24h 出入液量
 - [318] D.给予心理支持,增强治疗信心
 - [318] E.饮食清淡、易消化、优质低蛋白
-

- [319] 题型.单选题
- [319] 题干.肾病综合征的诊断标准不包括
- [319] 正确答案.E
- [319] 难易度.易
- [319] 选项数.5
- [319] A.大量蛋白尿 24 小时尿蛋白总量 $\geq 3.5\text{g}$
- [319] B.低蛋白血症,血浆白蛋白 $\leq 30\text{g/l}$
- [319] C.高脂血症
- [319] D.明显水肿
- [319] E.高血压
-

- [320] 题型.单选题
- [320] 题干.胰岛素注射吸收速度最快的部位是
- [320] 正确答案.A
- [320] 难易度.易
- [320] 选项数.5
- [320] A.腹部
- [320] B.上臂
- [320] C.臀部
- [320] D.背部下方
- [320] E.大腿外侧
-

- [321] 题型.单选题
- [321] 题干.以下不符合系统性红斑狼疮的护理要求的是
- [321] 正确答案.B
- [321] 难易度.易
- [321] 选项数.5
- [321] A.床单应清洁干燥
- [321] B.室内阳光充足
- [321] C.病室内空气流通

- [321] D.室内温度 18-20°C
[321] E.室内湿度 50%-60%
-

- [322] 题型.单选题
[322] 题干.癫痫大发作处理关键是
[322] 正确答案.C
[322] 难易度.易
[322] 选项数.5
[322] A.立即静脉注射苯妥英钠
[322] B.防止自伤
[322] C.防止窒息
[322] D.防治脑水肿
[322] E.防治酸中毒
-

- [323] 题型.单选题
[323] 题干.一般区别脑出血与蛛网膜下腔出血的主要依据是
[323] 正确答案.D
[323] 难易度.易
[323] 选项数.5
[323] A.有无高血压
[323] B.年龄大小
[323] C.脑脊液是否呈血性
[323] D.是否有偏瘫定位体征
[323] E.有无脑膜刺激症
-

- [324] 题型.单选题
[324] 题干.男性,56岁,突然心悸,气促,咯粉红色泡沫痰,血压 26/12kPa(195/90mmHg),心率 136 次/min,你应首先备好下列哪组药物
[324] 正确答案.B

- [324] 难易度.易
- [324] 选项数.5
- [324] A.西地兰,硝酸甘油,异丙肾上腺素
- [324] B.硝普钠,西地兰,速尿
- [324] C.毒毛旋花子素 K,硝普钠,心得安
- [324] D.胍乙啶,酚妥拉明,西地兰
- [324] E.硝酸甘油,西地兰,多巴胺
-

[325] 题型.单选题

[325] 题干.尿毒症患者静脉滴注 5%碳酸氢钠溶液过程中,突然出现手足抽搐,下列治疗首选

- [325] 正确答案.E
- [325] 难易度.易
- [325] 选项数.5
- [325] A.静脉注射地西洋
- [325] B.静脉注射苯妥英钠
- [325] C.口服碳酸钙
- [325] D.肌肉注射 1,25-二羟维生素 D3
- [325] E.静脉注射葡萄糖酸钙
-

[326] 题型.单选题

[326] 题干.患者女性,30岁,急性腹痛发作 10h 入院,考虑急性胰腺炎,对诊断有意义的检查

- [326] 正确答案.A
- [326] 难易度.易
- [326] 选项数.5
- [326] A.血清淀粉酶测定
- [326] B.血清脂肪酶测定
- [326] C.尿淀粉酶测定

[326] D.血糖测定

[326] E.血清谷丙转氨酶测定

[327] 题型.单选题

[327] 题干.患者女性,65岁。有肝硬化病史5年,因饮食不当出现呕血、黑便1天入院。呕吐暗红色液体3次,量约800ml,解黑便2次,量约500g。查体:体温38.5℃,脉搏120次/分,呼吸22次/分,血压85/60mmHg,神志萎靡,面色苍白,四肢湿冷。医嘱予以输血800ml。该患者出血最可能的原因为

[327] 正确答案.D

[327] 难易度.易

[327] 选项数.5

[327] A.胃溃疡

[327] B.十二指肠球部溃疡

[327] C.急性糜烂出血性胃炎

[327] D.食管胃底静脉曲张破裂出血

[327] E.胃癌

[328] 题型.单选题

[328] 题干.患者女性,65岁。有肝硬化病史5年,因饮食不当出现呕血、黑便1天入院。呕吐暗红色液体3次,量约800ml,解黑便2次,量约500g。查体:体温38.5℃,脉搏120次/分,呼吸22次/分,血压85/60mmHg,神志萎靡,面色苍白,四肢湿冷。医嘱予以输血800ml。该患者目前最主要的护理问题是

[328] 正确答案.A

[328] 难易度.易

[328] 选项数.5

[328] A.组织灌注不足

[328] B.营养失调;低于机体需要量

[328] C.体温升高

[328] D.焦虑

[328] E.活动无耐力

[329] 题型.单选题

[329] 题干.患者女性,65岁。有肝硬化病史5年,因饮食不当出现呕血、黑便1天入院。呕吐暗红色液体3次,量约800ml,解黑便2次,量约500g。查体:体温38.5℃,脉搏120次/分,呼吸22次/分,血压85/60mmHg,神志萎靡,面色苍白,四肢湿冷。医嘱予以输血800ml。该患者目前最主要的护理问题是

[329] 正确答案.A

[329] 难易度.易

[329] 选项数.5

[329] A.组织灌注不足

[329] B.营养失调;低于机体需要量

[329] C.体温升高

[329] D.焦虑

[329] E.活动无耐力

[330] 题型.单选题

[330] 题干.患者女性,65岁。有肝硬化病史5年,因饮食不当出现呕血、黑便1天入院。呕吐暗红色液体3次,量约800ml,解黑便2次,量约500g。查体:体温38.5℃,脉搏120次/分,呼吸22次/分,血压85/60mmHg,神志萎靡,面色苍白,四肢湿冷。医嘱予以输血800ml最有可能出现的并发症为

[330] 正确答案.C

[330] 难易度.易

[330] 选项数.5

[330] A.肝肾综合征

[330] B.肝肺综合征

[330] C.肝性脑病

[330] D.上消化道出血

[330] E.水电解质酸碱平衡紊乱

[331] 题型.单选题

[331] 题干.

女,18岁,有基础代谢增高及交感神经兴奋症状,突眼,甲状腺肿大,质软,无压痛,可闻及血管杂音及震颤,手眼震颤,听诊房颤律。该病人最可能的诊断是

[331] 正确答案.E

[331] 难易度.易

[331] 选项数.5

[331] A.

地方性甲状腺肿

[331] B.

亚急性甲状腺炎

[331] C.

碘甲亢

[331] D.

慢性淋巴细胞性甲状腺炎

[331] E.

Graves 病

[332] 题型.单选题

[332] 题干.肺脓肿的关键性治疗方法是

[332] 正确答案.A

[332] 难易度.易

[332] 选项数.5

[332] A.抗菌和痰液引流

[332] B.营养支持

[332] C.手术治疗

[332] D.处理原发病灶

[332] E.对症治疗

[333] 题型.单选题

[333] 题干.肺源性心脏病肺动脉高压形成的最主要因素

[333] 正确答案.E

[333] 难易度.易

[333] 选项数.5

[333] A.肺部毛细血管床减少

[333] B.血液粘稠度增加

[333] C.血容量增加

[333] D.肺部毛细血管微小栓子形成

[333] E.缺氧引起的肺小血管收缩痉挛

[334] 题型.单选题

[334] 题干.呼吸衰竭缺 O₂ 伴 CO₂ 潴留患者不可能出现

- [334] 正确答案.A
- [334] 难易度.易
- [334] 选项数.5
- [334] A.皮肤干燥
- [334] B.呼吸深快
- [334] C.发绀
- [334] D.球结膜充血水肿
- [334] E.头晕、头痛

-
- [335] 题型.单选题
 - [335] 题干.卡托普利最常见的副作用是
 - [335] 正确答案.C
 - [335] 难易度.易
 - [335] 选项数.5
 - [335] A.肝功能损害
 - [335] B.直立性低血压
 - [335] C.干咳
 - [335] D.高血钾
 - [335] E.白细胞减少

-
- [336] 题型.单选题
 - [336] 题干.输液过程中患者咳大量粉红色泡沫痰,应取
 - [336] 正确答案.D
 - [336] 难易度.易
 - [336] 选项数.5
 - [336] A.侧卧位
 - [336] B.平卧位
 - [336] C.头低足高位
 - [336] D.端坐位,两腿下垂
 - [336] E.半坐卧位

-
- [337] 题型.单选题
- [337] 题干.心律绝对不规则,第一心音强弱不一,脉搏短绌的心律失常是
- [337] 正确答案.C
- [337] 难易度.易
- [337] 选项数.5
- [337] A.窦性心动过速
- [337] B.房性期前收缩
- [337] C.心房颤动
- [337] D.室性期前收缩
- [337] E.心室颤动

-
- [338] 题型.单选题
- [338] 题干.消化性溃疡所引起的疼痛,以何者最具特征性
- [338] 正确答案.D
- [338] 难易度.易
- [338] 选项数.5
- [338] A.中上腹疼痛
- [338] B.饥饿性疼痛
- [338] C.反复发作性疼痛
- [338] D.节律性疼痛
- [338] E.长期疼痛

-
- [339] 题型.单选题
- [339] 题干.上消化道出血最常见的病因是
- [339] 正确答案.D
- [339] 难易度.易
- [339] 选项数.5
- [339] A.肝硬化

- [339] B.胰腺癌
- [339] C.胃癌
- [339] D.消化性溃疡
- [339] E.食管癌

[340] 题型.单选题

[340] 题干.尿毒症时哪项临床表现主要是由肾脏内分泌功能障碍所致

[340] 正确答案.E

[340] 难易度.易

[340] 选项数.5

[340] A.氮质血症

[340] B.代谢性酸中毒

[340] C.胃肠道症状

[340] D.精神、神经症状

[340] E.贫血

[341] 题型.单选题

[341] 题干.急性肾小球肾炎最常见的临床表现为

[341] 正确答案.E

[341] 难易度.易

[341] 选项数.5

[341] A.少尿、水肿

[341] B.少尿、高血压

[341] C.血尿、水肿、高血压

[341] D.血尿、水肿、高血压、肾功能衰竭

[341] E.水肿、高血压

[342] 题型.单选题

[342] 题干.关于 1 型糖尿病,下列何项是错误的

- [342] 正确答案.B
[342] 难易度.易
[342] 选项数.5
[342] A.起病较急,症状明显
[342] B.对胰岛素不敏感
[342] C.大多消瘦
[342] D.有发生酮症酸中毒的倾向
[342] E.血浆胰岛素水平显著降低,依赖胰岛素治疗
-

- [343] 题型.单选题
[343] 题干.有关类风湿性关节炎的关节症状,下列不符合的是
[343] 正确答案.D
[343] 难易度.易
[343] 选项数.5
[343] A.多双侧对称
[343] B.发作期关节呈梭形肿胀
[343] C.晨僵显著
[343] D.关节畸形少见
[343] E.多累及肢端小关节
-

- [344] 题型.单选题
[344] 题干.下列哪项是癫痫大发作的正确护理措施
[344] 正确答案.E
[344] 难易度.易
[344] 选项数.5
[344] A.及时喂饮,以防脱水
[344] B.按压肢体,制止抽搐
[344] C.口表测温,及时降温
[344] D.注意吸痰,气道通畅
[344] E.记录时间,注意保护

[345] 题型.单选题

[345] 题干.一般区别脑出血与蛛网膜下腔出血的主要依据是

[345] 正确答案.C

[345] 难易度.易

[345] 选项数.5

[345] A.有无高血压

[345] B.年龄大小

[345] C.脑脊液是否呈血性

[345] D.是否有偏瘫定位体征

[345] E.有无脑膜刺激症

[346] 题型.单选题

[346] 题干.某慢性支气管炎并发肺气肿病人在一阵剧咳后突然感到左上胸剧烈刺痛,出现明显的呼吸困难,不能平卧。听诊左肺呼吸音明显减弱,心率增快达 130/min.你考虑发生了下列哪种情况。

[346] 正确答案.B

[346] 难易度.易

[346] 选项数.5

[346] A.急性肺炎

[346] B.自发性气胸

[346] C.渗出性胸膜炎

[346] D.肺不张

[346] E.心肌梗死

[347] 题型.单选题

[347] 题干.杜先生,男,45 岁,患甲状腺机能亢进,需进行 131 碘治疗,你应如何进行卫生指导

[347] 正确答案.B

[347] 难易度.易

- [347] 选项数.5
- [347] A.治疗中忌食绿色蔬菜
- [347] B.治疗前后一个月禁食海带、紫菜类食物
- [347] C.治疗前 3 天禁食含碘高的食物
- [347] D.治疗当日禁用碘酒消毒皮肤
- [347] E.治疗前 1 月食用高纤维素食物
-

[348] 题型.单选题

[348] 题干.病人,女,39 岁。既往有风湿性心脏病病史 10 余年。本次突然发生口角歪斜,口齿不清,左上肢无力。考虑诊断是

- [348] 正确答案.D
- [348] 难易度.易
- [348] 选项数.5
- [348] A.脑出血
- [348] B.脑血栓形成
- [348] C.风湿活动
- [348] D.脑栓塞
- [348] E.蛛网膜下腔出血
-

[349] 题型.单选题

[349] 题干.68 岁男性患者因胸骨后闷痛 1 小时入院,心电图示急性广泛前壁心肌梗死。住院当夜,你发现其反应迟钝、面色苍白、皮肤湿冷、脉搏细弱,应首先考虑

- [349] 正确答案.A
- [349] 难易度.易
- [349] 选项数.5
- [349] A.心源性休克
- [349] B.急性肺水肿
- [349] C.并发脑栓塞

- [349] D.心室颤动征象
- [349] E.心肌梗死后综合征

-
- [350] 题型.单选题
 - [350] 题干.处理肺结核病人的痰液最简易的方法是
 - [350] 正确答案.A
 - [350] 难易度.易
 - [350] 选项数.5
 - [350] A.用纸包裹后焚烧
 - [350] B.乙醇消毒
 - [350] C.阳光下曝晒
 - [350] D.掩埋
 - [350] E.消毒液浸泡

-
- [351] 题型.单选题
 - [351] 题干.肺癌转移出现 Horner 综合征的临床表现是
 - [351] 正确答案.C
 - [351] 难易度.易
 - [351] 选项数.5
 - [351] A.眼球外凸
 - [351] B.声音嘶哑
 - [351] C.同侧瞳孔缩小
 - [351] D.胸部瘀血
 - [351] E.头痛

-
- [352] 题型.单选题
 - [352] 题干.慢性支气管炎最突出的表现是
 - [352] 正确答案.A
 - [352] 难易度.易
 - [352] 选项数.5

- [352] A.长期反复咳嗽、咳痰
 - [352] B.间歇少量咯血
 - [352] C.反复咳脓痰
 - [352] D.逐渐加重的呼吸困难
 - [352] E.活动后心悸气急
-

[353] 题型.单选题

[353] 题干.心肌梗死病人心电图描记在Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联出现 ST 段抬高及出现宽而深的 Q 波,病人容易出现下列哪种心律失常

[353] 正确答案.B

[353] 难易度.易

[353] 选项数.5

[353] A.室性期前收缩

[353] B.房室传导阻滞

[353] C.室性心动过速

[353] D.预激综合症

[353] E.室上性心动过速

[354] 题型.单选题

[354] 题干.引起心源性水肿的主要原因是

[354] 正确答案.A

[354] 难易度.易

[354] 选项数.5

[354] A.右心功能不全

[354] B.有效循环血量减少

[354] C.肾血流量降低

[354] D.继发醛固酮增多

[354] E.静脉压升高

- [355] 题型.单选题
- [355] 题干.风心病病人腿部适当活动的目的是
- [355] 正确答案.E
- [355] 难易度.易
- [355] 选项数.5
- [355] A.减轻心脏负担
- [355] B.预防风湿复发
- [355] C.防止附壁血栓形成
- [355] D.防止动脉栓塞
- [355] E.防止下肢静脉血栓形成
-

- [356] 题型.单选题
- [356] 题干.十二指肠球部溃疡的疼痛规律
- [356] 正确答案.B
- [356] 难易度.易
- [356] 选项数.5
- [356] A.疼痛—进食—疼痛
- [356] B.疼痛—进食—缓解
- [356] C.进食—疼痛—疼痛
- [356] D.进食—疼痛—缓解
- [356] E.较少出现空腹痛
-

- [357] 题型.单选题
- [357] 题干.上消化道呕出大量鲜红色血且不易控制的常见病因为
- [357] 正确答案.C
- [357] 难易度.易
- [357] 选项数.5
- [357] A.消化性溃疡出血
- [357] B.应激性溃疡出血
- [357] C.食管胃底静脉曲张破裂出血

[357] D.胆道出血

[357] E.胃癌出血

[358] 题型.单选题

[358] 题干.慢性肾炎患者饮食中蛋白质的多少,主要取决于患者的

[358] 正确答案.D

[358] 难易度.易

[358] 选项数.5

[358] A.血压高低

[358] B.水肿程度

[358] C.全身营养状况

[358] D.肾功能情况

[358] E.尿量

[359] 题型.单选题

[359] 题干.甲状腺功能亢进症患者消化系统一般不出现的身体状况为

[359] 正确答案.E

[359] 难易度.易

[359] 选项数.5

[359] A.易饥多食

[359] B.肝脏肿大

[359] C.体重锐减

[359] D.营养不良

[359] E.大便干结

[360] 题型.单选题

[360] 题干.下列关于脑血栓形成的叙述正确的是

[360] 正确答案.D

[360] 难易度.易

- [360] 选项数.5
- [360] A.常在运动或情绪激动时发病
- [360] B.头部使用冰袋冷敷
- [360] C.急性期抬高床头
- [360] D.发病 6 小时内可做溶栓治疗
- [360] E.发病 1 个月后开始进行康复训练
-

[361] 题型.单选题

[361] 题干.患者男性,55 岁,患“幽门管溃疡”1 个月,现原有疼痛节律消失,出现餐后上腹部饱胀,频繁呕吐宿食,最可能的并发症为

- [361] 正确答案.C
- [361] 难易度.易
- [361] 选项数.5
- [361] A.出血
- [361] B.穿孔
- [361] C.幽门梗阻
- [361] D.急性胃肠炎
- [361] E.癌变
-

[362] 题型.单选题

[362] 题干.患者女性,30 岁。3 天来发热、咳嗽,极度乏力,全身皮肤广泛点片状出血急诊入院。Hb 8g/dl,白细胞 $15 \times 10^9/L$,分类 80%为原始、幼稚淋巴细胞。血小板 $20 \times 10^9/L$,骨髓象为增生极度活跃,分类中见大量原、幼淋巴细胞增生。该病人的诊断为

- [362] 正确答案.E
- [362] 难易度.易
- [362] 选项数.5
- [362] A.急性重型再生障碍性贫血
- [362] B.慢性再生障碍性贫血
- [362] C.慢性淋巴细胞白血病

[362] D.急性粒细胞性白血病

[362] E.急性淋巴细胞白血病

[363] 题型.单选题

[363] 题干.胡先生,男性,20岁。因寒战、高热、嗜睡来院急诊。检查:体温 40°C、脉搏每分钟 10 次、呼吸每分钟 24 次、血压 60/50mmHg,诊断为中毒性肺炎。急诊护士首先给病人

[363] 正确答案.D

[363] 难易度.易

[363] 选项数.5

[363] A.吸氧

[363] B.物理降温

[363] C.做青霉素皮试

[363] D.建立静脉通路

[363] E.抽血化验

[364] 题型.单选题

[364] 题干.孙先生,癫痫病史 5 年,曾有强直阵挛发作。其最适宜的职业是_____。

[364] 正确答案.D

[364] 难易度.易

[364] 选项数.5

[364] A.汽车驾驶员

[364] B.邮递员

[364] C.游泳运动员

[364] D.办公室职员

[364] E.电工

[365] 题型.单选题

[365] 题干.生长抑素用于治疗食管胃底静脉曲张破裂出血的主要机

制是()

- [365] 正确答案.A
- [365] 难易度.易
- [365] 选项数.5
- [365] A.降低门静脉的血流量
- [365] B.促进破裂部位的静脉收缩
- [365] C.减少内脏血流量
- [365] D.降低局部的血流速度
- [365] E.促进破裂部位血栓形成

-
- [366] 题型.单选题
 - [366] 题干.关于上消化道出血的叙述,错误的是()
 - [366] 正确答案.D
 - [366] 难易度.易
 - [366] 选项数.5
 - [366] A.幽门以上消化道出血常出现黑便和呕血
 - [366] B.有黑便不一定有呕血
 - [366] C.有呕血一定有黑便
 - [366] D.呕血不会出现鲜红色
 - [366] E.可以出现鲜血便

[367] 题型.单选题

[367] 题干.目前临床上常合用哪种药物来减轻静滴血管加压素时可能出现的血压升高等不良反应()

- [367] 正确答案.C
- [367] 难易度.易
- [367] 选项数.5
- [367] A.硝普钠
- [367] B.硝苯吡啶
- [367] C.硝酸甘油

[367] D.普奈洛尔

[367] E.卡托普利

[368] 题型.单选题

[368] 题干.消化性溃疡出血治疗时应用抑制胃酸分泌的药物,主要目的是()

[368] 正确答案.E

[368] 难易度.易

[368] 选项数.5

[368] A.促进溃疡面愈合

[368] B.避免溃疡面损伤加重

[368] C.减少溃疡面的血流量

[368] D.避免胃粘膜应激性损伤

[368] E.促进血小板在出血部位的聚集

[369] 题型.单选题

[369] 题干.中枢神经系统白血病最常见于_____。

[369] 正确答案.A

[369] 难易度.易

[369] 选项数.5

[369] A.急性淋巴细胞白血病

[369] B.急性粒细胞白血病

[369] C.急性单核细胞白血病

[369] D.急性巨核细胞白血病

[369] E.急性红白血病

[370] 题型.单选题

[370] 题干.急慢性白血病鉴别主要依靠_____。

[370] 正确答案.E

[370] 难易度.易

- [370] 选项数.5
- [370] A.肝脾淋巴结肿大
- [370] B.发病急缓,病程长短
- [370] C.骨髓增生程度粒红比值
- [370] D.外周血原始细胞的比例
- [370] E.骨髓原始细胞的比例
-

[371] 题型.单选题

[371] 题干.患者男,诊断为急性白血病,遵医嘱给予环磷酰胺静脉滴注 20 分钟后,患者主诉输液处疼痛,护士小丽见输液处肢体肿胀,护士小丽首先应_____。

- [371] 正确答案.D
- [371] 难易度.易
- [371] 选项数.5
- [371] A.减慢低速继续滴注
- [371] B.减慢低速后,局部热敷
- [371] C.避免血液流出,应直接拔针
- [371] D.停止输液,连接注射器,边抽吸边拔针
- [371] E.给液体加温
-

[372] 题型.单选题

[372] 题干.患者男,35 岁。急性髓系白血病,应用高三尖杉酯碱做化疗。静脉滴注该药物时的最佳滴数是低于_____。

- [372] 正确答案.B
- [372] 难易度.易
- [372] 选项数.5
- [372] A.20 滴/分钟
- [372] B.40 滴/分钟
- [372] C.50 滴/分钟

[372] D.60 滴/分钟

[372] E.70 滴/分钟

[373] 题型.单选题

[373] 题干.患者女,42 岁。白血病入院化疗 3 个周期后出现足趾麻木、腱反射消失等外周神经炎的表现,可引起此副作用的化疗药物为_____。

[373] 正确答案.A

[373] 难易度.易

[373] 选项数.5

[373] A.长春新碱

[373] B.泼尼松

[373] C.柔红霉素

[373] D.阿霉素

[373] E.甲氨蝶呤
