

医学影像诊断学

1、形成肺门阴影的解剖结构是()。

- A、 肺动脉、肺静脉、支气管、淋巴结
- B、 肺动脉、上肺静脉、支气管、淋巴结
- C、 肺动脉、上肺静脉、支气管
- D、 肺动脉、肺静脉、淋巴结

答案： A

2、不符合急性粟粒性肺结核的表现是()。

- A、 大量结核菌一次或短时间内数次侵入血循环,到达肺部所引起。
- B、 两肺从肺尖到肺底均匀分布,小点状阴影,约 2MM 大小。
- C、 病灶大小、密度基本相同,短期病灶可融合。
- D、 一周内可出现典型的结节影。

答案： D

3、50 岁,男性,发热咳嗽,右肺中叶有点片状阴影,边缘模糊,密度不均匀,经抗炎治疗,复查,该影在同一部位反复出现,应考虑为()。

- A、 病毒性肺炎
- B、 干酪性肺炎
- C、 阻塞性肺炎
- D、 支原体肺炎

答案： C

4、周围型肺癌,所形成的空洞,其 X 线特征是()。

- A、 厚壁,其中有大液平,边缘模糊
- B、 厚壁,内壁凸凹不平,少有液平面
- C、 薄壁,多发性环状负影
- D、 薄壁,周边不完整

答案： B

5、颅骨骨折 14 天,现有血丝痰,胸片上右肺下野有一圆形阴影,约 8*8CM 大小,边缘清楚,复查肿块缩小缓慢,应考虑为()。

- A、 周围型肺癌
- B、 肺血肿
- C、 结核瘤
- D、 炎性假瘤

答案： B

6、可以直接显示韧带及关节内软骨的影像学检查方法有：

- A、 关节造影
- B、 体层摄影
- C、 平片
- D、 MRI

答案： D

7、就关节的 CT 而言,下述哪项是错误的：

- A、 CT 能很好显示关节骨端和骨性关节面。
- B、 关节软骨常能清楚显示。
- C、 可见关节囊、周围肌肉和囊内外韧带的断面。
- D、 能清楚显示关节间隙。

答案： B

8、就关节 MRI:而言,下述哪项是错误的：

- A、 MRI 能很好显示关节软骨。
- B、 能显示软骨下骨性关节面。
- C、 能显示关节囊、囊内外韧带和关节盘。
- D、 不能显示关节积液。

答案： D

9、X 线所见成人关节间隙组成是()

- A、 关节软骨
- B、 关节腔
- C、 关节液
- D、 关节软骨、关节腔和关节液
- E、 关节软骨、关节液

答案： D

10、以下哪种疾病常见骨质软化：

- A、 关节结核
- B、 骨髓瘤
- C、 骨折
- D、 佝偻病

答案： D

11、关于骨质疏松下述哪项是错误的：

- A、 骨密度减低；
- B、 松质中骨小梁变细、减少、间隙增宽；
- C、 皮质分层、变薄；
- D、 代谢、内分泌等异常引起局限性性骨质疏松。

答案： D

12、关于骨膜反应下述哪项是错误的：

- A、 骨膜反应通常表示有病变存在。
- B、 常见的表现有线状、层状或花边状。
- C、 Codman, 三角仅见于恶性肿瘤
- D、 其厚度与范围同病变的部位、性质和发展阶段有关。

答案： C

13、骨性强直常见于：

- A、 化脓性关节炎
- B、 类风湿关节炎
- C、 关节结核
- D、 痛风性关节炎

答案： A

14、对于颅底、脊柱等复杂部位的骨折,哪种影像学检查方法更好：

- A、 平片
- B、 体层摄影
- C、 CT

D、 MRI

答案： C

15、儿童骨折常见的特点为()

A、 青枝骨折

B、 不易发生骨骺分离

C、 易见骨折线

D、 与成人骨折相同

E、 以上都是

答案： A

16、早期骨缺血坏死,最敏感的影像学检查方法是:

A、 平片

B、 MRI

C、 CT

D、 体层摄影

答案： B

17、诊断早期骨软骨缺血坏死最为敏感的检查方法是()

A、 MRI 检查

B、 X 线平片

C、 CT 平扫

D、 CT 增强扫描

E、 临床体检

答案： A

18、下列不属于股骨头缺血坏死常见 X 线表现的是()

A、 股骨头密度均匀增高

B、 股骨头局限性疏松、囊变

C、 股骨头不均匀硬化

D、 髋臼增大

E、 关节间隙狭窄

答案： E

19、下列哪项不符合股骨头缺血性坏死的表现()

- A、 股骨头相对密度增高
- B、 股骨头囊变硬化
- C、 股骨头压缩变形
- D、 股骨头蘑菇状变形
- E、 股骨头无骨质疏松

答案： E

20、急性化脓性骨髓炎发病一般经多长时间后,才可见骨骼 X 线改变:

- A、 1 周
- B、 2 周
- C、 1 月
- D、 20 天

答案： B

21、以下哪种疾病不易累及关节:

- A、 成人长骨化脓性骨髓炎
- B、 儿童长骨化脓性骨髓炎
- C、 骨骺和干骺端结核
- D、 骨肉瘤

答案： B

22、下列化脓性关节炎的 x 线表现中,哪项出现早而又具有特征性()

- A、 关节脓肿
- B、 关节脱位
- C、 关节腔狭窄
- D、 关节持重面骨质破坏
- E、 关节骨性强直

答案： D

23、急性化脓性骨髓炎的 X 线片主要表现为()

- A、 骨膜增生
- B、 骨质破坏

- C、死骨形成
- D、新生骨
- E、出现钙化

答案： B

24、CT 诊断慢性骨髓炎优于 X 线平片是()

- A、检出骨膜增生
- B、空间分辨率高
- C、检出骨质增生
- D、检出细小死骨
- E、检出血管增生

答案： D

25、短管状骨骨结核的典型()

- A、骨皮质破坏
- B、骨皮质增生
- C、破坏周围硬化
- D、骨膜增生
- E、骨气鼓

答案： E

26、关节结核的关节面破坏首先发生在()

- A、骨骺
- B、骨骺板
- C、干骺端
- D、关节持重部位
- E、关节非持重部位,滑膜附着处

答案： E

27、下述哪种肿瘤来源于骨髓组织()

- A、淋巴肉瘤
- B、骨髓瘤
- C、尤文肉瘤

D、 网状细胞肉瘤

E、 以上都是

答案： E

28、对于骨样骨瘤的 X 线诊断, 下述哪项是最重要:

A、 骨质增生

B、 发现瘤巢

C、 骨骼膨大

D、 骨膜反应

答案： B

29、关于骨巨细胞瘤的叙述, 错误的是:

A、 好发于长骨骨端

B、 常呈偏侧生长

C、 可为 良性或恶性

D、 不会出现分房状改变

答案： D

30、“恶性骨肿瘤”最常见的转移的部位是()

A、 脑

B、 骨骼

C、 肺

D、 脊椎

E、 肝脏

答案： C

31、肝癌在 CT 增强扫描的时间密度曲线上特征性表现为

A、 速升速降型

B、 速升缓降型

C、 缓升速降型

D、 缓升缓降型

答案： A

32、以下均为脾梗死的 CT 表现, 最典型的是

- A、 单发或多发片状低密度影, 无强化
- B、 三角形或楔形, 尖段指向脾门, 基底近脾背膜的低密度影, 无强化
- C、 脾内多发环形强化低密度灶
- D、 脾内多发渐进性强化低密度灶
- E、 脾脏增多大, 全脾密度降低

答案: B

33、下列哪种形态的胃属于不正常, 有病理意义的胃?

- A、 牛角形胃
- B、 瀑布形胃
- C、 皮革状胃
- D、 钩形胃

答案: C

34、消化道常用造影剂是

- A、 碘化油
- B、 泛影葡胺
- C、 优维显
- D、 医用硫酸钡

答案: D

35、下列哪项基本病变是消化道肿瘤的可靠 X 线征象?

- A、 龛影
- B、 憩室
- C、 粘膜平坦
- D、 充盈缺损

答案: D

36、恶性胃溃疡口部主要 X 线表现是

- A、 “环堤征”
- B、 “指压迹征”
- C、 “狭颈征”
- D、 “裂隙征”

答案： A

37、早期胃癌是指癌肿尚未侵及

- A、 黏膜层
- B、 黏膜下层
- C、 肌层
- D、 黏膜下层,且大小不超过 5mm

答案： C

38、结肠直肠癌说法错误的是

- A、 X线造影,增生型肿瘤表现为腔内出现不规则的充盈缺损,轮廓不整,病变多发生于病变一侧
- B、 浸润型表现为病变区肠管狭窄,常累及一小段肠管
- C、 溃疡型表现为肠腔内较大龛影
- D、 增生型及浸润型易引起肠梗阻
- E、 浸润型及溃疡型易引起肠梗阻

答案： E

39、小肠绞窄性肠梗阻 X线表现不正确的是

- A、 有假肿瘤征
- B、 出现小跨度卷曲肠袢
- C、 空回肠换位征
- D、 咖啡豆征
- E、 结肠积气征。

答案： E

40、诊断肠梗阻的依据是

- A、 液平面
- B、 肠管扩张
- C、 蠕动消失
- D、 肠腔气体吸收减少
- E、 肠管扩张和液平面

答案： E

41、关于肠梗阻, 错误的是

- A、 肠内容物不能正常运行、顺利通过肠道, 称为肠梗阻
- B、 肠梗阻分为机械性、动力性和血运性三类
- C、 平片示肠腔内多个液平面, 液平面相互间呈阶梯状排列, 此征象为单纯性小肠梗阻特征性表现
- D、 绞窄性肠梗阻最常见的原因是小肠扭转
- E、 麻痹性肠梗阻常见于小肠扭转

答案: E

42、() 以下关于输尿管结石的认识, 正确的是()

- A、 典型临床症状为无痛性肉眼血尿
- B、 KUB 上, 典型结石表现为三角形致密影
- C、 结石的长轴与输尿管走行一致, 为其特征
- D、 结石均造成上方尿路明显扩张积水
- E、 X 线尿路造影检查对输尿管结石无诊断价值

答案: C

43、() 在肾脓肿成熟期, CT 检查最具特征的表现()

- A、 低密度肿块, 轻度不规则强化
- B、 水样低密度病变并周边环状明显强化
- C、 病变延伸至肾周间隙
- D、 肾周脂肪密度增高
- E、 肾筋膜增厚

答案: B

44、泌尿系结核, 下列说法错误的是:

- A、 肾结核绝不出现钙化
- B、 多为继发性
- C、 肾结核绝大多数由血源性感染引起
- D、 输尿管结核多继发于肾结核
- E、 膀胱结核多继发于肾结核

答案: A

45、膀胱壁突入腔内的软组织密度肿块,呈菜花、结节、分叶或不规则,增强扫描明显强化,考虑多为:

- A、 膀胱癌
- B、 膀胱结石
- C、 膀胱憩室
- D、 膀胱憩室并憩室内结石
- E、 神经性膀胱功能障碍

答案: A

46、脑脓肿影像学表现有()

- A、 片状长 T1 长 T2 异常信号区
- B、 等信号环影
- C、 增强后明显环形强化
- D、 以上均是

答案: D

47、脑膜脑结核影像学表现有()

- A、 双侧大脑中动脉边缘毛糙
- B、 鞍上池塑形强化
- C、 脑内结节状强化
- D、 以上均是

答案: D

48、需与脑脓肿鉴别的疾病不包括()

- A、 结核性脑脓肿
- B、 脑胶质瘤
- C、 脑膜瘤
- D、 脑转移瘤

答案: C

49、CT 片上,常见生理钙化有()

- A、 大脑镰钙化
- B、 侧脑室脉络丛钙化

- C、 松果体钙化
- D、 以上均是

答案： D

50、关于鞍上池的描述, 正确的是()

- A、 五角星形
- B、 六角星形
- C、 水样低密度影
- D、 以上均是

答案： D

51、脑内血肿可表现为()

- A、 团块状高密度灶
- B、 明显占位效应
- C、 环状强化
- D、 以上均可

答案： D

52、脑出血最好发于()

- A、 基底节区
- B、 小脑
- C、 脑桥
- D、 枕叶

答案： A

53、蛛网膜下腔出血的 CT 表现为()

- A、 颅骨内板下梭形高密度影
- B、 颅骨内板下新月形高密度影
- C、 脑实质团块状高密度影
- D、 脑沟、脑池及大脑镰密度增高

答案： D

54、脑内 AVM 的影像学表现为()

- A、 团块状高信号病灶

- B、 结节状流空低信号病灶增强后有强化
- C、 扭曲异常血管团影伴病灶临近粗大血管影
- D、 病灶内钙化灶呈高信号影

答案： C

55、下列哪项不是脑梗塞的 CT 表现：

- A、 扇形低密度区
- B、 可呈等密度
- C、 有明显占位效应
- D、 扇形高密度

答案： D

56、脑内胶质瘤以下列那个肿瘤最常见：

- A、 少枝胶质细胞瘤
- B、 室管膜瘤
- C、 星形胶质细胞瘤
- D、 髓母细胞瘤

答案： C

57、脑胶质瘤 CT 扫描错误的表现是（ ）

- A、 混杂密度占位灶
- B、 瘤周水肿
- C、 负占位效应
- D、 瘤内钙化

答案： C

58、关于脑星形胶质细胞瘤影像学表现, 错误的是（ ）

- A、 混杂信号团块影
- B、 呈脑回状强化
- C、 花环状强化
- D、 以上均是

答案： B

59、有关星形胶质细胞瘤的描述, 哪项最正确（ ）

- A、多数病灶水肿不明显
- B、MRI 定性诊断准确性明显高于 CT
- C、花环状强化并壁结节是较特征性表现
- D、多数病灶边界清楚

答案： C

60、脑外最常见肿瘤有()

- A、脑膜瘤
- B、胶质瘤
- C、转移瘤
- D、动脉瘤

答案： A

61、提示肿瘤位于脑外的征象包括()

- A、白质塌陷征
- B、宽基底与脑膜相连
- C、颅骨改变
- D、以上均是

答案： D

62、脊髓损伤影像学表现错误的是()

- A、观察脊髓损伤以 CT 为好
- B、观察脊髓损伤以 MRI 为好
- C、髓内出血在 CT 上表现为高密度影
- D、出血在 MRI 上呈高信号灶

答案： A

63、正常成人右下肺动脉干宽径不超过

- A、15mm
- B、20mm
- C、25mm
- D、10mm

答案： A

64、在右上肺叶的内侧部分,副裂为一弧形条状阴影,呈纵形走向,凸面向外,止于肺门上方,呈一倒置的豆点状,称为:()。

- A、 下副叶。
- B、 奇叶。
- C、 右后副叶。
- D、 左中副叶。
- E、 左后副叶。

答案: B

65、心脏、升主动脉、主动脉弓部、气管、主支气管及其淋巴结、隆突下淋巴结、肺动脉、肺静脉、上下腔静脉、奇静脉近端、膈神经、迷走神经和胸导管上中段位于:()。

- A、 前纵隔。
- B、 中纵隔。
- C、 后纵隔。
- D、 上纵隔。
- E、 下纵隔。

答案: B

66、食道、降主动脉、胸导管中下段、奇静脉半奇静脉、交感神经链和淋巴结位于:()。

- A、 前纵隔。
- B、 中纵隔。
- C、 后纵隔。
- D、 上纵隔。
- E、 下纵隔。

答案: C

67、胸腺组织和淋巴结位于:()。

- A、 前纵隔。
- B、 中纵隔。
- C、 后纵隔。
- D、 上纵隔。

E、下纵隔。

答案： A

68、增殖性病变其病灶形状可以是

A、 结节状

B、 肿块状

C、 肺段或肺叶性密度增高影

D、 以上均是

答案： D

69、远侧的细支气管与肺泡间的交通小管,称为:()。

A、 LAMBERT 氏小管。

B、 KOHN 氏孔。

C、 MORGAGNI 氏孔。

D、 BOCHDALEKE 氏孔。

E、 MONRO 氏孔。

答案： A

70、叶间裂自膈内侧开始向上,向内斜形到肺门为一弧形细线条影,此叶位于下叶的前内部、呈楔状,底部靠膈,尖端指向肺门()。

A、 下副叶。

B、 奇叶。

C、 右后副叶。

D、 左中副叶。

E、 左后副叶。

答案： A

71、大叶性肺炎病后 12-24 小时为充血期,病区毛细血管扩张肺泡内有浆液性渗出液,其 X 线表现是()。

A、 实变阴影密度不均,病变呈散在,大小不一和分布不规则的斑片状阴影,以后有条索状阴影,最后恢复正常。

B、 病区呈一片密度均匀增深的阴影,形态与肺叶轮廓相符,其中可见空气支气管征。

C、 病区局限性肺纹理增强、增深,肺透亮度稍降低,病变位于下叶时,则同侧膈肌轻度升高,运动受限。

D、 病变区呈大片实影,其中有透亮区及液平区。

E、 病变区呈团块状致密阴影,边缘清楚,不规则。

答案: C

72、大叶性肺炎病后 2-3 天为红色肝变期,肺泡内充满粘稠渗出物,其中有纤维素及多量红细胞,病后 4-6 天为灰色肝变期,肺泡内红细胞减少,白细胞明显增加,其 X 线表现是: ()。

A、 实变阴影密度不均,病变呈散在,大小不一和分布不规则的斑片状阴影,以后有条索状阴影,最后恢复正常。

B、 病区呈一片密度均匀增深的阴影,形态与肺叶轮廓相符,其中可见空气支气管征。

C、 病区局限性肺纹理增强、增深,肺透亮度稍降低,病变位于下叶时,则同侧膈肌轻度升高,运动受限。

D、 病变区呈大片实影,其中有透亮区及液平区。

E、 病变区呈团块状致密阴影,边缘清楚,不规则。

答案: B

73、发病一周后,进入消散期,肺泡内纤维性渗出物溶解吸收,肺泡重新充气,其 X 线表现是: ()。

A、 实变阴影密度不均,病变呈散在,大小不一和分布不规则的斑片状阴影,以后有条索状阴影,最后恢复正常。

B、 病区呈一片密度均匀增深的阴影,形态与肺叶轮廓相符,其中可见空气支气管征。

C、 病区局限性肺纹理增强、增深,肺透亮度稍降低,病变位于下叶时,则同侧膈肌轻度升高,运动受限。

D、 病变区呈大片实影,其中有透亮区及液平区。

E、 病变区呈团块状致密阴影,边缘清楚,不规则。

答案: A

74、结核瘤常见 ()。

A、 爆米花样钙化。

B、 蛋壳状钙化。

C、 环形钙化。

D、梭状钙化。

E、带状钙化。

答案： C

75、肺转移瘤结节灶内出血是可表现为

A、毛刺征

B、兔耳征

C、血管造影征

D、晕轮征

答案： D

76、肿瘤性病变是：()。

A、肺泡腔内的空气被病理性物质(炎性渗出液、血液、水肿等)液所代替,形成片状影,边缘模糊,密度均匀。

B、肉芽组织增生引起的实变,病理为单核细胞,网织细胞以及幼稚的结缔组织增生,实变区与正常肺组织分界清楚,密度较高,多为腺泡结节状,没有融合趋势。

C、病变被纤维组织所代替,收缩形成密度高,边缘清楚的块状影,周围器官可被牵拉移位。

D、斑点状或块状致密阴影,边缘锐利,多发生于退行性变及坏死的组织内,也可见于肺内肿块及尘肺的淋巴结内。

E、良性病变多呈球形,边缘锐利光滑,恶性者边缘不规则,可有短毛刺伸出,可呈分叶状或脐样切迹。

答案： E

77、周围型肺癌的一种特殊表现,癌肿发生于肺段或亚肺段,癌肿本身体积小,其远端有阻塞性肺炎及肺不张,造影见阻塞性肺炎的近端支气管显示狭窄、中断,应考虑为：()。

A、纵隔型肺癌。

B、肺上沟癌。

C、细支气管癌。

D、肺段型肺癌。

E、肺转移癌。

答案： D

78、不符合气管异物的 X 线表现是()。

- A、 X 线不透过性异物,在声门下区及气管内,呈矢状位。在正位片上,仅见扁薄的侧面投影。
- B、 X 线不透过性异物,在声门下区及气管内呈冠状位,在正位片上,能见其最大宽度的阴影。
- C、 呼、吸两相,肺野透亮度变化小,呼气相时,两肺不能缩小,两肺透亮度仍保持较高。
- D、 胸部压力高,横隔上升轻微,深呼气相时,心影反比深吸气相时为小。

答案: B

79、不符合气管肿瘤的临床 X 线表现是()。

- A、 有明显的喘鸣音,严重者可出现呼吸困难,并有咳嗽,咯血等,气管下 1/3 肿瘤,可引起一侧支气管阻塞,接近声门者可有声嘶
- B、 胸片可无阳性所见或仅有两侧阻塞性肺气肿或一侧肺不张
- C、 肺纹理增强,并可见杵状指或囊状透明阴影
- D、 侧位高千伏摄影,可显示凸出气管腔内肿块阴影

答案: C

80、不符合矽肺的 X 线表现是()。

- A、 肺内散在圆心、椭圆形不规则形细点状阴影,1~5MM 左右,多在两肺中下野中内侧带,肺尖和肺外带少见。
- B、 晚期矽结节聚合和融合成块状,密度均匀,在肺上野,对称呈“八字形”。
- C、 肺纹理增多呈网状,边缘不整,扭曲。
- D、 双肋膈角区无 KERLEY 氏 B 线。

答案: D

81、()正常腹段输尿管走行在()。

- A、 腰方肌前缘
- B、 腰大肌前缘
- C、 腰椎横突前缘
- D、 腰小肌前缘
- E、 腰椎椎体前缘

答案: B

82、()关于正常肾脏 MRI 非增强检查表现,以下认识正确的是()。

- A、 T1WI 上, 肾皮质信号强度高于髓质
- B、 T1WI 上, 肾皮质信号强度低于髓质
- C、 T1WI 上, 肾皮质与髓质信号强度相同
- D、 预饱和脂肪抑制 T1WI 上, 肾皮质信号强度低于髓质
- E、 T2WI 上, 肾皮质信号强度高于髓质

答案: A

83、() 马蹄肾呈“U”字型, 其开口通常指向()。

- A、 上方
- B、 下方
- C、 前方
- D、 后方
- E、 左或右方

答案: A

84、() CT 检查时, 透明细胞型肾癌最具特征性表现是()

- A、 平扫 CT 呈混杂密度肿块
- B、 肿块常突向肾外, 致肾轮廓发生变形
- C、 肿块内有点状或弧线状钙化
- D、 三期增强检查, 肿块强化呈“快进快出”表现类型
- E、 发生肾静脉和下腔静脉瘤栓

答案: D

85、CT 检查时, 下述关于肾单纯性囊肿表现正确的是:

- A、 绝不突向肾外
- B、 囊壁不规则
- C、 囊壁常有钙化
- D、 圆形水样低密度影, 无强化
- E、 圆形高密度影, 有强化

答案: D

86、心脏 X 线检查常采用的检查体位有

- A、 后前位

- B、 斜位
- C、 侧位
- D、 以上全是

答案： D

87、我国成人正常后前位心胸比值的最大值不超过

- A、 0.50
- B、 0.40
- C、 0.60
- D、 0.70

答案： A

88、判断左心房增大的最佳体位为

- A、 后前位
- B、 左前斜位
- C、 左侧位
- D、 右前斜位

答案： B

89、下述 X 线征象哪项是左心房增大的可靠指征？

- A、 食道受压移位
- B、 右心室漏斗部和肺动脉段凸起
- C、 鹿角征和 Kerley 氏线
- D、 双重阴影和双弧影

答案： C

90、以下哪种心脏疾病可呈悬垂小心脏

- A、 扩心病
- B、 肺心病
- C、 限制型心肌病
- D、 常见型四联症

答案： B

91、肺源性心脏病最常见的原因是

- A、慢性支气管炎、肺气肿
- B、胸膜增厚粘连
- C、肺结核
- D、机化性肺炎

答案： A

92、左心室增大的常见病因有

- A、房间隔缺损
- B、室间隔缺损
- C、高血压病
- D、肺心病

答案： C

93、关于风心病二尖瓣狭窄 X 线征象哪一项是错误的见

- A、左房增大
- B、右室增大,肺动脉段突出
- C、肺淤血、肺水肿
- D、左室增大,主动脉结增宽

答案： D

94、哪种先天性心脏病肺血减少

- A、房间隔缺损
- B、法鲁氏三联症
- C、动脉导管未闭
- D、艾森曼格氏综合征

答案： B

95、女性, 45 岁, 主诉呼吸困难、咯血, 查体: 心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音, 临床诊断风湿性心脏病伴二尖瓣狭窄, X 线表现为

- A、右房、右室增大
- B、左房、右室增大
- C、左房、左室增大
- D、右房、左室增大

答案： B

96、房间隔缺损 X 线表现

- A、 右房、右室增大
- B、 左房、右室增大
- C、 左房、左室增大
- D、 右房、左室增大

答案： A

97、男性, 23 岁, 低热, 右胸刺痛, 活动后气促, 胸片上: 右肺下野有大片致密阴影, 上缘呈反抛物线状, 该侧肋膈角, 横膈被遮盖, 应诊断为()。

- A、 右下肺大叶性肺炎
- B、 右下肺不张
- C、 右侧渗出性胸膜炎
- D、 右下肺脓疡

答案： C

98、50 岁, 男性, 发热咳嗽, 右肺中叶有点片状阴影, 边缘模糊, 密度不均匀, 经抗炎治疗, 复查, 该影在同一部位反复出现, 应考虑为()。

- A、 病毒性肺炎
- B、 干酪性肺炎
- C、 阻塞性肺炎
- D、 支原体肺炎

答案： C

99、可以直接显示韧带及关节内软骨的影像学检查方法有:

- A、 关节造影
- B、 体层摄影
- C、 平片
- D、 MRI

答案： D

100、() 以下关于输尿管结石的认识, 正确的是()

- A、 典型临床症状为无痛性肉眼血尿

- B、 KUB 上, 典型结石表现为三角形致密影
- C、 结石的长轴与输尿管走行一致, 为其特征
- D、 结石均造成上方尿路明显扩张积水
- E、 X 线尿路造影检查对输尿管结石无诊断价值

答案: C

101、脑脓肿影像学表现有()

- A、 片状长 T1 长 T2 异常信号区
- B、 等信号环影
- C、 增强后明显环形强化
- D、 以上均是

答案: D

102、需与脑脓肿鉴别的疾病不包括()

- A、 结核性脑脓肿
- B、 脑胶质瘤
- C、 脑膜瘤
- D、 脑转移瘤

答案: C

103、关于鞍上池的描述, 正确的是()

- A、 五角星形
- B、 六角星形
- C、 水样低密度影
- D、 以上均是

答案: D

104、脑出血最好发于()

- A、 基底节区
- B、 小脑
- C、 脑桥
- D、 枕叶

答案: A

105、脑内 AVM 的影像学表现为()

- A、 团块状高信号病灶
- B、 结节状流空低信号病灶增强后有强化
- C、 扭曲异常血管团影伴病灶临近粗大血管影
- D、 病灶内钙化灶呈高信号影

答案： C

106、关于脑星形胶质细胞瘤影像学表现,错误的是()

- A、 混杂信号团块影
- B、 呈脑回状强化
- C、 花环状强化
- D、 以上均是

答案： B

107、脑外最常见肿瘤有()

- A、 脑膜瘤
- B、 胶质瘤
- C、 转移瘤
- D、 动脉瘤

答案： A

108、脊髓损伤影像学表现错误的是()

- A、 观察脊髓损伤以 CT 为好
- B、 观察脊髓损伤以 MRI 为好
- C、 髓内出血在 CT 上表现为高密度影
- D、 出血在 MRI 上呈高信号灶

答案： A

109、蛛网膜下腔出血的 CT 表现为()

- A、 颅骨内板下梭形高密度影
- B、 颅骨内板下新月形高密度影
- C、 脑实质团块状高密度影
- D、 脑沟、脑池及大脑镰密度增高

答案： D

110、()正常腹段输尿管走行在()。

- A、 腰方肌前缘
- B、 腰大肌前缘
- C、 腰椎横突前缘
- D、 腰小肌前缘
- E、 腰椎椎体前缘

答案： B

111、()关于正常肾脏 MRI 非增强检查表现,以下认识正确的是()。

- A、 T1WI 上,肾皮质信号强度高于髓质
- B、 T1WI 上,肾皮质信号强度低于髓质
- C、 T1WI 上,肾皮质与髓质信号强度相同
- D、 预饱和脂肪抑制 T1WI 上,肾皮质信号强度低于髓质
- E、 T2WI 上,肾皮质信号强度高于髓质

答案： A

112、()马蹄肾呈“U”字型,其开口通常指向()。

- A、 上方
- B、 下方
- C、 前方
- D、 后方
- E、 左或右方

答案： A

113、()CT 检查时,透明细胞型肾癌最具特征性表现是()

- A、 平扫 CT 呈混杂密度肿块
- B、 肿块常突向肾外,致肾轮廓发生变形
- C、 肿块内有点状或弧线状钙化
- D、 三期增强检查,肿块强化呈“快进快出”表现类型
- E、 发生肾静脉和下腔静脉瘤栓

答案： D

114、怀疑肾动脉狭窄首选的 X 线检查方法是肾动脉造影。

答案： 正确

115、输尿管结石绝大多数是由肾结石下移而来。

答案： 正确

116、膀胱结石的临床表现为尿痛、尿流中断、尿频、尿急和血尿等。

答案： 正确

117、肾结核不发生钙化灶病变。

答案： 错误

118、肝脏螺旋 CT 多期扫描于静脉高压注射对比剂后 70-90 秒, 获得动脉期 CT 图像。

答案： 错误

119、脾最常见的先天性异常是副脾。

答案： 正确

120、胰腺癌好发部位是胰尾。

答案： 错误

121、炎性渗出液向邻近肺泡逐渐蔓延, 肺炎性渗出病灶边缘模糊不清。

答案： 错误

122、MRI 是可以直接显示韧带及关节内软骨的影像学检查方法。

答案： 正确

123、周围型肺癌, 所形成的空洞, 其 X 线特征是厚壁, 其中有大液平, 边缘模糊。

答案： 错误

124、() 在肾脓肿成熟期, CT 检查最具特征的表现是()

- A、 低密度肿块, 轻度不规则强化
- B、 水样低密度病变并周边环状明显强化
- C、 病变延伸至肾周间隙
- D、 肾周脂肪密度增高

E、肾筋膜增厚

答案： B

125、CT 片上, 常见生理钙化有()

- A、 大脑镰钙化
- B、 侧脑室脉络丛钙化
- C、 松果体钙化
- D、 以上均是

答案： D

126、脑内血肿可表现为()

- A、 团块状高密度灶
- B、 明显占位效应
- C、 环状强化
- D、 以上均可

答案： D

127、蛛网膜下腔出血的 CT 表现为()

- A、 颅骨内板下梭形高密度影
- B、 颅骨内板下新月形高密度影
- C、 脑实质团块状高密度影
- D、 脑沟、脑池及大脑镰密度增高

答案： D

128、脑胶质瘤 CT 扫描错误的表现是()

- A、 混杂密度占位灶
- B、 瘤周水肿
- C、 负占位效应
- D、 瘤内钙化

答案： C

129、有关星形胶质细胞瘤的描述, 哪项最正确()

- A、 多数病灶水肿不明显
- B、 MRI 定性诊断准确性明显高于 CT

- C、花环状强化并壁结节是较特征性表现
- D、多数病灶边界清楚

答案： C

130、提示肿瘤位于脑外的征象包括()

- A、白质塌陷征
- B、宽基底与脑膜相连
- C、颅骨改变
- D、以上均是

答案： D

131、脑出血最好发于()

- A、基底节区
- B、小脑
- C、脑桥
- D、枕叶

答案： A

132、()正常腹段输尿管走行在()。

- A、腰方肌前缘
- B、腰大肌前缘
- C、腰椎横突前缘
- D、腰小肌前缘
- E、腰椎椎体前缘

答案： B

133、()关于正常肾脏 MRI 非增强检查表现,以下认识正确的是()。

- A、T1WI 上,肾皮质信号强度高于髓质
- B、T1WI 上,肾皮质信号强度低于髓质
- C、T1WI 上,肾皮质与髓质信号强度相同
- D、预饱和脂肪抑制 T1WI 上,肾皮质信号强度低于髓质
- E、T2WI 上,肾皮质信号强度高于髓质

答案： A

134、()马蹄肾呈“U”字型,其开口通常指向()。

- A、 上方
- B、 下方
- C、 前方
- D、 后方
- E、 左或右方

答案: A

135、()CT检查时,透明细胞型肾癌最具特征性表现是()

- A、 平扫CT呈混杂密度肿块
- B、 肿块常突向肾外,致肾轮廓发生变形
- C、 肿块内有点状或弧线状钙化
- D、 三期增强检查,肿块强化呈“快进快出”表现类型
- E、 发生肾静脉和下腔静脉瘤栓

答案: D

136、CT检查时,下述关于肾单纯性囊肿表现正确的是:

- A、 绝不突向肾外
- B、 囊壁不规则
- C、 囊壁常有钙化
- D、 圆形水样低密度影,无强化
- E、 圆形高密度影,有强化

答案: D

137、心脏X线检查常采用的检查体位有

- A、 后前位
- B、 斜位
- C、 侧位
- D、 以上全是

答案: D

138、我国成人正常后前位心胸比值的最大值不超过

- A、 0.50

B、 0.40

C、 0.60

D、 0.70

答案： A

139、判断左心房增大的最佳体位为

A、 后前位

B、 左前斜位

C、 左侧位

D、 右前斜位

答案： B

140、下述 X 线征象哪项是左心房增大的可靠指征？

A、 食道受压移位

B、 右心室漏斗部和肺动脉段凸起

C、 鹿角征和 Kerley 氏线

D、 双重阴影和双弧影

答案： C

141、以下哪种心脏疾病可呈悬垂小心脏

A、 扩心病

B、 肺心病

C、 限制型心肌病

D、 常见型四联症

答案： B

142、肺源性心脏病最常见的原因是

A、 慢性支气管炎、肺气肿

B、 胸膜增厚粘连

C、 肺结核

D、 机化性肺炎

答案： A

143、左心室增大的常见病因有

- A、 房间隔缺损
- B、 室间隔缺损
- C、 高血压病
- D、 肺心病

答案： C

144、关于风心病二尖瓣狭窄 X 线征象哪一项是错误的见

- A、 左房增大
- B、 右室增大, 肺动脉段突出
- C、 肺淤血、肺水肿
- D、 左室增大, 主动脉结增宽

答案： D

145、哪种先天性心脏病肺血减少

- A、 房间隔缺损
- B、 法鲁氏四联症
- C、 动脉导管未闭
- D、 艾森曼格氏综合征

答案： B

146、女性, 45 岁, 主诉呼吸困难、咯血, 查体: 心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音, 临床诊断风湿性心脏病伴二尖瓣狭窄, X 线表现为

- A、 右房、右室增大
- B、 左房、右室增大
- C、 左房、左室增大
- D、 右房、左室增大

答案： B

147、房间隔缺损 X 线表现

- A、 右房、右室增大
- B、 左房、右室增大
- C、 左房、左室增大
- D、 右房、左室增大

答案： A

148、男性, 23 岁, 低热, 右胸刺痛, 活动后气促, 胸片上: 右肺下野有大片致密阴影, 上缘呈反抛物线状, 该侧肋膈角, 横膈被遮盖, 应诊断为()。

- A、 右下肺大叶性肺炎
- B、 右下肺不张
- C、 右侧渗出性胸膜炎
- D、 右下肺脓疡

答案： C

149、50 岁, 男性, 发热咳嗽, 右肺中叶有点片状阴影, 边缘模糊, 密度不均匀, 经抗炎治疗, 复查, 该影在同一部位反复出现, 应考虑为()。

- A、 病毒性肺炎
- B、 干酪性肺炎
- C、 阻塞性肺炎
- D、 支原体肺炎

答案： C

150、脾最常见的先天性异常是副脾。

答案： 正确

151、胰腺癌好发部位是胰尾。

答案： 错误

152、炎性渗出液向邻近肺泡逐渐蔓延, 肺炎性渗出病灶边缘模糊不清。

答案： 错误

153、MRI 是可以直接显示韧带及关节内软骨的影像学检查方法。

答案： 正确

154、周围型肺癌, 所形成的空洞, 其 X 线特征是厚壁, 其中有大液平, 边缘模糊。

答案： 错误

155、怀疑肾动脉狭窄首选的 X 线检查方法是肾动脉造影。

答案： 正确

156、输尿管结石绝大多数是由肾结石下移而来。

答案： 正确

157、膀胱结石的临床表现为尿痛、尿流中断、尿频、尿急和血尿等。

答案： 正确

158、肾结核不发生钙化灶病变。

答案： 错误

159、肝脏螺旋 CT 多期扫描于静脉高压注射对比剂后 70-90 秒, 获得动脉期 CT 图像。

答案： 错误