

## 医学超声影像学

1、肝左、右叶的分界标志是

A、

肝右静脉

B、

肝中静脉

C、

肝左静脉

D、

门静脉矢状部

E、

门静脉横部

答案： B

2、肝左外叶、左内叶的分界标志为

A、

门静脉矢状部

B、

门静脉左支横部

C、

肝左静脉

D、

肝中静脉

E、

肝右静脉

答案： A

**3、关于肝脏超声测量，叙述错误的是？**

A、

右叶肋下斜径测量必须显示肝中静脉汇入下腔静脉

B、

右叶肋下斜径正常测值 10-14CM，左叶前后径 4-8CM

C、

左叶前后径测量切面为经腹主动脉矢状切面

D、

重复测量，测值可有一定差异

E、

测量时注意要包括肝脏包膜

答案： A

**4、不属于门脉性肝硬化典型声像图表现的是**

A、

肝实质回声增粗

B、

肝表面不平整

C、

门静脉主干扩张

D、

肝静脉扩张

E、

腹水

答案： D

5、血吸虫病性肝硬化声像图特点是

A、

地图状改变

B、

腹水

C、

肝内胆管扩张

D、

肝静脉增宽

E、

门静脉明显增宽

答案： A

**6、脂肪肝声像图不表现为**

A、

肝肿大

B、

远区声衰减

C、

血管走向不清

D、

肝内回声减弱

E、

肝回声细密

答案： D

**7、不符合肝癌典型声像图表现的是**

A、 驼峰征

B、 声晕

C、

门静脉癌栓

D、

肝脏缩小

E、 血管环绕征

答案： D

**8、小肝癌的回声类型，最多见的是**

A、 低回声

B、 等回声

C、 高回声

D、 混合回声

E、 强回声

答案： A

**9、靶环征多见于**

A、

肝腺瘤

B、

继发性肝癌

- C、 肝脓肿
- D、 原发性肝癌
- E、  
肝血管瘤

答案： B

10、不属于肝血管瘤声像图表现的是

- A、  
边界呈浮雕样
- B、 边缘声晕
- C、  
内部呈筛网状
- D、  
周边裂隙征
- E、  
高回声多见

答案： B

11、超声发现多囊肝病变时，应注意观察

A、

肝静脉和门静脉

B、

肾和脾

C、

卵巢

D、

心和大血管

E、

胃肠

答案： B

12、胆囊穿孔的常见部位为

A、

底部

B、

体部

C、

颈部

D、

漏斗部

E、

胆囊管

答案： A

13、胆囊结石易嵌顿于

A、

底部

B、

体部

C、

颈部

D、

漏斗部

E、

胆囊管

答案： C



14、胆囊结石不可能表现为

A、

后方不伴有声影

B、

不随体位改变而移动

C、

漂浮在胆汁中

D、

低回声

E、

强回声

答案： C

15、胆囊壁节段性增厚，内有多个小暗区，胆囊收缩功能亢进，可断为

A、

胆囊癌

B、

胆囊壁水肿

C、

急性胆囊炎

D、

胆囊腺肌症

E、 胆囊息肉

答案： D

16、胆囊结晶后方常可伴有

A、

旁瓣效应

B、

部分容积效应

C、

混响效应

D、 振铃效应

E、

镜像伪像

答案： D

17、胰腺分成哪四部分

A、

胰头、胰颈、胰体、胰尾

B、

胰头、胰腺钩突、胰体、胰尾

C、

胰头、胰颈、胰腺钩突、胰尾

D、

胰头、胰颈、胰体、胰腺钩突

E、

胰颈、胰腺钩突、胰体、胰尾

答案： A

18、胰体厚度测量以（）为准

A、

下腔静脉前方

B、

腹主动脉前方

C、

脾静脉前方

D、

腹主动脉或脊柱左缘

E、 脊柱右缘

答案： B

19、识别胰腺的重要标志是

A、

下腔静脉

B、

腹主动脉

C、

脾静脉

D、

腹主动脉或脊柱

E、

肠系膜上动脉

答案： C

20、不属于慢性胰腺炎的超声表现

A、

胰管扩张

B、

胰管结石

C、

大多数情况下胰腺实质回声减低

D、

胰腺假性囊肿

E、

胰腺回声增高

答案： C

**21、胰腺头癌的超声表现有**

A、

胰头部实质性肿块

B、

主胰管扩张

C、

胆系扩张

D、

腹膜后淋巴结肿大

E、

以上都是

答案： E

22、副脾不需要与哪个疾病鉴别

A、

脾门区淋巴结肿大

B、

脾门处动脉瘤

C、

胰尾部癌

D、

脾囊肿

E、 肾上腺肿瘤

答案： D

23、脾脏最常用的检查体位是

A、

右侧卧位

B、

仰卧位

C、

左侧卧位

D、

俯卧位

E、

膝胸卧位

答案： A

#### 24、胃分成哪四部分

A、

贲门部、胃底部、胃体部、胃窦部

B、

贲门部、胃底部、胃体部、胃角部

C、

贲门部、胃角部、胃体部、胃窦部

D、

贲门部、胃底部、胃角部、胃窦部

E、

贲门部、胃底部、胃体部、幽门部

答案： A

25、十二指肠溃疡好发于

A、

球部

B、

降部

C、

水平部

D、

升部



E、 大乳头附近

答案： A

**26、胃壁层次中呈低回声的是哪几层**

A、

浆膜层和黏膜层

B、

固有肌层和黏膜肌层

C、

浆膜层和固有肌层

D、

黏膜层和黏膜下层

E、

黏膜层和固有肌层

答案： B

**27、早期胃癌是指**

A、

癌组织限于黏膜层和黏膜下层无论有无淋巴结转移

B、

癌组织限于黏膜层、黏膜下层、固有肌层，有淋巴结转移

C、

癌组织限于黏膜层、黏膜下层、浆膜层，无淋巴结转移

D、

癌组织限于黏膜层、黏膜下层、固有肌层，无淋巴结转移

E、

癌组织限于黏膜层，无论有无淋巴结转移

答案： E

28、假肾征可以见于下列哪个疾病

A、

大肠癌

B、

肠息肉

C、

结肠炎

D、

直肠间质瘤

E、 肠套叠

答案： A

**29、肠梗阻超声表现**

A、

肠管扩张

B、

肠粘膜水肿，增厚

C、

机械性肠梗阻可见肠蠕动增强

D、

部分肠粘膜呈鱼刺征或琴键征

E、 以上都是

答案： E

**30、肾窦结构不包括：**

A、

肾盏

B、

肾血管分支

C、

肾锥体

D、

肾窦脂肪

E、 肾盂

答案： C

**31、肾积水与多发肾囊肿的超声鉴别要点是？**

A、 暗区大小

B、 暗区数目

C、 暗区连通

D、 肾形大小

E、 肾实质回声

答案： C

**32、应和女性膀胱憩室鉴别的是**

A、 卵巢囊肿

B、 异位妊娠

C、 盆腔炎性病变

D、 子宫肿瘤

E、 卵巢癌

答案： A

**33、超声诊断睾丸扭转的主要依据是**

A、 睾丸肿大

- B、 辜丸内出现异常暗区
- C、 辜丸内无血流信号
- D、 辜丸鞘膜积液
- E、 辜丸位置

答案： C

**34、肾内围绕集合系统回声较低的结构是**

- A、 肾柱
- B、 肾皮质
- C、 肾锥体
- D、 肾小盏
- E、 肾大盏

答案： C

**35、前列腺内弧形强回声整齐排列于内外腺之间,应首先想到**

- A、 前列腺癌
- B、 慢性前列腺炎
- C、 前列腺结石
- D、 前列腺肉瘤
- E、 前列腺增生

答案： C

**36、确定房间隔缺损的理想切面是:**

- A、 主动脉根部短轴切面
- B、 剑突下四腔心
- C、 左室长轴切面
- D、 心尖四腔心切面
- E、 心尖二腔心切面

答案： B

**37、二尖瓣后叶 M 超表现为:**

- A、 “M” 形
- B、 “W” 形

- C、 “方盒” 形
- D、 “直线” 形
- E、 六边形

答案： B

**38、室间隔缺损最多见的部位是**

- A、 漏斗部
- B、 膜部
- C、 隔瓣下
- D、 肌部
- E、 中央型

答案： B

**39、测量二瓣口血流频谱的较理想切面是**

- A、 左室长轴切面
- B、 二尖瓣水平左室短轴切面
- C、 心尖四腔心
- D、 主动脉根部短轴切面
- E、 心底大动脉短轴切面

答案： C

**40、动脉导管未闭病人主动脉根部短轴切面 CDFI 显示,可见**

- A、 红色为主多彩血流束,位于 PA 外侧
- B、 红色为主多彩血流束,位于 PA 内侧
- C、 蓝色血流束,位于 PA 内侧
- D、 蓝色血流束,位于 PA 外侧
- E、 五彩镶嵌的血流束,位于 PA 内侧

答案： A

**41、在我国瓣膜病变最常见的原因是**

- A、 先天性
- B、 风湿性
- C、 退行性

D、亚急性细菌性心内膜炎

E、心梗并发症

答案： B

42、以下属于正常二尖瓣口面积为

A、 4 cm<sup>2</sup>

B、 3 cm<sup>2</sup>

C、 2 cm<sup>2</sup>

D、 1 cm<sup>2</sup>

E、 1.5cm<sup>2</sup>

答案： A

43、非对称性室间隔肥厚见于

A、 高心病

B、 主动脉瓣狭窄

C、 肥厚型心肌病

D、 冠心病

E、 肺心病

答案： C

44、大心腔小瓣口见于

A、 高心病

B、 肥心病

C、 扩心病

D、 冠心病

E、 肺心病

答案： C

45、节段性室壁运动异常见于

A、 高心病

B、 肥心病

C、 扩心病

D、 冠心病

E、肺心病

答案： D

**46、眼球轴径 27mm, 提示**

A、眼球外伤

B、眼球萎缩

C、眼球肿瘤

D、近视眼

E、远视眼

答案： D

**47、位于玻璃体前半部的半环状光带, 首先考虑**

A、糖尿病眼底出血

B、视网膜前部脱离

C、晶状体脱位

D、脉络膜脱离

E、玻璃体机化物

答案： D

**48、子宫内膜异位形成**

A、巧克力囊肿

B、皮样囊肿

C、黄素囊肿

D、黄体囊肿

E、单纯性囊肿

答案： A

**49、正常妊娠前 3 个月常合并有**

A、卵泡囊肿

B、黄体囊肿

C、黄素囊肿

D、赘生性囊肿

E、巧克力囊肿



答案： B

50、子宫内膜厚经约 11mm, 且周边可见低回声带, 为月经周期的

- A、 分泌期
- B、 增殖期
- C、 月经期
- D、 排卵期
- E、 黄体期

答案： A

51、双泡征见于胎儿哪种畸形

- A、 食管闭锁
- B、 十二指肠闭锁
- C、 回肠闭锁
- D、 结肠闭锁
- E、 肛门闭锁

答案： B

52、哪项不是卵巢非赘生性囊肿

- A、 滤泡囊肿
- B、 黄体囊肿
- C、 黄素囊肿
- D、 巧克力囊肿
- E、 卵巢纤维瘤

答案： E

53、子宫粘膜下肌瘤需要与以下疾病鉴别

- A、 子宫内膜息肉
- B、 卵巢囊肿
- C、 异位妊娠
- D、 宫颈囊肿
- E、 巧克力囊肿

答案： A

54、前置胎盘一般在几周后可以诊断

- A、 20 周
- B、 30 周
- C、 32 周
- D、 35 周
- E、 25 周

答案： C

55、M 型图像的最大优势是

- A、 侧向分辨力高
- B、 轴向分辨力高
- C、 对比分辨力高
- D、 横向分辨力高
- E、 时间分辨力高

答案： E

56、颈总、颈内、颈外动脉的血流阻力指数从大到小依次为

- A、 颈总>颈内>颈外
- B、 颈外>颈内>颈总
- C、 颈外>颈总>颈内
- D、 颈总> 颈外>颈内
- E、 颈内>颈总>颈外

答案： C

57、患者男性, 35 岁, 骑自行车外摔伤左季肋部疼痛一天入院, 入院查体左季肋部有压痛, 血压 120/70mmHg, 超声检查发现脾内有均质低回声区, 范围约 31x21mm, 边界欠清, 形态欠规则, 腹腔内未见明显游离液区。请问超声诊断是

- A、 脾包膜下血肿
- B、 脾中央型破裂
- C、 真性脾破裂
- D、 脾恶性肿瘤
- E、 以上都不是

答案： B

58、脂液分层见于

- A、 成熟畸胎瘤
- B、 粘液性囊腺瘤
- C、 浆液性囊腺瘤
- D、 盆腔炎性肿块
- E、 巧克力囊肿

答案： A

59、甲状腺弥漫性肿大伴疼痛, 超声发现内部回声不均, 包膜增厚与颈前肌粘连, 考虑

- A、 甲状腺癌
- B、 急性甲状腺炎
- C、 亚急性甲状腺炎
- D、 桥本氏病
- E、 甲亢

答案： C

60、超声测量双顶径的胎头平面为

- A、 侧脑室平面
- B、 丘脑平面
- C、 中脑平面
- D、 小脑平面
- E、 大脑平面

答案： B

61、胸水超声检查最常采取的体位是

- A、 左侧卧位
- B、 右侧卧位
- C、 坐位
- D、 仰卧位
- E、 俯卧位

答案： C

62、患者女性, 45 岁, 阴道不规则出血一周, 突发右下腹疼痛 5 小时, 超声检查发现右下腹混合回声包括, 边界欠清, 形态欠规则, 内部见短棒状血流信号, 盆腔见游离液性暗区, 化实验室检查尿 HCG 阳性, 请问超声诊断是

- A、 异位妊娠破裂型
- B、 异位妊娠未破裂型
- C、 异位妊娠流产型
- D、 异位妊娠陈旧型
- E、 以上都不是

答案： A

63、膀胱肿瘤的好发部位是

- A、 膀胱顶部
- B、 膀胱左侧壁
- C、 膀胱右侧壁
- D、 膀胱体部
- E、 膀胱三角

答案： E

64、心脏肿瘤中, 最常见的是

- A、 黏液瘤
- B、 畸胎瘤
- C、 横纹肌瘤
- D、 间叶细胞瘤
- E、 心包囊肿

答案： A

65、库肯勃瘤是:

- A、 良性卵巢肿瘤
- B、 原发于胃肠道卵巢转移性肿瘤
- C、 囊性肿瘤
- D、 子宫肌瘤红色变

E、纤维瘤

答案： B

**66、对超声波最敏感的组织是**

A、 甲状腺

B、 乳腺

C、 生殖腺

D、 胰腺

E、 唾液腺

答案： C

**67、乳腺纤维瘤的典型超声表现是**

A、 肿瘤常呈均匀低回声团,包膜完整、光滑,常伴侧壁声影

B、 内部回声不均匀

C、 内部常见微小钙化点

D、 内部常呈高回声

E、 内部血供非常丰富

答案： A

**68、下列哪一脏器不在腹膜后**

A、 胰

B、 肾上腺

C、 腹主动脉

D、 脾脏

E、 肾脏

答案： D

**69、中年女性,突发上腹疼痛,伴恶心、呕吐,超声显示胆囊多发结石,胰腺肿大,轮廓不清,回声减低,周围见少量液性暗区,最可能的诊断是**

A、 急性胰腺炎

B、 慢性胰腺炎

C、 急性胃炎

D、 急性胆囊炎

E、 急性胆管炎

答案： A

70、女, 40 岁, 间断无痛性血尿 1 年, 声像图示右肾中下部 6×5cm 中等偏低回声肿块, 边界清楚, 内部回声欠均匀, 肿块向肾表面隆起, 并推挤肾窦, 右肾静脉内实填。考虑诊断是

A、 肾血管平滑肌脂肪瘤

B、 肾母细胞瘤

C、 肾细胞癌

D、 肾盂癌

E、 肾腺瘤

答案： C

71、患者陈某, 有风湿性关节炎病史, 心脏听诊主动脉瓣区有舒张期杂音, X 线胸片示左心室扩大, 心电图示左心室高电压, 疑有主动脉瓣关闭不全, 用彩色多普勒技术检查应有什么表现?

A、 左心室在收缩期有血流射入肺动脉

B、 显示有血流从主动脉瓣口在舒张期流向左心室

C、 收缩期有血流从右心房流入右心室

D、 左心室在收缩期无血流射入主动脉

E、 收缩期有血流从左房流入左心室

答案： B

72、2 岁男孩, 突发性腹痛, 大便带血, 腹部可触及包块, 包块处探及多层强弱回声团, 呈“同心圆征”, 最可能诊断是

A、 肠套叠

B、 肠扭转

C、 小肠肿瘤

D、 急性阑尾炎

E、 坏死性小肠炎

答案： A

73、刘某,女,18岁,尿毒症,肾功能衰竭,超声发现颈前部甲状腺背侧有多个低回声结节,最可能是

- A、 颈淋巴结肿大
- B、 甲状腺腺瘤
- C、 结节性甲状腺肿
- D、 甲状旁腺增生
- E、 甲状旁腺腺瘤

答案: D

74、患者男性,70岁,反复血尿半年。超声检查膀胱内见一强回声团,直径2.5cm 后方伴声影,随体位改变而移动。其可能的诊断是

- A、 膀胱癌
- B、 膀胱憩室
- C、 膀胱结石
- D、 腺性膀胱炎
- E、 以上都不是

答案: C

75、赵某,女产后三个月,右侧乳房红肿、疼痛,超声显示:病变区回声紊乱,边界模糊、增厚,欠清晰,内有形态不规则无回声区。可能的诊断是

- A、 乳腺囊性增生
- B、 急性乳腺炎
- C、 乳腺囊肿
- D、 乳腺脓肿
- E、 炎性乳癌

答案: B

76、徐某,男,35岁,已婚,体检时超声显示,睾丸及附睾处各见一0.8cm 无回声区,圆形,边界光滑,它最可能是

- A、 鞘膜积液
- B、 睾丸、附睾炎

- C、 辜丸、附辜囊肿
- D、 阴囊血肿
- E、 辜丸、附辜肿瘤

答案： C

77、李某,男,无意中发现耳下区增大,无压痛,亦无明显不适,超声显示:耳下方见圆形无回声区,直径0.7cm,形态规则,后方回声增强,周围见腮腺组织,最有可能的诊断是

- A、 腮腺混合瘤
- B、 慢性腮腺炎
- C、 鳃裂囊肿
- D、 腮腺囊肿
- E、 颈淋巴结核

答案： D

78、一肝癌患者行肝动脉栓塞术后二天,左上腹疼痛,超声检查显示脾脏肿大,中下部见楔形低回声区,尖端指向脾门,其内彩色多普勒超声未记录到血流信号,最可能诊断是

- A、 转移癌
- B、 脾结核
- C、 炎性病灶
- D、 脾梗塞
- E、 恶性淋巴瘤

答案： D

79、王某,男性,12岁,突然发现阴囊肿胀、剧疼。超声显示:辜丸轻度肿大,中等回声,2-3小时后复查辜丸回声尚均匀,辜丸内血流消失。该病应是

- A、 辜丸炎及附辜炎
- B、 阴囊血肿
- C、 鞘膜积液
- D、 辜丸扭转
- E、 斜疝绞窄

答案： D



80、男性患者, 37 岁, 既往有肝炎史, 超声发现脾脏显著肿大, 肝表面不光滑, 肝实质回声不均匀。右肝可见 3cm 的圆形病变, 边缘整齐光滑, 有弱回声晕, 内部为均匀低回声, 诊断最可能是

- A、 慢性肝炎
- B、 慢性肝炎合并肝硬化
- C、 肝硬化合并肝囊肿
- D、 肝硬化合并肝肿瘤
- E、 肝硬化合并门静脉高压

答案: D

81、患者出现右上腹疼、发热、白细胞升高, 超声检查胆囊明显增大, 内见粗斑点状不均匀非沉积性回声, 这可能提示为

- A、 胆囊癌
- B、 化脓性胆囊炎
- C、 单纯性胆囊炎
- D、 胆囊腺肌征
- E、 胆囊积血

答案: B

82、患者, 女, 30 岁, 尿频、尿急、尿痛一年, 声像图示右肾轻度肿大, 实质结构紊乱, 多个大小不等的规则液性腔及钙化灶, 部分液性腔相互通连并与扩张的肾盂沟通, 液性腔及肾盂壁不规则, 右输尿管全程扩张, 膀胱壁弥漫性增厚、僵硬, 容积明显缩小, 最可能诊断为

- A、 急性肾盂肾炎
- B、 肾结核
- C、 慢性肾盂肾炎
- D、 肾积水
- E、 肾囊肿

答案: B

83、患者男性, 32 岁, 突发性左季肋部绞痛 4 小时。无发热, 血象正常。尿常规: 红细胞 20~30 个。超声检查见左肾集合系统轻度分离, 该侧输尿管上段宽约

0.6cm,其远侧段显示不清。该病例不能除外

- A、 肾癌
- B、 急性肾盂肾炎
- C、 急性肾小球肾炎
- D、 输尿管结石
- E、 肾平滑肌脂肪瘤

答案： D

84、徐某,男,20岁,感冒后发现咽痛,颈前部肿大、疼痛,低烧、白细胞升高、血沉快。超声显示:甲状腺中度肿大,回声减低。最可能的诊断是

- A、 结节性甲状腺肿
- B、 原发性甲亢
- C、 甲状腺腺瘤
- D、 亚急性甲状腺炎
- E、 慢性甲状腺炎

答案： D

85、李某,女,30岁,无任何不适,超声检查显示:双乳多个圆形、椭圆形无回声区,边界光滑,后方回声增强,它最可能是

- A、 乳腺炎
- B、 乳腺囊肿
- C、 乳腺纤维腺瘤
- D、 乳腺癌
- E、 巨乳症

答案： B

86、患者,55岁,绝经5年后阴道流血一周,诊断性刮宫,病理为子宫内膜高分化腺癌,下列哪一项是错误的

- A、 超声检查肝脏、肾脏
- B、 经阴道超声检查判断肌层浸润深度

- C、 已有病理诊断,不需要再做经阴道子宫超声检查
- D、 超声检查观察是否累及宫颈
- E、 MRI 检查判断子宫肌层浸润深度

答案: C

87、患者男性,45岁,上腹不适2月伴体重下降,声像图显示胰头区不规则低回声实性肿块,边界不清,呈蟹足状,肠系膜上静脉轻度抬高,肝内外胆管扩张,主胰管内径4mm,最可能诊断是

- A、 胰岛细胞瘤
- B、 胰腺癌
- C、 腹膜后肿瘤
- D、 胆管癌
- E、 壶腹癌

答案: E

88、患者反复发热伴右上腹疼痛,超声检查示左肝管内数个大小不等的强回声团,前方与胆管壁之间见液性暗带,后方伴声影,提示诊断为

- A、 肝内钙化灶
- B、 肝内胆管积气
- C、 肝内胆管结石
- D、 胆管细胞肝癌
- E、 胆道蛔虫

答案: C

89、输卵管分为哪四部分

- A、 间质部、峡部、壶腹部、伞部
- B、 间质部、漏斗部、壶腹部、伞部
- C、 间质部、峡部、漏斗部、伞部
- D、 间质部、峡部、壶腹部、水平部
- E、 间质部、峡部、壶腹部、漏斗部

答案: A

90、子宫肌瘤根据于子宫肌壁的关系可以分为

- A、浆膜下肌瘤、肌壁间肌瘤、黏膜下肌瘤
- B、浆膜下肌瘤、肌壁间肌瘤、宫颈肌瘤
- C、浆膜下肌瘤、阔韧带肌瘤、黏膜下肌瘤
- D、阔韧带肌瘤、肌壁间肌瘤、黏膜下肌瘤
- E、黏膜下肌瘤、肌壁间肌瘤、宫颈肌瘤

答案： A

### 91、成熟畸胎瘤超声表现

- A、面团征
- B、壁立结节征
- C、杂乱结构征
- D、脂液分层征
- E、以上都是

答案： E

### 92、早孕期经腹扫查检查前准备

- A、适度充盈膀胱
- B、过度充盈膀胱
- C、检查前排空膀胱
- D、检查前无需准备
- E、检查前空腹

答案： A

### 93、开放性脊柱裂描述正确的是

- A、脊柱矢状切面见强回声线联系中断,横切面呈U型改变,裂口处见囊性包块,表面皮肤完整,颅脑无异常表现,常伴有羊水过多、足内翻等。
- B、脊柱矢状切面见强回声线联系中断,横切面呈U型改变,裂口处见囊性包块,表面皮肤缺失,颅脑无异常表现,常伴有羊水过多、足内翻等。
- C、脊柱矢状切面见强回声线联系中断,横切面呈U型改变,裂口处见囊性包块,表面皮肤完整,颅脑可见后颅窝池消失及小脑异常,常伴有羊水过多、足内翻等。

D、 脊柱矢状切面见强回声线联系中断,横切面呈 U 型改变,裂口处见囊性包块,表面皮肤缺失,颅脑可见后颅窝池消失及小脑异常,常伴有羊水过多、足内翻等。

E、 脊柱矢状切面见强回声线联系中断,横切面呈 U 型改变,裂口处见囊性包块,表面皮肤缺失,颅脑可见后颅窝池消失及小脑异常,常伴有羊水过少、足内翻等。

答案: D

#### 94、完全性葡萄胎超声表现

A、 子宫显著增大

B、 宫腔内见弥漫性分布的点状和小囊泡样回声,呈蜂窝状

C、 肌壁回声与蜂窝状回声分界清晰

D、 可呈暴风雪样回声

E、 以上都是

答案: E

#### 95、眼球玻璃体内“V”字形异常膜状回声,后端与视乳头相连,诊断

A、 部分性网脱

B、 完全性网脱

C、 完全性脉络膜脱离

D、 继发性网脱

E、 部分性脉络膜脱离

答案: B

#### 96、原发性网脱的常见原因

A、 高度近视

B、 眼外伤

C、 眼球手术

D、 眼球肿瘤

E、 老花眼

答案: A

#### 97、甲状腺癌最常见的病理类型是

- A、滤泡型
- B、乳头型
- C、髓样癌
- D、未分化型
- E、以上都不对

答案： B

**98、甲状腺弥漫性肿大,峡部显著增厚,考虑**

- A、甲亢
- B、单纯性甲状腺肿
- C、病毒性甲状腺炎
- D、自身免疫性甲状腺炎
- E、甲减

答案： D

**99、乳腺癌中声衰减最显著的病理类型为**

- A、硬癌
- B、乳头状癌
- C、腺癌
- D、髓样癌
- E、未分化癌

答案： A

**100、下列不属于甲状腺癌声像图的特点是**

- A、低回声声晕
- B、内部极低回声
- C、微小钙化
- D、颈部淋巴结肿大
- E、边界不清

答案： A