

外科学-题库

1、女性, 34 岁, 已婚, 停经 43 天, 右下腹剧痛并晕倒 1 小时。

- 一, 初步诊断:
- 二, 鉴别诊断:
- 三, 进一步检查:
- 四, 治疗原则:

答案:

一, 初步诊断: 1. 右侧输卵管妊娠破裂, 2. 失血性休克, 3. 继发性不孕

二, 鉴别诊断: 1. 黄体囊肿破裂

2. 卵巢囊肿蒂扭转或破裂

3. 急性阑尾炎

4. 急性输卵管炎

三, 进一步检查: 1. B 超检查

2. 阴道后穹窿穿刺或腹腔穿刺

3. 术前检查

四, 治疗原则: 1. 纠正休克

2. 同时剖腹探查

2、男性, 45 岁, 右侧巨大腹股沟斜疝修补术后第一天, 阴囊患侧肿大如成人拳, 疼痛, 下坠感明显, T:38.5℃, WBC15000, N86%, L12%, M2%, 最大可能是:(单选题)

- A、阴囊血肿
- B、睾丸鞘膜积液
- C、急性睾丸炎

- D、 术后感染
- E、 修补失败,斜疝复发

答案: A

3、腹部外伤的病人, X线腹部平片见腹膜后充气, 肾脏轮廓清晰, 考虑为:(单选题)

- A、 横结肠破裂
- B、 空肠破裂
- C、 胃破裂
- D、 十二指肠第三段破裂
- E、 乙状结肠破裂

答案: D

4、男性, 40岁, 上腹隐痛与饮食有关已5年, 此次突然上腹疼痛, 不敢深呼吸, 查体: 面色苍白, 上腹部明显压痛, 反跳疼及肌紧张, WBC:  $9500/\text{mm}^3$ , N: 80%, 为明确诊断, 首先应进行(单选题)

- A、 腹部立位平片
- B、 紧急钡餐透视
- C、 腹腔穿刺
- D、 急查血淀粉酶
- E、 紧急静脉胆道造影

答案: A

5、男性, 50岁, 确诊结肠肝曲癌, 行手术治疗, 应切除哪些范围为宜?(单选题)

- A、 距肿块上下缘为5cm
- B、 切除升结肠和横结肠各半
- C、 由回肠后20cm开始至右半横结肠段及所属系膜和淋巴结
- D、 由盲肠开始至右半横结肠段及所属系膜和淋巴结
- E、 保留回盲动脉, 由升结肠至右半横结肠切除

答案: C

6、门脉高压症时, 交通支均扩张, 临床上最重要的是:(单选题)

- A、 腹壁交通支
- B、 腹膜及交通支

- C、 直肠下端、肛管交通支
- D、 胃底、食道下段交通支
- E、 以上都不是

答案： D

**7、急性乳腺炎的病人,往往是初产妇,而且多发生在产后3~4周,重要原因是:(单选题)**

- A、 全身感染加局部抵抗力降低
- B、 乳汁的淤积加细菌的侵入
- C、 乳腺组织的发育不良
- D、 哺乳次数过多
- E、 乳分泌障碍

答案： B

**8、胃癌早期诊断的重要手段是:(单选题)**

- A、 X线钡餐检查
- B、 胃液细胞学检查
- C、 胃液分析
- D、 纤维胃镜检查
- F. 大便隐血检查

答案： D

**9、胆固醇结石好发于:(单选题)**

- A、 胆总管
- B、 B.左肝管
- C、 右肝管
- D、 胆囊
- E、 肝内胆管

答案： D

**10、患者左下肢静脉曲张已廿年,4年来小腿下1/3内侧并发溃疡,最积极的治疗方法是:(单选题)**

- A、 有效抗菌素
- B、 积极换药

- C、 弹性硼带
- D、 植皮
- E、 手术治疗静脉曲张

答案： E

11、对便血病人,作直肠指检是为了及早发现:(单选题)

- A、 内痔
- B、 炎性疾病
- C、 直肠癌
- D、 肛裂
- E、 肛瘘

答案： C

12、乳头溢血最常见于:(单选题)

- A、 乳癌
- B、 乳房囊性增生病
- C、 乳房结核
- D、 乳管内乳头状瘤
- E、 乳管内癌

答案： D

13、里脱( )氏疝时嵌顿的内容是:(单选题)

- A、 小肠的憩室
- B、 小肠壁的一部分
- C、 大网膜
- D、 盲肠、阑尾
- E、 几个肠袢

答案： A

14、手术诊断腹股沟斜疝的主要依据是:(单选题)

- A、 疝环在腹壁下动脉内侧
- B、 疝环在直疝三角内
- C、 疝囊颈在耻骨结节下方

D、 疝囊颈在腹壁下动脉外侧

E、 疝囊在腹股沟管内

答案： D

15、最易发生嵌顿的腹外疝是:(单选题)

A、 切口疝

B、 难复性疝

C、 滑动性疝

D、 股疝

E、 直疝

答案： D

16、急性化脓性腹膜炎的主要体征是:(单选题)

A、 腹式呼吸运动减弱或消失

B、 腹胀

C、 压痛和反跳痛

D、 腹肌紧张

E、 肠鸣音消失

答案： C

17、招致大出血的胃、十二指肠溃疡所在部位一般多见于:(单选题)

A、 幽门或十二指肠前壁

B、 胃小弯或十二指肠后壁

C、 胃大弯或十二指肠外侧壁

D、 胃底部或十二指肠球后壁

E、 贲门部或十二指肠前壁

答案： B

18、早期胃癌的概念是:(单选题)

A、 局限于胃窦内

B、 局限于粘膜或粘膜下层

C、 直径在 2cm 以内

D、 无淋巴结转移

E、 尚未侵及浆膜层

答案： B

**19、小肝癌的概念是(单选题)**

A、 直径<2cm

B、 直径<3cm

C、 直径<4cm

D、 直径<5cm

E、 直径<5~10cm

答案： D

**20、胃癌从哪条途径转移到左锁骨上?(单选题)**

A、 腔静脉

B、 主动脉

C、 通过肺

D、 直接扩散

E、 胸导管

答案： E

**21、中年女性,患Ⅱ期乳癌,应采取哪一治疗方案?(单选题)**

A、 乳房单切加放疗

B、 肿块切除加化疗

C、 乳房根治术加定期化疗

D、 扩大根治术

E、 姑息性切除术加放疗和化疗

答案： C

**22、门脉高压症时腹水形成的主要原因是:(单选题)**

A、 门脉压力增高

B、 白蛋白合成障碍

C、 醛固酮及抗利尿激素在体内增多

D、 球蛋白合成障碍

E、 以上都不是

答案： B

23、急性胆管炎的三联症状是:(单选题)

- A、 腹痛、寒战高热、黄疸
- B、 寒战高热、黄疸、腹痛
- C、 黄疸、寒战高热、腹痛
- D、 腹痛、恶心呕吐、食欲不振
- E、 发热、腹痛、恶心呕吐

答案： A

24、治疗胆道感染性休克的关键是:(单选题)

- A、 应用血管活性药物
- B、 纠正水、电解质代谢和酸硷平衡紊乱
- C、 应用氢化考的松
- D、 应用抗菌素
- E、 解除梗阻,胆道减压

答案： E

25、血栓闭塞性脉管炎的早期症状是:(单选题)

- A、 下肢疼痛
- B、 间歇性跛行
- C、 患肢毛发脱落
- D、 患肢趾甲搁置增厚
- E、 足背动脉搏动消失

答案： B

26、男性,警察,右下肢静脉曲张一年,检查者,给予大腿部扎一橡皮带,然后让病人快速用力屈伸膝关节 20 次,此时浅静脉曲张更明显,说明患者:(单选题)

- A、 下肢浅、深静脉交通支瓣膜闭锁不全
- B、 下肢浅、深静脉交通支瓣膜功能正常
- C、 大隐静脉入股静脉外瓣膜闭锁不全
- D、 下肢深静脉有阻塞
- E、 小隐深静脉瓣膜闭锁不全

答案： D

**27、上例治疗(单选题)**

- A、 大隐静脉高位结扎
- B、 大隐静脉高位结扎+抽剥术
- C、 浅、深静脉交通支结扎
- D、 抗凝、溶血治疗
- E、 以上都不是

答案： D

**28、继发性腹膜炎最为多见的病原菌是:(单选题)**

- A、 溶血性链球菌
- B、 葡萄球菌
- C、 大肠杆菌
- D、 变形杆菌
- E、 绿脓杆菌

答案： C

**29、穿孔性腹膜炎中最常见的是:(单选题)**

- A、 溃疡病穿孔
- B、 阑尾炎穿孔
- C、 肠伤寒穿孔
- D、 肠结核穿孔
- E、 腹部外伤穿孔

答案： B

**30、关于急性化脓性腹膜炎应用非手术治疗,下列哪项是 错误的?(单选题)**

- A、 原发性腹膜炎
- B、 已有局限的趋势
- C、 病因不明、病情不重的无紧急手术必要
- D、 急性胰腺炎
- E、 胆囊穿孔腹膜炎

答案： E



31、男，2岁，以右侧腹股沟完全性易复性斜疝收入院，最适宜的治疗方法是：(单选题)

- A、继续观察暂不治疗
- B、疝囊高位结扎术
- C、疝修补术
- D、疝成形术
- E、用疝带

答案： B

32、喉上神经内支损伤时：(单选题)

- A、声音嘶哑
- B、音调降低
- C、饮水呛咳
- D、呼吸困难
- E、失音

答案： C

33、男性，50岁，右侧甲状腺肿大，质硬，声音嘶哑，心率90次/分，应首先考虑为：(单选题)

- A、甲状腺功能亢进
- B、甲状腺腺瘤
- C、结节性甲状腺肿
- D、甲状腺癌
- E、慢性甲状腺炎

答案： D

34、男性，行Bassini氏疝修补术，手术结束后，精索的位置应是在：(单选题)

- A、原位不变
- B、腹内斜肌与腹横筋膜之间
- C、皮下与腹外斜肌腱膜之间
- D、腹外斜肌腱膜与腹内斜肌之间
- E、以上都不是

答案： D

35、肝破裂, 8、9 肋骨骨折, P:106 次/分, Bp:90/60mmHg, Hb:9.0g%, 适当的治疗是:(单选题)

- A、 吸 O<sub>2</sub>, 输血, 观察
- B、 抗休克, 病情好转后手术
- C、 抗休克同时开腹手术
- D、 先抗休克, 2-3 小时不好转, 一面抗休克, 一面手术
- E、 肋骨骨折处封闭及橡皮膏固定后手术

答案: C

36、男性, 40 岁, 近半月来上腹不适, 饮食不好, 偶有反酸, 2 小时前突然上腹疼痛难忍, 面色苍白出冷汗, 继之全腹疼痛, 压痛, 反跳疼明显, 肠鸣音消失, 肝浊音界消失, 最大可能为:(单选题)

- A、 急性胰腺炎
- B、 溃疡病急性穿孔
- C、 急性胆囊炎
- D、 急性阑尾炎
- E、 胆囊穿孔

答案: B

37、滑动性疝系指:(单选题)

- A、 易复性疝
- B、 肠管壁疝
- C、 疝内容物为小肠的憩室
- D、 疝内容物为几个肠袢
- E、 疝囊壁的一部分为某一内脏

答案: E

38、女性, 40 岁, 以右上腹持续性隐痛二月, 腹泻二周, 为粘液便, 近来常感腹胀, 时有便秘, 体质消瘦, 贫血容, 右上腹压痛, Murphy, s 征可疑, 肝脏肋下两指, 目前首先考虑为:(单选题)

- A、 胆囊癌
- B、 肝癌
- C、 结肠癌
- D、 胃癌

E、胰头癌

答案： C

39、为确诊上述病例, 首先应做的检查是:(单选题)

A、乙状结肠镜检

B、肝、胆、胰B超检查

C、纤维结肠镜检

D、X线钡剂灌肠检查

E、ERCP或PTC

答案： C

40、女性, 25岁, 上腹疼痛一天后转至右下腹部, 2小时前右下腹突然减轻, 但全腹开始疼痛, 右下腹压痛明显, 全腹均有压痛、反跳痛, 肌紧张. 白血球18000/mm<sup>3</sup>, 中性95%, 淋巴5%, 首先考虑:(单选题)

A、急性胆囊炎

B、宫外孕

C、急性阑尾炎穿孔

D、美克尔氏憩室穿孔

E、溃疡病穿孔

答案： C

41、门静脉的正常压力是:(单选题)

A、平均18厘米水柱

B、30厘米水柱

C、50厘米水柱

D、5厘米水柱

F. 以上都不是

答案： A

42、甲状腺癌常见的病理类型 \_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_。(简答题)

答案： 乳头状癌、滤泡状癌、髓样癌、未分化癌

43、颅内压增高的主要症状有\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_。(填空题)

答案： 头痛；呕吐；视神经乳头水肿；

44、腹外疝的发病原因有\_\_\_\_, \_\_\_\_两大类(填空题)

答案： 腹壁强度降低；腹内压增高；

45、门静脉高压症的主要临床表现是 \_\_\_\_、 \_\_\_\_ 、 \_\_\_\_。(简答题)

答案： 脾肿大,脾功能亢进,呕血,腹水

46、幽门梗阻典型的水、电及酸碱失衡是\_\_\_\_。(填空题)

答案： 低氯低钾性碱中毒；

47、头皮血肿可分为\_\_\_\_ \_\_\_\_、 \_\_\_\_ 、 \_\_\_\_ 等三种。(简答题)

答案： 皮下血肿,帽状腱膜下血肿,骨膜下血肿；

48、甲状腺髓样癌起源于甲状腺的\_\_\_\_细胞。(填空题)

答案： 滤泡旁降钙素分泌；

49、Hesselbach 三角的外侧边是\_\_\_\_,内侧边是 \_\_\_\_ ,底边是\_\_\_\_。(填空题)

答案： 腹壁下 A; 腹直肌外缘; 腹股沟韧带；

50、原发性肝癌的诊断包括\_\_\_\_和\_\_\_\_。(填空题)

答案： 超声; AFP；

51、胃癌的跳跃性转移,最常见的有二处,一是通过\_\_\_\_转移到左锁骨上淋巴结,一是通过肝圆韧带淋巴管,转移到 \_\_\_\_。(填空题)

答案： 胸导管; 脐周围；

52、骨折的专有体征有 \_\_\_\_、 \_\_\_\_ 、 \_\_\_\_。(简答题)

答案： 畸形,反常活动,骨擦音或骨擦感；

53、急性血源性骨髓炎多发生于\_\_\_\_,最常见的致病菌\_\_\_\_。(填空题)

答案： 长骨的干骺端; 金葡菌；

54、Calot 三角:(简答题)

答案： 即胆囊三角,是由胆囊管、肝总管和肝脏的脏面下缘构成的三角区,胆囊动脉和副肝管在此区穿行,是胆道手术及易发生误伤的危险区域。

55、“桔皮样”改变:

答案： 乳癌时,癌细胞浸及淋巴管,淋巴回流受阻导致淋巴水肿,而引起的乳房皮肤改变。(简答题)

56、Miles 手术:腹会阴联合直肠癌根治术,适用于直肠癌下缘距肛门 7cm 以内,手术时不能保留肛门括约肌而需行永久性结肠造口术。(简答题)

答案:

**57、连枷胸**

答案： 由于多根多处肋骨骨折,局部胸壁因失去肋骨的支撑而软化,出现反常呼吸现象,这类胸廓称~(简答题)

**58、丹毒:(简答题)**

答案： 是皮肤及其网状淋巴管的急性炎症

**59、简述急性阑尾炎及阑尾切除术的并发症?8分(简答题)**

答案： 急性阑尾炎的并发症:2分

脓肿

内、外瘻形成

门静脉炎

简述阑尾切除术后的并发症:(3分)

切口感染

腹膜炎、腹腔脓肿

粘连性肠梗阻

出血

粪瘻

**60、(简答题)**

答案:

**61、阑尾残株炎(简答题)**

答案:

**62、简述甲状腺肿的手术治疗指征5分(简答题)**

答案:

**63、压迫气管、食管或喉返神经而引起临床症状者(简答题)**

答案:

**64、胸骨后甲状腺肿(简答题)**

答案:

**65、巨大甲状腺肿影响生活或工作者(简答题)**

答案:

**66、结节性甲状腺肿继发功能亢进(简答题)**

答案:

**67、结节性甲状腺肿疑有癌变者**

(2)具有典型的雷诺五联征  
(3)白细胞明显升高和血小板明显降低。\_\_\_\_  
还需要检查:B超或PTC\_\_\_\_3\_\_(简答题)

答案: 3分;MRCP;1分;

68、处理原则及具体措施有哪些?

积极抗休克、抗感染,尽快做好术前准备,及早剖腹探查,切开胆总管减压,取石解除胆总管梗阻,吸尽高压脓性胆汁,置T管引流。\_\_\_\_(简答题)

答案: 4分;

69、甲状腺癌常见的病理类型\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_和\_\_\_\_。(填空题)

答案: 乳头状癌;滤泡状癌;髓样癌;未分化癌;

70、颅内压增高的主要症状有\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_。(填空题)

答案: 头痛;呕吐;视神经乳头水肿;

71、腹外疝的发病原因有\_\_\_\_、\_\_\_\_两大类(填空题)

答案: 腹壁强度降低;腹内压增高;

72、门静脉高压症的主要临床表现是\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_和\_\_\_\_。(填空题)

答案: 脾肿大;脾功能亢进;呕血;腹水;

73、幽门梗阻典型的水、电及酸碱失衡是\_\_\_\_。(填空题)

答案: 低氯低钾性碱中毒;

74、头皮血肿可分为皮下血肿,\_\_\_\_和\_\_\_\_等三种。(填空题)

答案: 帽状腱膜下血肿;骨膜下血肿;

75、甲状腺髓样癌起源于甲状腺的\_\_\_\_细胞。(填空题)

答案: 滤泡旁降钙素分泌;

76、Hesselbach三角的外侧边是\_\_\_\_,内侧边是\_\_\_\_,底边是\_\_\_\_。(填空题)

答案: 腹壁下A;腹直肌外缘;腹股沟韧带;

77、原发性肝癌的诊断包括\_\_\_\_和\_\_\_\_。(填空题)

答案: 超声;及AFP;

78、胃癌的跳跃性转移,最常见的有二处,一是通过\_\_\_\_转移到左锁骨上淋巴结,一是通过肝圆韧带淋巴管,转移到\_\_\_\_。(填空题)

答案: 胸导管;脐周围;

79、骨折的专有体征有\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_或\_\_\_\_。(填空题)

答案： 畸形；反常活动；骨擦音；骨擦感；

80、急性血源性骨髓炎多发生于\_\_\_\_，最常见的致病菌\_\_\_\_。(填空题)

答案： 长骨的干骺端；金葡菌；

81、“桔皮样”改变:(简答题)

答案： 乳癌时,癌细胞浸及淋巴管,淋巴回流受阻导致淋巴水肿,而引起的乳房皮肤改变。

82、Miles 手术:(简答题)

答案： 腹会阴联合直肠癌根治术,适用于直肠癌下缘距肛门 7cm 以内,手术时不能保留肛门括约肌而需行永久性结肠造口术。

83、连枷胸(简答题)

答案： 由于多根多处肋骨骨折,局部胸壁因失去肋骨的支撑而软化,出现反常呼吸现象,这类胸廓称~

84、简述急性阑尾炎及阑尾切除术的并发症?8分(简答题)

答案： 急性阑尾炎的并发症:脓肿,内、外瘻形成,门静脉炎  
简述阑尾切除术后的并发症:切口感染,腹膜炎、腹腔脓肿,出血,粪瘘,阑尾残株炎,粘连性肠梗阻

85、简述甲状腺肿的手术治疗指征?(简答题)

答案： 压迫气管、食管或喉返神经而引起临床症状者,骨后甲状腺肿,巨大甲状腺肿影响生活或工作者,结节性甲状腺肿继发功能亢进,结节性甲状腺肿疑有癌变者

请:1、列出主要诊断及诊断依据?还需要做哪些检查?2、处理原则及具体措施有哪些?诊断依据:(1)曾有胆总管取石及术后多次右上腹痛、发热、黄疸史,(2)具有典型的雷诺五联征,(3)白细胞明显升高和血小板明显降低。(3分) 还需要检查:B超或PTC(MRCP)(1分)积极抗休克、抗感染,尽快做好术前准备,及早剖腹探查,切开胆总管减压,取石解除胆总管梗阻,吸尽高压脓性胆汁,置T管引流。(4分)

86、甲状腺癌常见的病理类型 乳头状癌、滤泡状癌、髓样癌、未分化癌。(简答题)

答案：

87、颅内压增高的主要症状有\_\_\_\_。(填空题)

答案： 头痛、呕吐,视神经乳头水肿；

88、腹外疝的发病原因有\_\_\_\_两大类(填空题)

答案： 腹壁强度降低,腹内压增高;

89、门静脉高压症的主要临床表现是 脾肿大,脾功能亢进,呕血,腹水。(简答题)

答案:

90、头皮血肿可分为皮下血肿, 帽状腱膜下血肿,骨膜下血肿 等三种。(简答题)

答案:

91、骨折的专有体征有 畸形,反常活动,骨擦音或骨擦感。(简答题)

答案:

92、Calot 三角:即胆囊三角,是由胆囊管、肝总管和肝脏的脏面下缘构成的三角区,胆囊动脉和副肝管在此区穿行,是胆道手术及易发生误伤的危险区域。(简答题)

答案:

93、“桔皮样”改变:乳癌时,癌细胞浸及淋巴管,淋巴回流受阻导致淋巴水肿,而引起的乳房皮肤改变。(简答题)

答案:

94、连枷胸 由于多根多处肋骨骨折,局部胸壁因失去肋骨的支撑而软化,出现反常呼吸现象,这类胸廓称~(简答题)

答案:

95、丹毒:是皮肤及其网状淋巴管的急性炎症(简答题)

答案:

96、简述急性阑尾炎及阑尾切除术的并发症?8分(简答题)

答案： 急性阑尾炎的并发症:2分

97、脓肿(简答题)

答案:

98、内、外瘻形成(简答题)

答案:

99、门静脉炎

简述阑尾切除术后的并发症:\_\_\_\_(简答题)



答案： 3分；

100、切口感染(简答题)

答案：

101、腹膜炎、腹腔脓肿(简答题)

答案：

102、出血(简答题)

答案：

103、粪瘘(简答题)

答案：

104、粘连性肠梗阻(简答题)

答案：

105、简述甲状腺肿的手术治疗指征?(简答题)

答案： 压迫气管、食管或喉返神经而引起临床症状者,骨后甲状腺肿,巨大甲状腺肿影响生活或工作者,结节性甲状腺肿继发功能亢进,结节性甲状腺肿疑有癌变者

106、甲状腺癌常见的病理类型 ( )

- A、 乳头状癌、
- B、 滤泡状癌、
- C、 髓样癌、
- D、 未分化癌。

答案： ABCD

107、颅内压增高的主要症状有\_\_\_\_\_。

A 头痛、 B 呕吐, C 视神经乳头水肿; D 高热

答案： ABC;

108、腹外疝的发病原因有\_\_\_\_\_两大类

A 腹壁强度降低 ,B 腹内压增高;C 便秘 D 咳嗽

答案： AB;

109、门静脉高压症的主要临床表现是

A、 脾肿大,

- B、 脾功能亢进,
- C、 呕血,
- D、 腹水。

答案： ABCD

110、头皮血肿可分为 \_\_等三种。

- A、 皮下血肿,
- B、 帽状腱膜下血肿,
- C、 骨膜下血肿
- D、 硬膜外血肿

答案： ABC

111、骨折的专有体征有 。

- A、 畸形,
- B、 反常活动,
- C、 骨擦音或骨擦感
- D、 血肿

答案： ABC

112、胆囊三角(Calot 三角)是由 、 和 构成的三角形。

- A、 胆囊管、
- B、 肝总管
- C、 肝脏的脏面下缘
- D、 胆总管

答案： ABC

113、胃溃疡的手术指征

- A、 内科治疗无效或复发者
- B、 >45 岁的胃溃疡患者
- C、 较大的溃疡或高位溃疡
- D、 可疑恶变者
- E、 有大出血或急性穿孔史者

答案： ABCDE

114、痈是指多个不同部位散在的毛囊及其皮脂腺的化脓性感染

答案： 正确

115、常用的平衡盐溶液为 5%葡萄糖氯化钠溶液

答案： 错误

116、骨折是指骨的完整性或连续性中断

答案： 正确

117、各类休克的特点是血压下降,有效循环血量锐减

答案： 正确

118、基础代谢率的计算公式最常用的是:基础代谢=脉率×脉压-111

答案： 错误

119、青年人单纯性甲状腺肿患者,如无其他伴随症状,首先应考虑的治疗方案是:甲状腺大部切除术

答案： 错误

120、阑尾切除术后,阑尾动脉结扎线滑脱后出血的处理原则是:输血,补充血容量

答案： 错误

121、有乳头溢血的乳晕深部肿块最多见的是

- A、 乳癌
- B、 乳腺囊性增生病
- C、 乳房结核
- D、 乳管内乳头状癌
- E、 乳房脓肿

答案： D

122、急性乳腺炎最常见于

- A、 妊娠期妇女
- B、 初产哺乳的妇女
- C、 哺乳半年后的妇女
- D、 乳头凹陷的青年妇女
- E、 长期哺乳的妇女

答案： A

123、诊断乳房深部脓肿的主要依据是

- A、 乳房红、肿‘热
- B、 全身发热,乳房压痛
- C、 超声波检查提示液平段
- D、 穿刺抽出脓性液体

答案： D

解析： D

E、局部检查有波动感

124、乳房脓肿切开引流最常用的切口是

- A、 “+”字形切口
- B、 “++”字形切口
- C、 轮辐放射方向切口
- D、 乳房下弧形切口
- E、 平行肋骨斜切口

答案： C

125、在急性乳腺炎的早期表现中,不包括下列哪一项

- A、 局部胀痛
- B、 体温升高
- C、 表面红热
- D、 明显压痛
- E、 搏动性疼痛

答案： E

126、关于急性乳腺炎的预防,下列哪一项是错误的

- A、 避免积乳
- B、 防止乳头外伤
- C、 纠正乳头凹陷
- D、 正确哺乳,清洗乳头
- E、 预防性应用抗菌药物

答案： E

127、关于乳腺囊性增生病,下列哪一项是错误的

- A、 与内分泌功能失调有关
- B、 25~40 岁妇女多见
- C、 常见于两侧乳房
- D、 可以发生癌变
- E、 病理示腺体组织增生、萎缩、化生等征象

答案： C

128、有关乳房肿块,下列正确的是

- A、 乳头溢浆液性无色液,是乳腺囊性增生
- B、 乳房内结节大小不等、质韧、轻压痛是乳管内乳头状瘤
- C、 乳房内实质性肿块,生长快,轻刺痛,活动差是乳腺纤维腺瘤
- D、 皮肤“橘皮样”改变是乳癌重要体征之一
- E、 超声波检查为实质性肿块,提示恶性肿瘤

答案： D

129、男性,45 岁,右侧巨大腹股沟斜疝修补术后第一天,阴囊患侧肿大如成人拳,疼痛,下坠感明显, T:38.5℃, WBC15000, N86%, L12%, M2%, 最大可能是:(单选题)

- A、 阴囊血肿
- B、 睾丸鞘膜积液
- C、 急性睾丸炎
- D、 术后感染
- E、 修补失败,斜疝复发

答案： A

130、腹部外伤的病人, X 线腹部平片见腹膜后充气,肾脏轮廓清晰,考虑为:(单选题)

- A、 横结肠破裂
- B、 空肠破裂
- C、 胃破裂
- D、 十二指肠第三段破裂
- E、 乙状结肠破裂

答案： D

131、男性, 40 岁, 上腹隐痛与饮食有关已 5 年, 此次突然上腹疼痛, 不敢深呼吸, 查体: 面色苍白, 上腹部明显压痛, 反跳疼及肌紧张, WBC:  $9500/\text{mm}^3$ , N: 80%, 为明确诊断, 首先应进行(单选题)

- A、 腹部立位平片
- B、 紧急钡餐透视
- C、 腹腔穿刺
- D、 急查血淀粉酶
- E、 紧急静脉胆道造影

答案： A

132、男性, 50 岁, 确诊结肠肝曲癌, 行手术治疗, 应切除哪些范围为宜?(单选题)

- A、 距肿块上下缘为 5cm
- B、 切除升结肠和横结肠各半
- C、 由回肠后 20cm 开始至右半横结肠段及所属系膜和淋巴结
- D、 由盲肠开始至右半横结肠段及所属系膜和淋巴结
- E、 保留回盲动脉, 由升结肠至右半横结肠切除

答案： C

133、门脉高压症时, 交通支均扩张, 临床上最重要的是:(单选题)

- A、 腹壁交通支
- B、 腹膜及交通支
- C、 直肠下端、肛管交通支
- D、 胃底、食道下段交通支
- E、 以上都不是

答案： D

134、急性乳腺炎的病人, 往往是初产妇, 而且多发生在产后 3~4 周, 重要原因是:(单选题)

- A、 全身感染加局部抵抗力降低
- B、 乳汁的淤积加细菌的侵入
- C、 乳腺组织的发育不良
- D、 哺乳次数过多

E、乳分泌障碍

答案： B

135、胃癌早期诊断的重要手段是:(单选题)

A、 X线钡餐检查

B、 胃液细胞学检查

C、 胃液分析

D、 纤维胃镜检查

F. 大便隐血检查

答案： D

136、胆固醇结石好发于:(单选题)

A、 胆总管

B、 B. 左肝管

C、 右肝管

D、 胆囊

E、 肝内胆管

答案： D

137、患者左下肢静脉曲张已廿年,4年来小腿下1/3内侧并发溃疡,最积极的治疗方法是:(单选题)

A、 有效抗菌素

B、 积极换药

C、 弹性绷带

D、 植皮

E、 手术治疗静脉曲张

答案： E

138、对便血病人,作直肠指检是为了及早发现:(单选题)

A、 内痔

B、 炎性疾病

C、 直肠癌

D、 肛裂

E、 肛瘘

答案： C

139、乳头溢血最常见于:(单选题)

- A、 乳癌
- B、 乳房囊性增生病
- C、 乳房结核
- D、 乳管内乳头状瘤
- E、 乳管内癌

答案： D

140、里脱( )氏疝时嵌顿的内容是:(单选题)

- A、 小肠的憩室
- B、 小肠壁的一部分
- C、 大网膜
- D、 盲肠、阑尾
- E、 几个肠袢

答案： A

141、手术诊断腹股沟斜疝的主要依据是:(单选题)

- A、 疝环在腹壁下动脉内侧
- B、 疝环在直疝三角内
- C、 疝囊颈在耻骨结节下方
- D、 疝囊颈在腹壁下动脉外侧
- E、 疝囊在腹股沟管内

答案： D

142、最易发生嵌顿的腹外疝是:(单选题)

- A、 切口疝
- B、 难复性疝
- C、 滑动性疝
- D、 股疝
- E、 直疝

答案： D



143、急性化脓性腹膜炎的主要体征是:(单选题)

- A、 腹式呼吸运动减弱或消失
- B、 腹胀
- C、 压痛和反跳痛
- D、 腹肌紧张
- E、 肠鸣音消失

答案: C

144、招致大出血的胃、十二指肠溃疡所在部位一般多见于:(单选题)

- A、 幽门或十二指肠前壁
- B、 胃小弯或十二指肠后壁
- C、 胃大弯或十二指肠外侧壁
- D、 胃底部或十二指肠球后壁
- E、 贲门部或十二指肠前壁

答案: B

145、早期胃癌的概念是:(单选题)

- A、 局限于胃窦内
- B、 局限于粘膜或粘膜下层
- C、 直径在 2cm 以内
- D、 无淋巴结转移
- E、 尚未侵及浆膜层

答案: B

146、1、 有乳头溢血的乳晕深部肿块最多见的是

(单选题)

A、

乳癌

B、

乳腺囊性增生病

C、

乳房结核

D、

乳管内乳头状癌

E、

乳房脓肿

答案： D

147、胃癌从哪条途径转移到左锁骨上?(单选题)

A、 腔静脉

B、 主动脉

C、 通过肺

D、 直接扩散

E、 胸导管

答案： E

148、中年女性,患Ⅱ期乳癌,应采取哪一治疗方案?(单选题)

A、 乳房单切加放疗

B、 肿块切除加化疗

C、 乳房根治术加定期化疗

D、 扩大根治术

E、 姑息性切除术加放疗和化疗

答案： C

149、门脉高压症时腹水形成的主要原因是:(单选题)

A、 门脉压力增高

B、 白蛋白合成障碍

C、 醛固酮及抗利尿激素在体内增多

D、 球蛋白合成障碍

E、 以上都不是

答案： B

150、急性胆管炎的三联症状是:(单选题)

- A、 腹痛、寒战高热、黄疸
- B、 寒战高热、黄疸、腹痛
- C、 黄疸、寒战高热、腹痛
- D、 腹痛、恶心呕吐、食欲不振
- E、 发热、腹痛、恶心呕吐

答案： A

151、治疗胆道感染性休克的关键是:(单选题)

- A、 应用血管活性药物
- B、 纠正水、电解质代谢和酸碱平衡紊乱
- C、 应用氢化考的松
- D、 应用抗菌素
- E、 解除梗阻,胆道减压

答案： E

152、血栓闭塞性脉管炎的早期症状是:(单选题)

- A、 下肢疼痛
- B、 间歇性跛行
- C、 患肢毛发脱落
- D、 患肢趾甲搁置增厚
- E、 足背动脉搏动消失

答案： B

153、男性,警察,右下肢静脉曲张一年,检查者,给予大腿部扎一橡皮带,然后让病人快速用力屈伸膝关节 20 次,此时浅静脉曲张更明显,说明患者:(单选题)

- A、 下肢浅、深静脉交通支瓣膜闭锁不全
- B、 下肢浅、深静脉交通支瓣膜功能正常
- C、 大隐静脉入股静脉外瓣膜闭锁不全
- D、 下肢深静脉有阻塞

E、小隐深静脉瓣膜闭锁不全

答案： D

154、男性,警察,右下肢静脉曲张一年,检查者,给予大腿部扎一橡皮带,然后让病人快速用力屈伸膝关节 20 次,此时浅静脉曲张更明显,说明患者:治疗方法(单选题)

- A、大隐静脉高位结扎
- B、大隐静脉高位结扎+抽剥术
- C、浅、深静脉交通支结扎
- D、抗凝、溶血治疗
- E、以上都不是

答案： D

155、继发性腹膜炎最为多见的病原菌是:(单选题)

- A、溶血性链球菌
- B、葡萄球菌
- C、大肠杆菌
- D、变形杆菌
- E、绿脓杆菌

答案： C

156、穿孔性腹膜炎中最常见的是:(单选题)

- A、溃疡病穿孔
- B、阑尾炎穿孔
- C、肠伤寒穿孔
- D、肠结核穿孔
- E、腹部外伤穿孔

答案： B

157、关于急性化脓性腹膜炎应用非手术治疗,下列哪项是 错误的?(单选题)

- A、原发性腹膜炎
- B、已有局限的趋势
- C、病因不明、病情不重的无紧急手术必要
- D、急性胰腺炎

E、 胆囊穿孔腹膜炎

答案： E

158、男，2岁，以右侧腹股沟完全性易复性斜疝收入院，最适宜的治疗方法是：(单选题)

A、 继续观察暂不治疗

B、 疝囊高位结扎术

C、 疝修补术

D、 疝成形术

E、 用疝带

答案： B

159、喉上神经内支损伤时：(单选题)

A、 声音嘶哑

B、 音调降低

C、 饮水呛咳

D、 呼吸困难

E、 失音

答案： C

160、男性，50岁，右侧甲状腺肿大，质硬，声音嘶哑，心率90次/分，应首先考虑为：(单选题)

A、 甲状腺功能亢进

B、 甲状腺腺瘤

C、 结节性甲状腺肿

D、 甲状腺癌

E、 慢性甲状腺炎

答案： D

161、男性，行Bassini氏疝修补术，手术结束后，精索的位置应是在：(单选题)

A、 原位不变

B、 腹内斜肌与腹横筋膜之间

C、 皮下与腹外斜肌腱膜之间

D、 腹外斜肌腱膜与腹内斜肌之间

E、 以上都不是

答案： D

162、肝破裂, 8、9 肋骨骨折, P:106 次/分, Bp:90/60mmHg, Hb:9.0g%, 适当的治疗是:(单选题)

A、 吸 O<sub>2</sub>, 输血, 观察

B、 抗休克, 病情好转后手术

C、 抗休克同时开腹手术

D、 先抗休克, 2-3 小时不好转, 一面抗休克, 一面手术

E、 肋骨骨折处封闭及橡皮膏固定后手术

答案： C

163、男性, 40 岁, 近半月来上腹不适, 饮食不好, 偶有反酸, 2 小时前突然上腹疼痛难忍, 面色苍白出冷汗, 继之全腹疼痛, 压痛, 反跳疼明显, 肠鸣音消失, 肝浊音界消失, 最大可能为:(单选题)

A、 急性胰腺炎

B、 溃疡病急性穿孔

C、 急性胆囊炎

D、 急性阑尾炎

E、 胆囊穿孔

答案： B

164、滑动性疝系指:(单选题)

A、 易复性疝

B、 肠管壁疝

C、 疝内容物为小肠的憩室

D、 疝内容物为几个肠袢

E、 疝囊壁的一部分为某一内脏

答案： E

165、女性, 40 岁, 以右上腹持续性隐痛二月, 腹泻二周, 为粘液便, 近来常感腹胀, 时有便秘, 体质消瘦, 贫血容, 右上腹压痛, Murphy, s 征可疑, 肝脏肋下两指, 目前首先考虑为:(单选题)

A、 胆囊癌

B、 肝癌

- C、 结肠癌
- D、 胃癌
- E、 胰头癌

答案： C

166、为确诊上述病例, 首先应做的检查是:(单选题)

- A、 乙状结肠镜检
- B、 肝、胆、胰 B 超检查
- C、 纤维结肠镜检
- D、 X 线钡剂灌肠检查
- E、 ERCP 或 PTC

答案： C

167、女性, 25 岁, 上腹疼痛一天后转至右下腹部, 2 小时前右下腹突然减轻, 但全腹开始疼痛, 右下腹压痛明显, 全腹均有压痛、反跳痛, 肌紧张. 白血球 18000/mm<sup>3</sup>, 中性 95%, 淋巴 5%, 首先考虑:(单选题)

- A、 急性胆囊炎
- B、 宫外孕
- C、 急性阑尾炎穿孔
- D、 美克尔氏憩室穿孔
- E、 溃疡病穿孔

答案： C

168、门静脉的正常压力是:(单选题)

- A、 平均 18 厘米水柱
- B、 30 厘米水柱
- C、 50 厘米水柱
- D、 5 厘米水柱
- F. 以上都不是

答案： A

169、有乳头溢血的乳晕深部肿块最多见的是

- A、 乳癌
- B、 乳腺囊性增生病

- C、 乳房结核
- D、 乳管内乳头状癌
- E、 乳房脓肿

答案： D

**170、急性乳腺炎最常见于**

- A、 妊娠期妇女
- B、 初产哺乳的妇女
- C、 哺乳半年后的妇女
- D、 乳头凹陷的青年妇女
- E、 长期哺乳的妇女

答案： A

**171、诊断乳房深部脓肿的主要依据是**

- A、 乳房红、肿‘热
- B、 全身发热,乳房压痛
- C、 超声波检查提示液平段
- D、 穿刺抽出脓性液体

答案： D

解析： D

- E、 局部检查有波动感

**172、乳房脓肿切开引流最常用的切口是**

- A、 “+” 字形切口
- B、 “++” 字形切口
- C、 轮辐放射方向切口
- D、 乳房下弧形切口
- E、 平行肋骨斜切口

答案： C

**173、在急性乳腺炎的早期表现中,不包括下列哪一项**

- A、 局部胀痛
- B、 体温升高



- C、 表面红热
- D、 明显压痛
- E、 搏动性疼痛

答案： E

174、关于急性乳腺炎的预防,下列哪一项是错误的

- A、 避免积乳
- B、 防止乳头外伤
- C、 纠正乳头凹陷
- D、 正确哺乳,清洗乳头
- E、 预防性应用抗菌药物

答案： E

175、关于乳腺囊性增生病,下列哪一项是错误的

- A、 与内分泌功能失调有关
- B、 25~40岁妇女多见
- C、 常见于两侧乳房
- D、 可以发生癌变
- E、 病理示腺体组织增生、萎缩、化生等征象

答案： C

176、有关乳房肿块,下列正确的是

- A、 乳头溢浆液性无色液,是乳腺囊性增生
- B、 乳房内结节大小不等、质韧、轻压痛是乳管内乳头状瘤
- C、 乳房内实质性肿块,生长快,轻刺痛,活动差是乳腺纤维腺瘤
- D、 皮肤“橘皮样”改变是乳癌重要体征之一
- E、 超声波检查为实质性肿块,提示恶性肿瘤

答案： D

177、甲状腺癌常见的病理类型 ( )

- A、 乳头状癌、
- B、 滤泡状癌、
- C、 髓样癌、

D、未分化癌。

答案： ABCD

178、颅内压增高的主要症状有\_\_\_\_\_。

A 头痛、 B 呕吐， C 视神经乳头水肿； D 高热

答案： ABC；

179、腹外疝的发病原因有\_\_\_\_\_两大类

A 腹壁强度降低， B 腹内压增高； C 便秘 D 咳嗽

答案： AB；

180、门静脉高压症的主要临床表现是

A、脾肿大，

B、脾功能亢进，

C、呕血，

D、腹水。

答案： ABCD

181、头皮血肿可分为\_\_等三种。

A、皮下血肿，

B、帽状腱膜下血肿，

C、骨膜下血肿

D、硬膜外血肿

答案： ABC

182、骨折的专有体征有：。

A、畸形，

B、反常活动，

C、骨擦音或骨擦感

D、血肿

答案： ABC

183、胆囊三角(Calot三角)是由、和构成的三角形。

A、胆囊管、

B、肝总管

C、肝脏的脏面下缘

D、胆总管

答案：ABC

**184、胃溃疡的手术指征**

A、内科治疗无效或复发者

B、>45 岁的胃溃疡患者

C、较大的溃疡或高位溃疡

D、可疑恶变者

E、有大出血或急性穿孔史者

答案：ABCDE

**185、痈是指多个不同部位散在的毛囊及其皮脂腺的化脓性感染**

答案：正确

**186、常用的平衡盐溶液为 5%葡萄糖氯化钠溶液**

答案：错误

**187、骨折是指骨的完整性或连续性中断**

答案：正确

**188、各类休克的共同特点是血压下降,有效循环血量锐减**

答案：正确

**189、基础代谢率的计算公式最常用的是:基础代谢=脉率×脉压-111**

答案：错误

**190、青年人单纯性甲状腺肿患者,如无其他伴随症状,首先应考虑的治疗方案是:甲状腺大部切除术**

答案：错误

**191、阑尾切除术后,阑尾动脉结扎线滑脱后出血的处理原则是:输血,补充血容量**

答案：错误

**192、Calot 三角:即胆囊三角,是由胆囊管、肝总管和肝脏的脏面下缘构成的三角区,胆囊动脉和副肝管在此区穿行,是胆道手术及易发生误伤的危险区域。(简答题)**

答案:

193、“桔皮样”改变:乳癌时,癌细胞浸及淋巴管,淋巴回流受阻导致淋巴水肿,而引起的乳房皮肤改变。(简答题)

答案:

194、Miles 手术:腹会阴联合直肠癌根治术,适用于直肠癌下缘距肛门 7cm 以内,手术时不能保留肛门括约肌而需行永久性结肠造口术。(简答题)

答案:

195、连枷胸 由于多根多处肋骨骨折,局部胸壁因失去肋骨的支撑而软化,出现反常呼吸现象,这类胸廓称~(简答题)

答案:

196、丹毒:是皮肤及其网状淋巴管的急性炎症(简答题)

答案:

197、简述甲状腺肿的手术治疗指征?(简答题)

答案: 压迫气管、食管或喉返神经而引起临床症状者,骨后甲状腺肿,巨大甲状腺肿影响生活或工作者,结节性甲状腺肿继发功能亢进,结节性甲状腺肿疑有癌变者

198、简述急性阑尾炎及阑尾切除术的并发症?8分(简答题)

答案: 急性阑尾炎的并发症:脓肿,内、外瘻形成,门静脉炎  
简述阑尾切除术后的并发症:切口感染,腹膜炎、腹腔脓肿,出血,粪瘻,阑尾残株炎,粘连性肠梗阻