

妇产科学-题库

1、欲行全子宫加双附件切除,不需要切断的韧带是

- A、圆韧带
- B、卵巢固有韧带
- C、卵巢悬韧带
- D、阔韧带
- E、主韧带

答案: B

2、四步触诊法中第二步的目的是判断

- A、胎头的位置
- B、宫底部的胎儿部分
- C、胎背和肢体
- D、胎臀的位置
- E、胎儿先露部及其入盆程度

答案: C

3、足月妊娠时的羊水量约为

- A、1000ml
- B、800ml
- C、600ml
- D、400ml
- E、300ml

答案: B

4、枕左前位胎头进入骨盆入口时衔接的径线是

- A、双顶径
- B、双颞径
- C、枕下前凶径
- D、枕额径
- E、枕颈径

答案： D

5、新生儿娩出后首先应

- A、 断脐
- B、 擦洗新生儿面部
- C、 清理呼吸道
- D、 刺激新生儿足部
- E、 娩出胎盘及胎膜

答案： C

6、关于流产的治疗原则, 以下错误的是

- A、 早期先兆流产时可肌肉注射黄体酮
- B、 不全流产应尽快行刮宫术
- C、 完全流产一般不需特殊处理
- D、 流产合并感染且阴道流血不多时应抗感染及刮宫同时进行
- E、 稽留流产处理前应常规查血常规、凝血功能, 并做好输血准备

答案： D

**7、不属于前置胎盘的临床表现的
是.....()**

- A、 胎先露下降受阻
- B、 无痛性阴道流血
- C、 子宫张力高, 胎心音不易闻及
- D、 子宫下段可闻及胎盘血流音
- E、 宫缩呈间歇性

答案：

8、输卵管妊娠最常见的部位是

- A、 输卵管伞部
- B、 输卵管峡部
- C、 输卵管间质部
- D、 输卵管壶腹部
- E、 输卵管间质部与峡部之间

答案： D

9、临产的标志是

- A、 腹痛
- B、 见红
- C、 不规律宫缩
- D、 规律宫缩
- E、 宫口开全

答案： D

10、正常产褥期母体生殖器官逐渐恢复的描述正确的是……………()

- A、 宫体恢复至非孕大小需时 4 周
- B、 宫颈外形于产后 3 日恢复至未孕状态
- C、 于产后 2 周宫颈完全恢复至正常状态
- D、 于产后 10 日, 腹部检查扪不到宫底
- E、 于产后 4 周, 宫腔表面除胎盘附着处均由新生内膜修复

答案：

11、枕前位胎头通过软产道时进行内旋转是使胎头的

- A、 矢状缝与骨盆入口横径相一致
- B、 矢状缝与中骨盆横径相一致
- C、 矢状缝与中骨盆及骨盆出口前后径相一致
- D、 前囟转至耻骨弓下面
- E、 后囟转至骶骨前方

答案： C

12、胎盘早剥主要的病理变化是

- A、 包蜕膜出血
- B、 真蜕膜出血
- C、 底蜕膜出血
- D、 子宫肌层出血
- E、 胎盘边缘血窦破裂出血

答案： C

13、心脏病孕妇最容易发生心力衰竭的时期是

- A、 妊娠 20-22 周
- B、 妊娠 24-26 周
- C、 妊娠 28-30 周
- D、 妊娠 32-34 周
- E、 妊娠 36-38 周

答案： D

14、重症肝炎产妇产后出血的常见原因是

- A、 子宫收缩乏力
- B、 软产道裂伤
- C、 胎盘粘连
- D、 胎盘残留
- E、 凝血功能障碍

答案： E

15、不属于阴道正常微生物群的是

- A、 大肠埃希菌
- B、 乳杆菌
- C、 支原体
- D、 衣原体
- E、 加德纳菌

答案： D

16、下列哪项不是盆腔炎性疾病手术指征

- A、 脓肿破裂
- B、 脓肿持续存在
- C、 输卵管积水
- D、 慢性输卵管炎
- E、 脓肿经药物治疗无效

答案： D

17、与宫颈癌发病最有关系的病毒是

- A、 巨细胞病毒
- B、 高危型人乳头状瘤病毒
- C、 单纯疱疹病毒 I 型
- D、 单纯疱疹病毒 II 型
- E、 甲型肝炎病毒

答案： B

18、宫颈癌最常见的转移途径是

- A、 直接蔓延
- B、 腹股沟淋巴结
- C、 宫旁、闭孔淋巴结
- D、 血行转移
- E、 种植转移

答案： A

19、下列哪项不属于卵巢上皮性肿瘤

- A、 浆液性肿瘤
- B、 粘液性肿瘤
- C、 子宫内膜样肿瘤
- D、 腹膜假粘液瘤
- E、 畸胎瘤

答案： E

20、最常见异常子宫出血-排卵障碍 ()

- A、 黄体功能不足
- B、 子宫内膜不规则脱落
- C、 排卵期出血
- D、 无排卵性出血
- E、 排卵性月经过多

答案：

21、侵蚀性葡萄胎与绒癌的鉴别,主要依靠哪项

- A、 有无肺转移
- B、 黄素囊肿的大小
- C、 病理标本有无绒毛结构
- D、 有无阴道转移
- E、 有无脑转移

答案: C

22、导致子宫脱垂的最主要原因是

- A、 多产
- B、 先天发育不良
- C、 长期便秘
- D、 感冒咳嗽
- E、 阴道分娩

答案: E

23、子宫内膜异位症病灶最多见的部位是

- A、 卵巢
- B、 输卵管
- C、 子宫后壁下段
- D、 直肠子宫陷凹
- E、 宫骶韧带

答案: A

24、宫内节育器的并发症,错误的是.....()

- A、 宫内节育器异位
- B、 宫内节育器脱落
- C、 带器妊娠
- D、 经量增多
- E、 宫内节育器嵌顿

答案:

25、关于短效口服避孕药作用机制,不正确的是

- A、 抑制排卵
- B、 改变宫颈粘液性状
- C、 影响精子获能
- D、 抑制子宫内膜增殖变化
- E、 使子宫内膜分泌不良

答案: E

26、女,26岁,13岁初潮,月经周期规律,周期35日,持续7日,预测排卵日期应在月经周期的

- A、 第14日
- B、 第17日
- C、 第21日
- D、 第25日
- E、 第29日

答案: C

27、25岁孕妇,妊娠38周,无宫缩。产科检查:宫底的胎儿部分宽而软,右侧胎儿部分呈结节状,左侧胎儿部分宽而平坦且占据大部分,耻上的胎儿部分圆而硬,此时胎位是

- A、 枕右前位
- B、 枕左前位
- C、 枕左横位
- D、 骶右前位
- E、 骶左前位

答案: B

28、孕妇,28岁,妊娠8周,下腹隐痛及少量阴道流血,妇检:宫颈口未开,无宫颈举痛,子宫如孕8周大小,附件(一)。目前最有价值的检查是

- A、 尿雌三醇测定
- B、 血HPL测定
- C、 尿HCG测定
- D、 B超检查

E、 AFP 测定

答案： D

29、女性, 25 岁, 停经 43 日, 少量阴道流血 3 日, 3 小时前突感左下腹撕裂样疼痛, 随后出现肛门坠胀感伴头晕呕吐。体格检查: 面色苍白, P120 次/分, BP 80/40mmHg, 腹肌紧张, 下腹压痛, 移动性浊音阳性。妇科检查: 阴道少量血性物, 宫颈举痛(+), 后穹隆饱满, 子宫稍大, 附件区触诊不满意。最恰当的处理是

- A、 纠正休克同时剖腹探查
- B、 腹腔镜检查
- C、 尽快行刮宫术
- D、 快速补液并输血治疗
- E、 立即行阴道后穹隆穿刺术

答案： A

30、28 岁经产妇, 孕 37 周, 阴道无痛性多量流血 5 小时入院, 查血压 80/60mmHg, 脉搏 102 次/分, 无宫缩, 宫底在剑突下 2 指, 臀先露, 胎心 94 次/分。本例最可能的诊断是

- A、 前置胎盘
- B、 正常产程
- C、 先兆临产
- D、 胎盘早剥
- E、 先兆子宫破裂

答案： A

31、28 岁已婚女性, 停经 50 天, 下腹痛伴阴道流血 10 小时, 阴道流血较月经量多。妇科检查: 子宫稍大, 宫颈口扩张可容 1 指, 并见活动性出血。本例最有效的止血措施是

- A、 肌内注射止血药物
- B、 尽早行刮宫术
- C、 肌内注射或静滴缩宫素
- D、 纱布填塞阴道压迫止血
- E、 积极保胎治疗

答案： B

32、患者,女,33岁,停经45天,阴道少量流血伴下腹隐痛5天,行吸宫术,病理报告为蜕膜组织。首先应考虑的疾病是

- A、闭经
- B、先兆流产
- C、月经
- D、功血
- E、异位妊娠

答案: E

33、初产妇,31岁,妊娠40周,无妊娠合并症及并发症,无阴道流血,无下腹痛。体检:宫底高33cm,ROA,胎心率147次/分,NST有反应型。此时恰当的处理方法是……………()

- A、人工破膜
- B、等待自然临产
- C、剖宫产术终止妊娠
- D、先促宫颈成熟,再静脉点滴缩宫素
- E、缩宫素引产

答案:

34、28岁初产妇,临产后静脉滴注缩宫素,破膜后不久突然出现呛咳,呼吸困难,发绀,数分钟后死亡。最可能的诊断是

- A、重度子痫前期
- B、低纤维蛋白原血症
- C、羊水栓塞
- D、胎盘早剥
- E、子宫破裂

答案: C

35、女性,30岁,因肺炎入院治疗,应用抗生素2周,自觉外阴瘙痒,分泌物增多,应首先考虑

- A、前庭大腺炎
- B、细菌性阴道病
- C、滴虫阴道炎

- D、非特异性外阴炎
- E、外阴阴道假丝酵母菌病

答案： E

36、女性, 31 岁, 婚后 3 年不孕至今。平日月经规则, 基础体温双相, 继发痛经 3 年, 妇科检查: 子宫正常, 双附件增厚。配偶精液正常, 其不孕原因可能是

- A、排卵因素
- B、输卵管因素
- C、子宫因素
- D、宫颈因素
- E、免疫因素

答案： B

37、28 岁女性, 6 月前孕 50 天行人工流产术, 术后月经未来潮, 雌、孕激素试验均阴性, 闭经的原因应是

- A、卵巢性闭经
- B、垂体性闭经
- C、下丘脑性闭经
- D、子宫性闭经
- E、难以确定

答案： D

38、经产妇, 62 岁。绝经 11 年, 阴道反复流血 4 个月就诊。查体: 肥胖, 一般情况好,

血压 150/105mmHg。妇科检查: 阴道少许血液, 宫颈光滑, 子宫正常大, 双附件正常。最可能的诊断

是..... ()

- A、子宫颈癌
- B、老年性子宫内膜炎
- C、子宫内膜息肉
- D、老年性阴道炎
- E、子宫内膜癌

答案：

39、女性, 52 岁, 绝经 3 年出现阴道淋漓流血半月。检查: 右附件区扪及胎儿头大小实性肿物, 阴道脱落细胞检查提示雌激素高度影响, 子宫内膜活检为单纯性增生。本例最可能的诊断是

- A、 纤维瘤
- B、 浆液性囊腺瘤
- C、 良性畸胎瘤
- D、 液性囊腺瘤
- E、 卵泡膜细胞瘤

答案: E

40、30 岁已婚女性, 人工流产术中突感胸闷、头晕、恶心。查体: 面色苍白、大汗淋漓, 血压 75/50mmHg, 脉搏 52 次/分。此时应首先给予

- A、 输血补液
- B、 阿托品静脉注射
- C、 苯巴比妥钠肌注
- D、 迅速消除宫腔内容物
- E、 阿拉明静脉滴注

答案: B

41、40 岁妇女, 人工流产 4 个多月, 阴道出血 2 周, 咯血 3 天, 检查: 子宫稍大, 软, 尿妊娠试验阳性, 诊

断.....
()

- A、 葡萄胎
- B、 侵蚀性葡萄胎
- C、 绒毛膜癌
- D、 吸宫不全
- E、 以上都不是

答案:

42、妇女, 33 岁, 婚后 7 年未孕, 痛经逐年加重。妇科检查: 宫底韧带处可触及黄豆大小结节 2 个, 触痛明显, 右侧附件可及一 5×6×6cm 大小的包块, 活动差, 半囊半实, 最有效的确诊方法是

- A、 B 超

- B、 诊断性刮宫
- C、 宫腔镜检查
- D、 腹腔镜+组织病理检查
- E、 CA125 测定

答案： D

43、患者,女,14岁,12岁月经初潮。月经周期紊乱,经期长短不一已有1年。肛门检查:子宫发育正常,双侧附件(一)。最可能的诊断是……………()

- A、 无排卵型出血
- B、 排卵期出血
- C、 黄体功能不足
- D、 子宫内膜不规则脱落
- E、 子宫粘膜肌瘤

答案:

44、已婚未育妇女,28岁,平时月经过多,已确诊为子宫肌瘤,呈单个结节,子宫如孕3个月大,血红蛋白80g/L,最恰当的处理是

- A、 随访观察
- B、 纠正贫血
- C、 子宫肌瘤剔除术
- D、 子宫次全切术
- E、 子宫全切术

答案： C

45、符合绝经后女性的激素表现是

- A、 FSH及LH均降低
- B、 FSH及LH均升高
- C、 E2水平低,FSH低
- D、 FSH、LH、E2均升高
- E、 FSH持续低水平,LH无高峰形成

答案： B

46、卵巢动脉来自

- A、 髂总动脉
- B、 髂内动脉
- C、 腹主动脉
- D、 子宫动脉
- E、 肾动脉

答案： C

47、关于子宫的描述,哪项错误

- A、 子宫为一空腔器官,非孕时容量约 50ml
- B、 子宫肌壁较厚,在非孕时厚约 0.8cm
- C、 子宫肌壁平滑肌束外层纵行,内层环形、中层交叉排列
- D、 子宫内膜表面的 2/3 称功能层,能发生周期性变化
- E、 子宫浆膜层为与肌层紧贴的腹膜

答案： A

48、若卵子排出后未受精,黄体开始萎缩的时间在排卵后

- A、 5~6 天
- B、 7~8 天
- C、 9~10 天
- D、 11~12 天
- E、 13~14 天

答案： C

49、女性生殖器官最常见的恶性肿瘤是

- A、 子宫颈癌
- B、 子宫内膜癌
- C、 输卵管癌
- D、 绒毛膜癌
- E、 卵巢癌

答案： A

50、宫颈癌的好发部位是

- A、 宫颈外口柱状上皮与鳞状上皮交接处

- B、 宫颈内口宫体内膜与宫颈粘膜交接处
- C、 宫颈外口与阴道的鳞状上皮交界处
- D、 宫颈管内的柱状上皮
- E、 宫颈外口的鳞状上皮

答案： A

51、对于有接触性出血的患者,首先要做的检查措施是

- A、 TCT
- B、 B超检查
- C、 阴道检查
- D、 血常规
- E、 核磁共振

答案： A

52、子宫肌瘤与临床症状关系最密切的是

- A、 肌瘤大小
- B、 肌瘤数目
- C、 肌瘤生长部位
- D、 肌瘤有无变性
- E、 肌瘤与肌壁的关系

答案： E

53、下列哪项不是胎盘剥离征象

- A、 子宫底升高达脐上
- B、 宫体变硬,呈球形
- C、 阴道口外露的脐带自行下降
- D、 于耻骨上方压子宫下段,脐带回缩
- E、 阴道少量流血

答案： D

54、正常分娩保护会阴的时间是

- A、 初产妇宫口全开时
- B、 初产妇先露着冠时

- C、 经产妇宫口开大 5~6cm 时
- D、 经产妇宫口全开时
- E、 初产妇头拨露使会阴后联合皮肤膨胀时

答案： E

55、当测量坐骨结节间径<8cm,应进一步测量的径线是

- A、 坐骨切迹宽度
- B、 对角径
- C、 坐骨棘间径
- D、 出口前矢状径
- E、 出口后矢状径

答案： E

56、胎盘由以下哪项组织组成

- A、 平滑绒毛膜+包蜕膜+羊膜
- B、 平滑绒毛膜+底蜕膜+真蜕膜
- C、 叶状绒毛膜+包蜕膜+真蜕膜
- D、 叶状绒毛膜+底蜕膜+羊膜
- E、 叶状绒毛膜+包蜕膜+底蜕膜

答案： D

57、胎头衔接是指

- A、 枕骨进入骨盆入口平面
- B、 顶骨进入骨盆入口平面
- C、 双顶径进入骨盆入口平面
- D、 双顶径到达坐骨棘水平
- E、 双顶径到达坐骨结节水平

答案： C

58、子宫收缩乏力性出血最常用的止血方法是

- A、 按摩子宫,应用宫缩剂
- B、 结扎子宫动脉上行支
- C、 结扎髂内动脉

D、 髂内动脉栓塞术

E、 子宫次全切除术

答案： A

59、 阴道内保持一定酸性,是由于那种细菌分解上皮细胞内糖原的结果:

A、 大肠杆菌

B、 酵母菌

C、 链球菌

D、 肠球菌

E、 乳杆菌

答案： E

60、 28岁已婚妇女,停经42天,少量阴道流血5天。尿妊娠试验阴性,3小时前突发下腹痛伴肛门坠胀感。妇科检查:阴道少量血性分泌物,宫颈举痛(+),后穹窿饱满,子宫增大不明显,附件区触诊不满意。本例最可能的诊断为

A、 急性盆腔炎

B、 异位妊娠

C、 先兆流产

D、 卵巢黄体破裂

E、 难免流产

答案： D

61、 经产妇,40岁。近2年痛经并逐渐加重,伴经量增多及经期延长,解释需服强止痛药。查子宫均匀增大如孕8周,质硬,有压痛,经期压痛明显,痛经逐渐加重的原因,最可能的是

A、 功能型痛经

B、 子宫腺肌病

C、 子宫内膜结核

D、 子宫内膜癌

E、 子宫粘膜下肌层

答案： B

62、 绒癌最可靠的诊断依据是

A、 尿妊娠试验阳性

- B、胸部 X 线摄片,见肺部有转移结节
- C、阴道可见蓝紫色结节
- D、镜下见滋养细胞恶性增生,无绒毛结构
- E、镜下可见出血和坏死

答案: D

63、宫颈癌的病因主要为

- A、初次性生活小于 16 岁、早年分娩、多产
- B、与高危男子(阴茎癌或性伴侣患宫颈癌)性接触
- C、高危型人类乳头状瘤病毒感染
- D、吸烟
- E、以上多种因素协同作用

答案: C

64、25 岁, G1P0, 停经 36 周, 水肿一周, 头痛、视物不清 2 天, 加重伴恶心、呕吐半天, 抽搐 1 次急诊入院, 查体: 血压 195/120mmHg, 水肿 3+, 胎心 120 次/分, 不规律宫缩, 肛查: 宫口未开, 先露棘平, 骨产道正常. 本例应诊断为

- A、36 周妊娠, 子痫前期
- B、36 周妊娠, 产前子痫
- C、36 周妊娠, 合并脑出血
- D、36 周妊娠, 合并高血压危象
- E、36 周妊娠, 合并癫痫发作

答案: B

65、38 岁孕妇, 妊娠 32 周, 1 月内阴道少量流血 4 次, 无腹痛, 血压 95/62mmHg, 脉率 85 次/分, 宫高 30cm, 腹围 82cm, 臀先露, 未入盆, 胎心音清楚, 140 次/分. 应最先考虑的疾病是

- A、早产
- B、前置胎盘
- C、胎盘早期剥离
- D、宫颈息肉
- E、妊娠合并宫颈癌

答案: B

66、对于有宫颈接触性出血的患者,首先要做的检查措施是

- A、 TCT
- B、 HPV
- C、 阴道镜检查
- D、 血常规
- E、 核磁共振

答案: AB

67、胎盘由以下哪项组织组成

- A、 平滑绒毛膜
- B、 底蜕膜
- C、 叶状绒毛膜
- D、 羊膜
- E、 包蜕膜

答案: BCD

68、子宫收缩乏力性出血可用的止血方法是

- A、 按摩子宫,应用宫缩剂
- B、 结扎子宫动脉上行支
- C、 结扎髂内动脉
- D、 髂内动脉栓塞术
- E、 子宫次全切除术

答案: ABCDE

69、宫颈癌的病因有

- A、 初次性生活小于 16 岁、早年分娩、多产
- B、 与高危男子(阴茎癌或性伴侣患宫颈癌)性接触
- C、 高危型人类乳头状瘤病毒感染
- D、 吸烟
- E、 吸毒

答案: ABCDE

70、50岁妇女，平时月经周期规律。近2个月有接触性出血。妇科检查：子宫颈见菜花样赘生物，触之易出血，宫体正常大，无压痛，双侧附件区未及异常。本例的诊断可能的是

- A、子宫颈息肉
- B、子宫黏膜下肌瘤
- C、子宫颈癌
- D、子宫内膜癌
- E、子宫颈结核

答案： ABCE

71、子宫肌瘤的变性有

- A、玻璃样变
- B、囊性变
- C、红色变性
- D、肉瘤样变
- E、钙化

答案： ABCDE

72、卵巢肿瘤的并发症有

- A、蒂扭转
- B、破裂
- C、感染
- D、出血
- E、恶变

答案： ABCE

73、能产生甲胎蛋白的卵巢肿瘤是

- A、卵泡膜细胞瘤
- B、颗粒细胞瘤
- C、成熟性畸胎瘤
- D、卵黄囊瘤

E、 粘液性囊腺瘤

答案： D

74、青春期功血的治疗原则是

A、 减少月经量

B、 调整周期，减少经量

C、 止血、调整周期、促排卵

D、 促进子宫发育

E、 刮宫

答案： C

75、放置宫内节育器的并发症有

A、 宫内节育器嵌顿

B、 宫内节育器异位

C、 宫内节育器脱落

D、 带器妊娠

E、 子宫颈糜烂

答案： ABCD

76、盆腔炎性疾病的感染途径有

A、 沿生殖道黏膜上行蔓延

B、 经淋巴系统蔓延

C、 经血循环传播

D、 直接蔓延

E、 以上都不对

答案： ABCD

77、子宫内膜异位症引起不孕的原因有

A、 黄体期功能不足

B、 排卵障碍

C、 输卵管阻塞

D、 痛经

E、 月经过多

答案： ABC

78、影响分娩的因素有

- A、 产力
- B、 产道
- C、 胎儿
- D、 精神心理因素
- E、 免疫因素

答案： ABCD

79、用硫酸镁治疗子痫前期最早出现的毒性反应，错误的是

- A、 血压降低
- B、 心率减慢
- C、 膝反射消失
- D、 尿量减少
- E、 呼吸次数减少

答案： ABDE

80、输卵管妊娠的病因有

- A、 输卵管炎
- B、 输卵管结扎术后
- C、 子宫内膜异位症
- D、 受精卵游走
- E、 上环后

答案： ABCDE

81、关于产后出血正确的是

- A、 阴道分娩者胎儿娩出后 24 小时内阴道流血 $\geq 500\text{ml}$
- B、 阴道分娩者胎盘娩出后 24 小时内阴道流血 $\geq 500\text{ml}$
- C、 剖宫产者胎儿娩出后 24 小时内阴道流血 $\geq 500\text{ml}$
- D、 剖宫产者胎儿娩出后 24 小时内阴道流血 $\geq 1000\text{ml}$
- E、 剖宫产者胎盘娩出后 24 小时内阴道流血 $\geq 1000\text{ml}$

答案： AD

82、受精卵约在受精后第几日在宫腔内着床

- A、 3~4 日
- B、 4~5 日
- C、 5~6 日
- D、 6~7 日
- E、 7~8 日

答案： D

83、子宫颈细胞学检查 HSIL 提示

- A、 宫颈正常
- B、 宫颈炎
- C、 炎症修复
- D、 可疑癌前病变
- E、 可疑宫颈鳞癌

答案： D

84、女性生殖器官最常见的恶性肿瘤是

- A、 子宫颈癌
- B、 子宫内膜癌
- C、 输卵管癌
- D、 绒毛膜癌
- E、 卵巢癌

答案： A

85、关于子宫峡部, 哪项错误

- A、 是宫体与宫颈之间最狭窄的部分
- B、 其上端是组织学内口, 下端是解剖学内口
- C、 子宫峡部下端一下的内膜由宫腔内膜转化为宫颈粘膜
- D、 非孕期长约 1cm, 妊娠晚期可达 7~10cm, 形成子宫下段
- E、 子宫峡部的内膜可随月经周期而呈周期性变化

答案： B

86、四步触诊法中第一步的目的是判断

- A、胎头的位置
- B、宫底部的胎儿部分
- C、胎背和肢体
- D、胎臀的位置
- E、胎儿先露部及其入盆程度

答案： B

87、足月妊娠时的羊水量约为

- A、 1000ml
- B、 800ml
- C、 600ml
- D、 400ml
- E、 300ml

答案： B

88、枕左前位胎头进入骨盆入口时衔接的径线是

- A、 双顶径
- B、 双颞径
- C、 枕下前凶径
- D、 枕额径
- E、 枕颈径

答案： D

89、新生儿娩出后首先应

- A、 断脐
- B、 擦洗新生儿面部
- C、 清理呼吸道
- D、 刺激新生儿足部
- E、 娩出胎盘及胎膜

答案： C

90、关于流产的治疗原则, 以下错误的是

- A、 早期先兆流产时可肌内注射黄体酮
- B、 不全流产应尽快行刮宫术
- C、 完全流产一般不需特殊处理
- D、 流产合并感染且阴道流血不多时应抗感染及刮宫同时进行
- E、 稽留流产处理前应常规查血常规、凝血功能, 并做好输血准备

答案: D

91、临产的标志是

- A、 腹痛
- B、 见红
- C、 不规律宫缩
- D、 规律宫缩
- E、 宫口开全

答案: D

92、枕左前位胎头通过软产道时进行内旋转是使胎头的

- A、 矢状缝与骨盆入口横径相一致
- B、 矢状缝与中骨盆横径相一致
- C、 矢状缝与中骨盆及骨盆出口前后径相一致
- D、 前囟转至耻骨弓下面
- E、 后囟转至骶骨前方

答案: C

93、胎盘早剥主要的病理变化是

- A、 包蜕膜出血
- B、 真蜕膜出血
- C、 底蜕膜出血
- D、 子宫肌层出血
- E、 胎盘边缘血窦破裂出血

答案: C

94、心脏病孕妇最容易发生心力衰竭的时期是

- A、 妊娠 20-22 周
- B、 妊娠 24-26 周
- C、 妊娠 28-30 周
- D、 妊娠 32-34 周
- E、 妊娠 36-38 周

答案： D

95、不属于阴道正常微生物群的是

- A、 大肠埃希菌
- B、 乳杆菌
- C、 支原体
- D、 衣原体
- E、 加德纳菌

答案： D

96、下列哪项不是盆腔炎性疾病手术指征

- A、 脓肿破裂
- B、 脓肿持续存在
- C、 输卵管积水
- D、 慢性输卵管炎
- E、 脓肿经药物治疗无效

答案： D

97、宫颈癌最常见的转移途径是

- A、 直接蔓延
- B、 腹股沟淋巴结
- C、 宫旁、闭孔淋巴结
- D、 血行转移
- E、 种植转移

答案： A

98、下列哪项不属于卵巢上皮性肿瘤

- A、浆液性肿瘤
- B、粘液性肿瘤
- C、子宫内膜样肿瘤
- D、腹膜假粘液瘤
- E、畸胎瘤

答案： E

99、侵蚀性葡萄胎与绒癌的鉴别,主要依靠哪项

- A、有无肺转移
- B、黄素囊肿的大小
- C、病理标本有无绒毛结构
- D、有无阴道转移
- E、有无脑转移

答案： C

100、导致子宫脱垂的最主要原因是

- A、多产
- B、先天发育不良
- C、长期便秘
- D、感冒咳嗽
- E、阴道分娩

答案： E

101、子宫内膜异位症病灶最多见的部位是

- A、卵巢
- B、输卵管
- C、子宫后壁下段
- D、直肠子宫陷凹
- E、宫骶韧带

答案： A

102、关于短效口服避孕药作用机制,不正确的是

- A、 抑制排卵
- B、 改变宫颈粘液性状
- C、 影响精子获能
- D、 抑制子宫内膜增殖变化
- E、 使子宫内膜分泌不良

答案: E

103、25岁女性,14岁初潮,月经周期规律,周期30日,持续7日,预测排卵日期应在月经周期的

- A、 第14日
- B、 第16日
- C、 第21日
- D、 第25日
- E、 第29日

答案: B

104、28岁孕妇,妊娠38周,无宫缩。产科检查:宫底的胎儿部分宽而软,右侧胎儿部分呈结节状,左侧胎儿部分宽而平坦且占据大部分,耻上的胎儿部分圆而硬,此时胎位是

- A、 枕右前位
- B、 枕左前位
- C、 枕左横位
- D、 骶右前位
- E、 骶左前位

答案: B

105、25岁已婚女性,未生育,停经9周,下腹隐痛及少量阴道流血2天,妇检:宫颈口未开,无宫颈举痛,子宫如孕8周大小,附件区未及异常。目前最需要的检查是

- A、 尿雌三醇测定
- B、 血HPL测定

- C、尿 HCG 测定
- D、B 超检查
- E、AFP 测定

答案： D

106、女性, 25 岁, 停经 43 日, 少量阴道流血 3 日, 3 小时前突感左下腹撕裂样疼痛, 随后出现肛门坠胀感伴头晕呕吐。体格检查: 面色苍白, P120 次/分, BP 80/40mmHg, 腹肌紧张, 下腹压痛, 移动性浊音阳性。妇科检查: 阴道少量血性物, 宫颈举痛(+), 后穹隆饱满, 子宫稍大, 附件区触诊不满意。最恰当的处理是

- A、纠正休克同时剖腹探查
- B、腹腔镜检查
- C、尽快行刮宫术
- D、快速补液并输血治疗
- E、立即行阴道后穹隆穿刺术

答案： A

107、28 岁经产妇, 孕 37 周, 阴道无痛性多量流血 5 小时入院, 查血压 80/60mmHg, 脉搏 102 次/分, 无宫缩, 宫底在剑突下 2 指, 臀先露, 胎心 94 次/分。本例最可能的诊断是

- A、前置胎盘
- B、正常产程
- C、先兆临产
- D、胎盘早剥
- E、先兆子宫破裂

答案： A

108、27 岁已婚女性, 停经 52 天, 下腹痛伴阴道流血 5 小时, 阴道流血较月经量多。妇科检查: 子宫稍大, 宫颈口扩张可容 1 指, 并见活动性出血。本例最有效的止血措施是

- A、肌内注射止血药物
- B、尽早行刮宫术
- C、肌内注射或静滴缩宫素

D、 纱布填塞阴道压迫止血

E、 积极保胎治疗

答案： B

109、患者,女,33岁,停经45天,阴道少量流血伴下腹隐痛5天,行吸宫术,病理报告为蜕膜组织。首先应考虑的疾病是

A、 闭经

B、 先兆流产

C、 月经

D、 功血

E、 异位妊娠

答案： E

110、28岁初产妇,临产后静脉滴注缩宫素,破膜后不久突然出现呛咳,呼吸困难,发绀,数分钟后死亡。最可能的诊断是

A、 重度子痫前期

B、 低纤维蛋白原血症

C、 羊水栓塞

D、 胎盘早剥

E、 子宫破裂

答案： C

111、女性,30岁,因肺炎入院治疗,应用抗生素2周,自觉外阴瘙痒,分泌物增多,应首先考虑

A、 前庭大腺炎

B、 细菌性阴道病

C、 滴虫阴道炎

D、 非特异性外阴炎

E、 外阴阴道假丝酵母菌病

答案： E

112、女性, 31 岁, 婚后 3 年不孕至今。平日月经规则, 基础体温双相, 继发痛经 3 年, 妇科检查: 子宫正常, 双附件增厚。配偶精液正常, 其不孕原因可能是

- A、 排卵因素
- B、 输卵管因素
- C、 子宫因素
- D、 宫颈因素
- E、 免疫因素

答案: B

113、 35 岁女性, 6 月前孕 50 天行人工流产术, 术后月经未来潮, 雌、孕激素试验均阴性, 闭经的原因应是

- A、 卵巢性闭经
- B、 垂体性闭经
- C、 下丘脑性闭经
- D、 子宫性闭经
- E、 难以确定

答案: D

114、 58 岁女性, 绝经 5 年, 阴道少量流血半月。检查: 右附件区扪及直径约 10cm 实性肿物, 阴道脱落细胞检查提示雌激素高度影响, 子宫内膜活检为单纯性增生。本例最可能的诊断是

- A、 纤维瘤
- B、 浆液性囊腺瘤
- C、 良性畸胎瘤
- D、 液性囊腺瘤
- E、 卵泡膜细胞瘤

答案: E

115、 30 岁已婚女性, 人工流产术中突感胸闷、头晕、恶心。查体: 面色苍白、大汗淋漓, 血压 75/50mmHg, 脉搏 52 次/分。此时应首先给予

- A、 输血补液
- B、 阿托品静脉注射

- C、 苯巴比妥钠肌注
- D、 迅速消除宫腔内容物
- E、 阿拉明静脉滴注

答案： B

116、 妇女, 30 岁, 婚后 5 年未孕, 痛经逐年加重。 妇科检查: 宫底韧带处可触及黄豆大小结节 2 个, 触痛明显, 右侧附件可及一 6×6×6cm 大小的包块, 活动差, 半囊半实, 最有效的确诊方法是

- A、 B 超
- B、 诊断性刮宫
- C、 宫腔镜检查
- D、 腹腔镜+组织病理检查
- E、 CA125 测定

答案： D

117、 已婚未育妇女, 28 岁, 平时月经过多, 已确诊为子宫肌瘤, 呈单个结节, 子宫如孕 3 个月大, 血红蛋白 80g/L, 最恰当的处理是

- A、 随访观察
- B、 纠正贫血
- C、 子宫肌瘤剔除术
- D、 子宫次全切术
- E、 子宫全切术

答案： C

118、 子宫肌瘤与临床症状关系最密切的是

- A、 肌瘤大小
- B、 肌瘤数目
- C、 肌瘤生长部位
- D、 肌瘤有无变性
- E、 肌瘤与肌壁的关系

答案： E

119、 正常分娩保护会阴的时间是

- A、 初产妇宫口全开时
- B、 初产妇先露着冠时
- C、 经产妇宫口开大 5~6cm 时
- D、 经产妇宫口全开时
- E、 初产妇头拨露使会阴后联合皮肤膨胀时

答案： E

120、当测量坐骨结节间径<8cm,应进一步测量的径线是(1.5)

- A、 坐骨切迹宽度
- B、 对角径
- C、 坐骨棘间径
- D、 出口前矢状径
- E、 出口后矢状径

答案： E

121、胎头衔接是指

- A、 枕骨进入骨盆入口平面
- B、 顶骨进入骨盆入口平面
- C、 双顶径进入骨盆入口平面
- D、 双顶径到达坐骨棘水平
- E、 双顶径到达坐骨结节水平

答案： C

122、子宫收缩乏力性出血最常用的止血方法是

- A、 按摩子宫,应用宫缩剂
- B、 结扎子宫动脉上行支
- C、 结扎髂内动脉
- D、 髂内动脉栓塞术
- E、 子宫次全切除术

答案： A

123、30岁已婚妇女,停经40天,少量咖啡色阴道流血2天。尿妊娠试验阴性,2小时前突发下腹痛伴肛门坠胀感。妇科检查:阴道少量血性分泌物,宫颈举痛(+),后穹窿饱满,子宫增大不明显,附件区触诊不满意。本例最可能的诊断为

- A、急性盆腔炎
- B、异位妊娠
- C、先兆流产
- D、卵巢黄体破裂
- E、难免流产

答案: D

124、绒癌最可靠的诊断依据是

- A、尿妊娠试验阳性
- B、胸部X线摄片,见肺部有转移结节
- C、阴道可见蓝紫色结节
- D、镜下见滋养细胞恶性增生,无绒毛结构
- E、镜下可见出血和坏死

答案: D

125、26岁女性,G1P0,停经37周,水肿一周,头痛、视物不清2天,加重伴恶心、呕吐半天,抽搐1次急诊入院,查体:血压195/120mmHg,水肿3+,胎心120次/分,不规律宫缩,肛查:宫口未开,先露棘平,骨产道正常。本例应诊断为

- A、36周妊娠,子痫前期
- B、36周妊娠,产前子痫
- C、36周妊娠,合并脑出血
- D、36周妊娠,合并高血压危象
- E、36周妊娠,合并癫痫发作

答案: B

126、40岁孕妇,妊娠35周,1月内阴道少量流血3次,无腹痛,血压95/60mmHg,脉率96次/分,宫高30cm,腹围85cm,臀先露,未入盆,胎心音清楚,144次/分。应最先考虑的疾病是

- A、早产
- B、前置胎盘

- C、 胎盘早期剥离
- D、 宫颈息肉
- E、 妊娠合并宫颈癌

答案： B

127、符合绝经后女性的激素表现是

- A、 FSH 及 LH 均降低
- B、 FSH 及 LH 均升高
- C、 E2 水平低,FSH 低
- D、 FSH、 LH、 E2 均升高
- E、 FSH 持续低水平, LH 无高峰形成

答案： B

128、若卵子排出后未受精,黄体开始萎缩的时间在排卵后

- A、 5~6 天
- B、 7~8 天
- C、 9~10 天
- D、 11~12 天
- E、 13~14 天

答案： C

129、下列哪项不是胎盘剥离征象

- A、 子宫底升高达脐上
- B、 宫体变硬,呈球形
- C、 阴道口外露的脐带自行下降
- D、 于耻骨上方压子宫下段,脐带回缩
- E、 阴道少量流血

答案： D

130、输卵管妊娠最常见的部位是

- A、 输卵管伞部
- B、 输卵管峡部

- C、 输卵管间质部
- D、 输卵管壶腹部
- E、 输卵管间质部与峡部之间

答案： D

131、能产生甲胎蛋白的卵巢肿瘤是

- A、 卵泡膜细胞瘤
- B、 颗粒细胞瘤
- C、 成熟性畸胎瘤
- D、 卵黄囊瘤
- E、 粘液性囊腺瘤

答案： D

132、青春期功血的治疗原则是

- A、 减少月经量
- B、 调整周期,减少经量
- C、 止血、调整周期、促排卵
- D、 促进子宫发育
- E、 刮宫

答案： C

133、50岁妇女,平时月经周期规律。近2个月有接触性出血。妇科检查:子宫颈见菜花样赘生物,触之易出血,宫体正常大,无压痛,双侧附件区未及异常。本例的诊断可能的是

答案:

134、关于外阴阴道假丝酵母菌病正确的是

- A、 主要为外源性传染
- B、 孕妇与非孕妇发生率大体相同
- C、 白带呈泡沫状
- D、 多见于长期服用雌激素女性
- E、 病原体适宜 PH4-4.7

答案： DE

135、子宫肌瘤的变性有

- A、 玻璃样变
- B、 囊性变
- C、 红色变性
- D、 肉瘤样变
- E、 钙化

答案： ABCDE

136、卵巢肿瘤的并发症有

- A、 蒂扭转
- B、 破裂
- C、 感染
- D、 出血
- E、 恶变

答案： ABCE

137、放置宫内节育器的并发症有

- A、 宫内节育器嵌顿
- B、 宫内节育器异位
- C、 宫内节育器脱落
- D、 带器妊娠
- E、 宫颈糜烂

答案： ABCD

138、盆腔炎性疾病的感染途径有

- A、 沿生殖道黏膜上行蔓延
- B、 经淋巴系统蔓延
- C、 经血循环传播
- D、 直接蔓延
- E、 以上都不对

答案： ABCD

139、子宫内膜异位症引起不孕的原因有

- A、 黄体期功能不足
- B、 排卵障碍
- C、 输卵管阻塞
- D、 痛经
- E、 月经过多

答案： ABC

140、影响分娩的因素有

- A、 产力
- B、 产道
- C、 胎儿
- D、 精神心理因素
- E、 免疫因素

答案： ABCD

141、用硫酸镁治疗子痫前期最早出现的毒性反应, 错误的是

- A、 血压降低
- B、 心率减慢
- C、 膝反射消失
- D、 尿量减少
- E、 呼吸次数减少

答案： ABDE

142、输卵管妊娠的病因有

- A、 输卵管炎
- B、 输卵管结扎术后
- C、 子宫内膜异位症
- D、 受精卵游走
- E、 上环后

答案： ABCDE

143、关于产后出血正确的是

- A、 阴道分娩者胎儿娩出后 24 小时内阴道流血 $\geq 500\text{ml}$
- B、 阴道分娩者胎盘娩出后 24 小时内阴道流血 $\geq 500\text{ml}$
- C、 剖宫产者胎儿娩出后 24 小时内阴道流血 $\geq 500\text{ml}$
- D、 剖宫产者胎儿娩出后 24 小时内阴道流血 $\geq 1000\text{ml}$
- E、 剖宫产者胎盘娩出后 24 小时内阴道流血 $\geq 1000\text{ml}$

答案： AD

144、产后出血的原因有

- A、 宫缩乏力
- B、 胎盘植入
- C、 凝血功能障碍
- D、 软产道损伤
- E、 胎盘粘连

答案： ABCDE

145、临产后宫缩的作用有

- A、 迫使宫颈管变短直至消失
- B、 宫口扩张
- C、 胎先露下降
- D、 胎盘娩出
- E、 阴道流血

答案： ABCD

**146、
软产道组成有**

- A、 子宫下段
- B、 宫颈
- C、 阴道
- D、 骨盆底软组织
- E、 宫体

答案： ABCD

147、

26岁初产妇，妊娠32周，头痛5日就诊。查体：血压160/110mmHg，脉搏90次/分。宫底高度28cm，臀先露，胎心144次/分，尿蛋白2g/24小时，水肿(+)。以下处理正确的是

- A、卧床休息，左侧卧位
- B、静注地西洋10mg
- C、使用硫酸镁
- D、肼屈嗪
- E、呋塞米

答案： ABCD

148、与雌激素分泌有关的疾病是

- A、子宫内膜癌
- B、子宫内膜异位症
- C、子宫肌瘤
- D、子宫颈癌
- E、畸胎瘤

答案： ABC

149、受精卵约在受精后第几日在宫腔内着床

- A、3~4日
- B、4~5日
- C、5~6日
- D、6~7日
- E、7~8日

答案： D

150、下列哪项不是胎盘剥离征象

- A、子宫底升高达脐上
- B、宫体变硬，呈球形
- C、阴道口外露的脐带自行下降
- D、于耻骨上方压子宫下段，脐带回缩
- E、阴道少量流血

答案： D

151、子宫颈细胞学检查 HSIL 提示：

- A、 宫颈正常
- B、 宫颈炎
- C、 炎症修复
- D、 可疑癌前病变
- E、 可疑宫颈鳞癌

答案： D

152、28 岁女性, 停经 50 天, 阴道少量出血 10 天。行吸宫术, 病理报告为“子宫内膜单纯性增生”。应考虑的疾病是

- A、 闭经
- B、 异位妊娠
- C、 先兆流产
- D、 不全流产
- E、 异常子宫出血

答案： E

153、42 岁妇女, 阴道不规则出血 1 年, 白带有味, 妇查: 宫颈可见乳头样增生, 触及出血, 表面多量白色分泌物呈黄绿色, 宫旁结节状增厚, 未达盆壁, 阴道穹隆部硬, 可见小溃疡, 宫颈活检为鳞状上皮癌, 其治疗原则为

- A、 全子宫及双附件切除术
- B、 子宫根治术+盆腔淋巴结清扫术
- C、 放疗+手术治疗
- D、 放射治疗
- E、 化疗

答案： D

154、50 岁已婚育妇女, 月经量多 2 年, B 超检查提示子宫壁内探及多个低回声团, 最大直径 7cm, 双附件正常。最适宜的治疗是

- A、 子宫全切除
- B、 子宫次全切除
- C、 肌瘤剔除术

D、 诊断性刮宫术

E、 药物保守治疗

答案： A

155、 30 岁已婚育女性, 人流术后半年余, 阴道不规则流血半月, 近 1 个月开始厌食、 恶心、 肝区痛, 肝脏超声, 见多个异常回声, 血 hCG 明显增高, 诊断为绒癌肝转移, 其分期为

A、 I 期

B、 II 期

C、 III 期

D、 IV 期

E、 分期依据不足

答案： D

156、 子宫肌瘤与临床症状关系最密切的是：

A、 肌瘤大小

B、 肌瘤数目

C、 肌瘤生长部位

D、 肌瘤有无变性

E、 肌瘤与肌壁的关系

答案： E

157、 22 岁妇女, 两年前产钳助产分娩 4500g 女婴, 至今常感腰痛、 阴道下坠。 检查: 会阴侧切伤口愈合好, 于平处女膜缘处可见宫颈光滑, 子宫水平位、 经产大小, 双附件正常。 关于诊断, 以下哪项正确

A、 正常盆腔

B、 子宫脱垂 I 度轻

C、 子宫脱垂 I 度重

D、 子宫脱垂 II 度轻

E、 子宫脱垂 II 度重

答案： C

158、 28 岁经产妇, 人工流产术后半年, 术后断续阴道流血, 量不多. 术后一直避孕. 尿妊娠试验阳性, 查子宫鸭卵大、 软. 胸片见两肺中下部有多处散在的棉絮团影。 本例最可能的疾病是

- A、 吸宫不全
- B、 葡萄胎
- C、 侵蚀性葡萄胎
- D、 绒毛膜癌
- E、 胎盘部位滋养细胞肿瘤

答案： D

159、26岁初孕妇，妊40周，胎位LOA，产前检查无异常。因阴道流水8小时，无宫缩入院。以下哪项处理错误

- A、 阴道检查了解宫颈条件
- B、 查白细胞及分类
- C、 催产素静脉点滴引产
- D、 立即行剖宫产
- E、 给予抗生素预防感染

答案： D

160、对于有接触性出血的患者，首先要做的检查措施是

- A、 TCT
- B、 B超检查
- C、 阴道检查
- D、 血常规
- E、 核磁共振

答案： A

161、35岁女性，痛经5年逐渐加重，月经量增多，本次行经10天，血仍未止，2年前因不孕做过输卵管通液治疗，子宫较正常略大，后位，不活动，右侧触及5cm×4cm×3cm大的韧性包块与子宫粘连；左侧附件增厚，双宫骶韧带均及豆粒大痛性结节，本病首先考虑为

- A、 陈旧性宫外孕
- B、 生殖器结核
- C、 慢性盆腔炎
- D、 子宫内膜异位症
- E、 输卵管卵巢囊肿

答案： D

162、25岁，停经10周，阴道少量流血1周，大量流血3天，伴下腹胀痛，昨日起有畏寒发热，查血压80/60mmHg，脉搏120次/分，面色苍白，神清，阴道有活动性流血，子宫如妊娠50天大，软，宫口松，可容1指，宫口外仍有组织堵塞，子宫压痛明显，双侧穹窿未触及肿块，但有压痛。血红蛋白80g/L，白细胞 $18 \times 10^9/L$ ，中性85%，除立即抗休克抗炎治疗外，应作何恰当处理

- A、 立即钳夹出残留之胚胎组织
- B、 3天后再行剖宫术
- C、 立即行剖宫术
- D、 立即静滴宫缩素
- E、 静点止血药

答案： A

163、女性生殖器官最常见的恶性肿瘤是

- A、 子宫颈癌
- B、 子宫内膜癌
- C、 输卵管癌
- D、 绒毛膜癌
- E、 卵巢癌

答案： A

164、35岁女性，因左附件肿物 $10\text{cm} \times 10\text{cm} \times 9\text{cm}$ 拟入院手术，入院后1天突感下腹剧痛，妇科检查：左侧肿物隐约可及，大小边界不清，后穹窿穿刺抽出10ml深咖啡粘稠液体，最可能的诊断是

- A、 卵巢肿物蒂扭转
- B、 卵巢肿物破裂
- C、 卵巢巧克力囊肿破裂
- D、 残角子宫妊娠破裂
- E、 子宫浆膜下肌瘤蒂扭转

答案： C

165、29岁已婚妇女，孕3产0，白带中有血丝，曾患外阴尖锐湿疣，现已治愈。妇查：子宫正常大小，宫颈中度糜烂，子宫活动好，附件(-)，双穹(-)，宫颈刮片检

查1次阳性。阴道镜下宫颈活检,HSIL(CINIII),该患者要求保留生育功能,应采取何种治疗方法

- A、 子宫全切术
- B、 扩大子宫切除术
- C、 宫颈锥切术,术后密切定期随访
- D、 子宫根治术
- E、 子宫根治术+盆腔淋巴结清扫术

答案: C

166、33岁妇女。婚后7年未孕,痛经逐年加重,妇查:宫底韧带处可触及黄豆大结节2个,触痛明显,右侧附件可及一5cm×6cm大小包块活动差,囊实性,最有效的确诊方法

- A、 B超
- B、 诊断性刮宫
- C、 宫腔镜检查
- D、 腹腔镜+组织病检
- E、 CA₁₂₅

答案: D

167、29岁女性,已婚育2女,仍有生育需求,肝炎病史。目前月经干净4天,来院咨询采取何种方法避孕。根据该患者的情况,以下避孕方法哪种合适

- A、 宫内节育器
- B、 输卵管绝育术
- C、 短效口服避孕药
- D、 长效口服避孕药
- E、 皮下埋植剂

答案: A

168、25岁,G1P0,停经36周,水肿一周,头痛、视物不清2天,加重伴恶心、呕吐半天,抽搐1次急诊入院,查体:血压195/120mmHg,水肿3+,胎心120次/分,不规律宫缩,肛查:宫口未开,先露棘平,骨产道正常。本例应诊断为

- A、 36周妊娠,子痫前期
- B、 36周妊娠,产前子痫
- C、 36周妊娠,合并脑出血

D、 36 周妊娠, 合并高血压危象

E、 36 周妊娠, 合并癫痫发作

答案: B

169、女性, 45 岁。既往月经正常, 近一年来经期延长 10-15 天, 量多, 此次停经 50 天后阴道出血 20 天, 血红蛋白 80g/L, 盆腔检查(-), 基础体温单相. 为排除宫体癌应该进行下列何项辅助检查

A、 CA125 测定

B、 腹腔镜检查并作活检

C、 分段诊刮并送病理

D、 超声检查

E、 子宫输卵管造影

答案: C

170、患者, 37 岁。闭经, 伴有潮热, 易出汗, 查体: 子宫、附件无异常所见, 曾做雌激素试验(+). 该患者的诊断首先考虑为

A、 子宫性闭经

B、 下丘脑性闭经

C、 垂体性闭经

D、 多囊卵巢综合征

E、 卵巢功能早衰

答案: E

171、29 岁孕妇, 妊娠 32 周, 3 周内阴道少量流血 2 次, 今凌晨突然阴道流血多于月经量, 无腹痛, 血压 13. 3/10. 7kPa, 脉率 96 次/分, 宫高 30cm, 腹围 85cm, 臀先露, 未入盆, 胎心音清楚, 144 次/分. 应最先考虑的疾病是

A、 早产

B、 前置胎盘

C、 胎盘早期剥离

D、 宫颈息肉

E、 妊娠合并宫颈癌

答案: B

172、29 岁孕妇, 妊娠 32 周, 3 周内阴道少量流血 2 次, 今凌晨突然阴道流血多于月经量, 无腹痛, 血压 13. 3/10. 7kPa, 脉率 96 次/分, 宫高 30cm, 腹围 85cm, 臀先露, 未入盆, 胎心音清楚, 144 次/分. 下述何项处理是错误的

- A、 住院观察
- B、 绝对卧床休息
- C、 配血备用
- D、 口服镇静药片
- E、 肛指检查

答案： E

173、患者, 37 岁。闭经, 伴有潮热, 易出汗, 查体: 子宫、附件无异常所见, 曾做雌激素试验(+). 上述患者血化验的结果应为

- A、 HCG ↑
- B、 LH, RH ↑
- C、 LH, FSH ↑
- D、 LH, FSH ↓
- E、 E ↑

答案： C

174、患者, 37 岁。闭经, 伴有潮热, 易出汗, 查体: 子宫、附件无异常所见, 曾做雌激素试验(+). 上述患者下一步治疗应为

- A、 雌一孕激素序贯
- B、 促排卵
- C、 大剂量雌激素
- D、 大剂量孕激素
- E、 雄激素

答案： A

175、女性, 45 岁。既往月经正常, 近一年来经期延长 10-15 天, 量多, 此次停经 50 天后阴道出血 20 天, 血红蛋白 80g/L, 盆腔检查(-), 基础体温单相. 如通过检查排除宫体癌后, 应考虑为

- A、 子宫黏膜下肌瘤
- B、 子宫内膜炎
- C、 子宫内膜息肉
- D、 无排卵型功血
- E、 排卵型功血

答案： D

176、女性, 46 岁。既往月经正常, 近一年来经期延长 10 余天, 量较多, 此次停经 46 天后阴道出血 20 天, 盆腔检查未及异常, 血红蛋白 80g/L, B 超提示子宫内膜厚 10mm, 对该病人最佳治疗方案是

- A、 雌激素周期疗法, 以调整周期
- B、 雌-孕激素联合周期治疗
- C、 促排卵药以调整周期
- D、 刮宫
- E、 月经周期后半期应用孕激素

答案: D

177、25 岁, G1P0, 停经 36 周, 水肿一周, 头痛、视物不清 2 天, 加重伴恶心、呕吐半天, 抽搐 1 次急诊入院, 查体: 血压 195/120mmHg, 水肿 3+, 胎心 120 次/分, 不规律宫缩, 肛查: 宫口未开, 先露棘平, 骨产道正常. 首选紧急处理是

- A、 肌内注射地西洋
- B、 肌内注射山莨菪碱
- C、 静脉注射甘露醇
- D、 静脉推注肼屈嗪
- E、 静脉滴注硫酸镁, 并给予镇静剂

答案: E

178、25 岁, G1P0, 停经 36 周, 水肿一周, 头痛、视物不清 2 天, 加重伴恶心、呕吐半天, 抽搐 1 次急诊入院, 查体: 血压 195/120mmHg, 水肿 3+, 胎心 120 次/分, 不规律宫缩, 肛查: 宫口未开, 先露棘平, 骨产道正常. 入院处理 6 小时未再抽搐, 血压 185/105mmHg, 最适当的处理是

- A、 即刻剖宫产终止妊娠
- B、 进入第二产程后予以助产
- C、 积极解痉、镇静防止再抽搐
- D、 人工破膜, 静脉滴注缩宫素引产
- E、 继续治疗 24~48 小时, 血压控制不满意即终止妊娠

答案: A

179、29 岁孕妇, 妊娠 32 周, 3 周内阴道少量流血 2 次, 今凌晨突然阴道流血多于月经量, 无腹痛, 血压 13.3/10.7kPa, 脉率 96 次/分, 宫高 30cm, 腹围 85cm, 臀先露, 未入盆, 胎心音清楚, 144 次/分. 以下辅助检查中应首选哪一项对确定诊断意义最大

- A、 血常规
- B、 血小板测定
- C、 B超
- D、 X线摄片
- E、 阴道检查

答案： C

180、 32岁妇女,孕3产2,阴道排液及接触性出血3月。一般状态良好,妇查:宫颈轻糜,宫体前位,大小正常,活动好,双附件(一),宫颈活检为,宫颈鳞癌细胞呈泪滴状向间质浸润,深度<3mm,无病灶融合及脉管侵犯。其诊断应为

- A、 0期
- B、 IA
- C、 IB
- D、 IIA
- E、 IIIA

答案： B

181、 32岁妇女,孕3产2,阴道排液及接触性出血3月。一般状态良好,妇查:宫颈轻糜,宫体前位,大小正常,活动好,双附件(一),宫颈活检为,宫颈鳞癌细胞呈泪滴状向间质浸润,深度<3mm,无病灶融合及脉管侵犯。应采用何种治疗方法

- A、 宫颈锥形切除术
- B、 经腹子宫切除术
- C、 放射治疗
- D、 广泛性子宫切除术+盆腔淋巴结清扫术
- E、 子宫切除术

答案： E

182、 女性.26岁,外阴瘙痒伴分泌物增多7天,妇科检查:阴道黏膜散在红色斑点,阴道内多量脓性泡沫状分泌物,有臭味.对此病人进行检查时,不正确操作是

- A、 取分泌物前不能做双合诊
- B、 取分泌物前先行碱性液体冲洗
- C、 取分泌物行悬滴法检查
- D、 可疑病人多次悬滴法阴性时做培养

E、 检查标本应注意保暖

答案： B

183、女, 28 岁, 因停经 52 天, 阴道出血 1 周, 诊断先兆流产, 入院安胎。次日腹痛伴阴道流血增多, 蹲厕时见到有组织物排出, 阴道出血仍不止, 腹痛减轻. 最可能的诊断是

- A、 难免流产
- B、 不完全流产
- C、 完全流产
- D、 稽留流产
- E、 习惯性流产

答案： B

184、女, 28 岁, 因停经 52 天, 阴道出血 1 周, 诊断先兆流产, 入院安胎。次日腹痛伴阴道流血增多, 蹲厕时见到有组织物排出, 阴道出血仍不止, 腹痛减轻. 最有助于诊断的检查是

- A、 B 型超声检查附件有无肿块
- B、 阴道检查子宫大小和宫口开张情况
- C、 血 β -hCG 定量测定
- D、 后穹窿穿刺有不凝血液
- E、 阴道检查宫颈举痛

答案： B

185、27 岁已婚女性, 因停经 52 天, 阴道出血 1 周, 诊断先兆流产, 入院保胎。入院第二日腹痛伴阴道流血增多, 见到有组织物排出, 阴道出血仍不止, 腹痛减轻. 此时最恰当的处理是

- A、 清宫
- B、 B 超检查宫腔有无残留胚胎, 然后决定处理方案
- C、 缩宫素静脉滴注
- D、 抗炎+观察
- E、 宫腔镜检查

答案： A

186、女性, 36 岁, 阴道黏液脓性分泌物增多, 性交后出血, 尿急、尿频、尿痛 3 天。妇科检查: 尿道口、阴道口黏膜充血, 多量脓性分泌物。宫颈充血、水肿、黏膜外翻, 宫颈管内可见大量脓性分泌物, 宫颈触血阳性。该患可能的诊断为

- A、 急性淋病
- B、 急性宫颈炎
- C、 急性盆腔炎
- D、 急性尿路感染
- E、 慢性盆腔炎

答案： B

187、女性, 36 岁, 阴道黏液脓性分泌物增多, 性交后出血, 尿急、尿频、尿痛 3 天。妇科检查:尿道口、阴道口黏膜充血, 多量脓性分泌物。宫颈充血、水肿、黏膜外翻, 宫颈管内可见大量脓性分泌物, 宫颈触血阳性。下一步治疗应选择

- A、 理疗
- B、 观察经过
- C、 抗炎治疗
- D、 子宫全切术
- E、 宫颈电锥切术

答案： C

188、28 岁足月孕妇, 临产 3 小时自然破水, 羊水黄绿, 胎心(110~120)次/分, 宫缩 40 秒/(2~3)分, 立即行剖宫产术。术中取出胎儿后, 产妇突然呛咳, 烦躁不安, 呼吸困难, 口唇发绀, 血压 80/50mmHg, 呼吸 50 次/分, 两肺闻及湿啰音, 子宫软, 出血较多。最可能的诊断为

- A、 子痫
- B、 休克
- C、 羊水栓塞
- D、 心力衰竭
- E、 急性肺炎

答案： C

189、28 岁足月孕妇, 临产 3 小时自然破水, 羊水黄绿, 胎心(110~120)次/分, 宫缩 40 秒/(2~3)分, 立即行剖宫产术。术中取出胎儿后, 产妇突然呛咳, 烦躁不安, 呼吸困难, 口唇发绀, 血压 80/50mmHg, 呼吸 50 次/分, 两肺闻及湿啰音, 子宫软, 出血较多。立即进行的以下处理, 哪项错误

- A、 正压给氧, 补充血容量
- B、 静推氨茶碱
- C、 阿托品静注

D、 静脉推注地塞米松

E、 静滴缩宫素

答案： E

190、 32 岁初产妇, 孕 41 周, 规则宫缩 12 小时, 破膜 2 小时, 宫口开全 1 小时, 宫缩 40~45 秒, 间隔 1~2 分钟。羊水黄绿色, 胎心 110 次/分, CST 示晚期减速, 胎儿头皮血 pH7. 19。此时最可能的诊断是

A、 过期妊娠

B、 胎膜早破

C、 胎儿窘迫

D、 宫缩过强

E、 第二产程延长

答案： C

191、 32 岁初产妇, 孕 41 周, 规则宫缩 12 小时, 破膜 2 小时, 宫口开全 1 小时, 宫缩 40~45 秒, 间隔 1~2 分钟。羊水黄绿色, 胎心 110 次/分, CST 示晚期减速, 胎儿头皮血 pH7. 19。此时最需要的检查是

A、 肛查

B、 阴道检查

C、 B 超检查

D、 羊膜镜检查

E、 血常规

答案： B

192、 23 岁女性, 停经 3 月余, 阴道少量血性分泌物 2 日就诊, 停经 40 日尿妊娠试验阳性, 妇检: 子宫如妊娠 8 周大小, B 超宫内见到妊娠囊, 未见原始心管搏动根据患者的临床表现, 可能的诊断是

A、 先兆流产

B、 稽留流产

C、 难免流产

D、 习惯性流产

E、 不全流产

答案： B

193、 受精卵约在受精后第几日在宫腔内着床

- A、 3~4 日
- B、 4~5 日
- C、 5~6 日
- D、 6~7 日
- E、 7~8 日

答案： D

194、子宫颈细胞学检查 HSIL 提示：

- A、 宫颈正常
- B、 宫颈炎
- C、 炎症修复
- D、 可疑癌前病变
- E、 可疑宫颈鳞癌

答案： D

195、女性生殖器官最常见的良性肿瘤是

- A、 子宫肉瘤
- B、 子宫肌瘤
- C、 卵巢畸胎瘤
- D、 卵巢浆液性囊腺瘤
- E、 卵巢纤维瘤

答案： B

196、关于子宫峡部, 哪项错误

- A、 是宫体与宫颈之间最狭窄的部分
- B、 其上端是组织学内口, 下端是解剖学内口
- C、 子宫峡部下端一下的内膜由宫腔内膜转化为宫颈粘膜
- D、 非孕期长约 1cm, 妊娠晚期可达 7~10cm, 形成子宫下段
- E、 子宫峡部的内膜可随月经周期而呈周期性变化

答案： B

197、四步触诊法中第二步的目的是判断

- A、 胎头的位置
- B、 宫底部的胎儿部分
- C、 胎背和肢体
- D、 胎臀的位置
- E、 胎儿先露部及其入盆程度

答案： C

198、足月妊娠时的羊水量约为

- A、 1000ml
- B、 800ml
- C、 600ml
- D、 400ml
- E、 300ml

答案： B

199、枕右前位胎头进入骨盆入口时衔接的径线是

- A、 双顶径
- B、 双颞径
- C、 枕下前凶径
- D、 枕额径
- E、 枕颈径

答案： D

200、新生儿娩出后首先应

- A、 断脐
- B、 擦洗新生儿面部
- C、 清理呼吸道
- D、 刺激新生儿足部
- E、 娩出胎盘及胎膜

答案： C

201、关于流产的治疗原则, 以下错误的是

- A、 早期先兆流产时可肌内注射黄体酮
- B、 不全流产应尽快行刮宫术
- C、 完全流产一般不需特殊处理
- D、 流产合并感染且阴道流血不多时应抗感染及刮宫同时进行
- E、 稽留流产处理前应常规查血常规、凝血功能,并做好输血准备

答案: D

202、临产的标志是

- A、 腹痛
- B、 见红
- C、 不规律宫缩
- D、 规律宫缩
- E、 宫口开全

答案: D

203、枕前位胎头通过软产道时进行内旋转是使胎头的

- A、 矢状缝与骨盆入口横径相一致
- B、 矢状缝与中骨盆横径相一致
- C、 矢状缝与中骨盆及骨盆出口前后径相一致
- D、 前囟转至耻骨弓下面
- E、 后囟转至骶骨前方

答案: C

204、胎盘早剥主要的病理变化是

- A、 包蜕膜出血
- B、 真蜕膜出血
- C、 底蜕膜出血
- D、 子宫肌层出血
- E、 胎盘边缘血窦破裂出血

答案: C

205、心脏病孕妇最容易发生心力衰竭的时期是

- A、 妊娠 20-22 周
- B、 妊娠 24-26 周
- C、 妊娠 28-30 周
- D、 妊娠 32-34 周
- E、 妊娠 36-38 周

答案： D

206、不属于阴道正常微生物群的是

- A、 大肠埃希菌
- B、 乳杆菌
- C、 支原体
- D、 衣原体
- E、 加德纳菌

答案： D

207、下列哪项不是盆腔炎性疾病手术指征

- A、 脓肿破裂
- B、 脓肿持续存在
- C、 输卵管积水
- D、 慢性输卵管炎
- E、 脓肿经药物治疗无效

答案： D

208、宫颈癌最常见的转移途径是

- A、 直接蔓延
- B、 腹股沟淋巴结
- C、 宫旁、闭孔淋巴结
- D、 血行转移
- E、 种植转移

答案： A

209、下列哪项不属于卵巢上皮性肿瘤

- A、 浆液性肿瘤
- B、 粘液性肿瘤
- C、 子宫内膜样肿瘤
- D、 腹膜假粘液瘤
- E、 畸胎瘤

答案： E

210、侵蚀性葡萄胎与绒癌的鉴别,主要依靠哪项

- A、 有无肺转移
- B、 黄素囊肿的大小
- C、 病理标本有无绒毛结构
- D、 有无阴道转移
- E、 有无脑转移

答案： C

211、导致子宫脱垂的最主要原因是

- A、 多产
- B、 先天发育不良
- C、 长期便秘
- D、 感冒咳嗽
- E、 阴道分娩

答案： E

212、子宫内膜异位症病灶最多见的部位是

- A、 卵巢
- B、 输卵管
- C、 子宫后壁下段
- D、 直肠子宫陷凹
- E、 宫骶韧带

答案： A

213、关于短效口服避孕药作用机制,不正确的是

- A、 抑制排卵
- B、 改变宫颈粘液性状
- C、 影响精子获能
- D、 抑制子宫内膜增殖变化
- E、 使子宫内膜分泌不良

答案： E

214、 25 岁已婚女性, 15 岁初潮, 平时月经周期规律, 周期 32 日, 持续 7 日, 预测排卵日期应在月经周期的

- A、 第 14 日
- B、 第 18 日
- C、 第 21 日
- D、 第 23 日
- E、 第 29 日

答案： B

215、 25 岁孕妇, 妊娠 38 周, 无宫缩。 产科检查: 宫底的胎儿部分宽而软, 右侧胎儿部分呈结节状, 左侧胎儿部分宽而平坦且占据大部分, 耻上的胎儿部分圆而硬, 此时胎位是

- A、 枕右前位
- B、 枕左前位
- C、 枕左横位
- D、 骶右前位
- E、 骶左前位

答案： B

216、 30 岁孕妇, 妊娠 7 周, 下腹隐痛伴少量阴道流血。 妇检: 宫颈口未开, 无宫颈举痛, 子宫如孕 7 周大小, 附件区未及异常。 目前最有价值的检查是

- A、 尿雌三醇测定
- B、 血 HPL 测定
- C、 B 超检查
- D、 尿 HCG 测定

E、 AFP 测定

答案： C

217、 26 岁未婚女性, 有性生活, 停经 45 天, 阴道少量流血 5 天, 4 小时前突感右侧下腹撕裂样疼痛, 1 小时前出现肛门坠胀感伴头晕呕吐。体格检查: 面色苍白, P105 次/分, BP 85/55mmHg, 下腹压痛反跳痛, 移动性浊音阳性。妇科检查: 阴道少量血性分泌物, 宫颈举痛, 后穹隆饱满, 子宫稍大, 附件区触诊不满意。最恰当的处理是

- A、 纠正休克同时剖腹探查
- B、 腹腔镜检查
- C、 尽快行刮宫术
- D、 快速补液并输血治疗
- E、 立即行阴道后穹隆穿刺术

答案： A

218、 经产妇, 31 岁, 孕 36 周+5, 阴道多量流血 2 小时, 无腹痛, 入院查血压 87/55mmHg, 脉搏 106 次/分, 未及宫缩, 宫底在剑突下 2 指, 臀先露, 胎心 100 次/分。本例最可能的诊断是

- A、 前置胎盘
- B、 正常产程
- C、 先兆临产
- D、 胎盘早剥
- E、 先兆子宫破裂

答案： A

219、 35 岁已婚女性, 未避孕, 停经 46 天, 下腹痛伴阴道流血 10 小时, 阴道流血较月经量多。妇科检查: 子宫饱满, 宫颈口见组织物堵塞, 见活动性出血。本例最适宜的措施是

- A、 注射止血药物
- B、 肌内注射或静滴缩宫素
- C、 尽早行刮宫术
- D、 纱布填塞阴道压迫止血
- E、 积极保胎治疗

答案： C

220、33岁女性,停经44天,阴道少量流血伴下腹隐痛5天,B超宫内未见孕囊,行吸宫术,病理报告为蜕膜组织。应考虑下列哪种疾病

- A、 闭经
- B、 先兆流产
- C、 月经
- D、 功血
- E、 异位妊娠

答案： E

221、25岁初产妇,临产后静脉滴注缩宫素,破膜后不久突然出现呛咳,呼吸困难,发绀,数分钟后死亡。最可能的诊断是

- A、 子痫
- B、 妊娠合并心脏病
- C、 羊水栓塞
- D、 胎盘早剥
- E、 子宫破裂

答案： C

222、32岁女性,因肺炎入院治疗,应用抗生素2周,自觉外阴瘙痒,分泌物增多,应首先考虑

- A、 前庭大腺炎
- B、 细菌性阴道病
- C、 滴虫阴道炎
- D、 外阴阴道假丝酵母菌病
- E、 非特异性外阴炎

答案： D

223、女性,31岁,婚后3年不孕至今。平日月经规则,基础体温双相,继发痛经3年,妇科检查:子宫正常,双附件增厚。配偶精液正常,其不孕原因可能是

- A、 排卵因素

- B、 输卵管因素
- C、 子宫因素
- D、 宫颈因素
- E、 免疫因素

答案： B

224、 28 岁女性, 6 月前孕 50 天行人工流产术, 术后月经未来潮, 雌、 孕激素试验均阴性, 闭经的原因应是

- A、 卵巢性闭经
- B、 垂体性闭经
- C、 下丘脑性闭经
- D、 子宫性闭经
- E、 难以确定

答案： D

225、 女性, 52 岁, 绝经 3 年出现阴道淋漓流血半月。 检查: 右附件区扪及胎儿头大小实性肿物, 阴道脱落细胞检查提示雌激素高度影响, 子宫内膜活检为单纯性增生。 本例最可能的诊断是

- A、 纤维瘤
- B、 浆液性囊腺瘤
- C、 良性畸胎瘤
- D、 液性囊腺瘤
- E、 卵泡膜细胞瘤

答案： E

226、 25 岁已婚女性, 人工流产术中突感胸闷、 头晕、 恶心。 查体: 面色苍白、 大汗淋漓, 血压 80/50mmHg, 脉搏 50 次/分。 此时应首先给予

- A、 输血补液
- B、 阿托品静脉注射
- C、 苯巴比妥钠肌注
- D、 迅速消除宫腔内容物
- E、 阿拉明静脉滴注

答案： B

227、33岁女性,婚后3年未孕,痛经。妇科检查:宫底韧带处可触及触痛结节,右侧附件可及一6×6×7cm大小的包块,活动差,半囊半实,下列哪种诊疗最适宜

- A、 B超
- B、 腹腔镜+组织病理检查
- C、 宫腔镜检查
- D、 诊断性刮宫
- E、 CA125测定

答案： B

228、30岁已婚女性,未育,平时月经多,已确诊为子宫肌瘤,呈单个结节,子宫如孕2月半大,血红蛋白85g/L,最恰当的处理是

- A、 随访观察
- B、 纠正贫血
- C、 子宫肌瘤剔除术
- D、 子宫次全切术
- E、 子宫全切术

答案： C

229、子宫肌瘤与临床症状关系最密切的是

- A、 肌瘤大小
- B、 肌瘤数目
- C、 肌瘤生长部位
- D、 肌瘤有无变性
- E、 肌瘤与肌壁的关系

答案： E

230、正常分娩保护会阴的时间是(1.5)

- A、 初产妇宫口全开时
- B、 初产妇先露着冠时
- C、 经产妇宫口开大5~6cm时

- D、 经产妇宫口全开时
- E、 初产妇头拨露使会阴后联合皮肤膨胀时

答案： E

231、胎头衔接是指

- A、 枕骨进入骨盆入口平面
- B、 顶骨进入骨盆入口平面
- C、 双顶径进入骨盆入口平面
- D、 双顶径到达坐骨棘水平
- E、 双顶径到达坐骨结节水平

答案： C

232、子宫收缩乏力性出血最常用的止血方法是

- A、 按摩子宫,应用宫缩剂
- B、 结扎子宫动脉上行支
- C、 结扎髂内动脉
- D、 髂内动脉栓塞术
- E、 子宫次全切除术

答案： A

233、25岁已婚妇女,停经43天,少量咖啡色阴道流血5天。尿妊娠试验阴性,2小时前突发下腹痛伴肛门坠胀感。妇科检查:阴道少量血性分泌物,宫颈举痛(+),后穹窿饱满,子宫增大不明显,附件区触诊不满意。本例最可能的诊断为

- A、 急性盆腔炎
- B、 异位妊娠
- C、 先兆流产
- D、 卵巢黄体破裂
- E、 难免流产

答案： D

234、绒癌最可靠的诊断依据是

- A、 尿妊娠试验阳性
- B、 胸部X线摄片,见肺部有转移结节

- C、 阴道可见蓝紫色结节
- D、 镜下见滋养细胞恶性增生, 无绒毛结构
- E、 镜下可见出血和坏死

答案: D

235、 25 岁, G1P0, 停经 36 周, 水肿一周, 头痛、 视物不清 2 天, 加重伴恶心、 呕吐半天, 抽搐 1 次急诊入院, 查体: 血压 195/120mmHg, 水肿 3+, 胎心 120 次/分, 不规律宫缩, 肛查: 宫口未开, 先露棘平, 骨产道正常. 本例应诊断为

- A、 36 周妊娠, 子痫前期
- B、 36 周妊娠, 产前子痫
- C、 36 周妊娠, 合并脑出血
- D、 36 周妊娠, 合并高血压危象
- E、 36 周妊娠, 合并癫痫发作

答案: B

236、 38 岁孕妇, 妊娠 36 周, 1 月内阴道少量流血 3 次, 无腹痛, 血压 95/60mmHg, 脉率 95 次/分, 宫高 30cm, 腹围 85cm, 臀先露, 未入盆, 胎心音清楚, 144 次/分. 应最先考虑的疾病是

- A、 早产
- B、 前置胎盘
- C、 胎盘早期剥离
- D、 宫颈息肉
- E、 妊娠合并宫颈癌

答案: B

237、 符合绝经后女性的激素表现是

- A、 FSH 及 LH 均降低
- B、 FSH 及 LH 均升高
- C、 E2 水平低, FSH 低
- D、 FSH、 LH、 E2 均升高
- E、 FSH 持续低水平, LH 无高峰形成

答案: B

238、若卵子排出后未受精,黄体开始萎缩的时间在排卵后

- A、 5~6 天
- B、 7~8 天
- C、 9~10 天
- D、 11~12 天
- E、 13~14 天

答案: C

239、下列哪项不是胎盘剥离征象

- A、 子宫底升高达脐上
- B、 宫体变硬,呈球形
- C、 阴道口外露的脐带自行下降
- D、 于耻骨上方压子宫下段,脐带回缩
- E、 阴道少量流血

答案: D

240、输卵管妊娠最常见的部位是

- A、 输卵管伞部
- B、 输卵管峡部
- C、 输卵管间质部
- D、 输卵管壶腹部
- E、 输卵管间质部与峡部之间

答案: D

241、能产生甲胎蛋白的卵巢肿瘤是

- A、 卵泡膜细胞瘤
- B、 颗粒细胞瘤
- C、 成熟性畸胎瘤
- D、 卵黄囊瘤
- E、 粘液性囊腺瘤

答案: D

242、青春期功血的治疗原则是

- A、 减少月经量
- B、 调整周期,减少经量
- C、 止血、调整周期、促排卵
- D、 促进子宫发育
- E、 刮宫

答案: C

243、下列哪项依据属于子宫内膜癌的治疗原则

- A、 患者年龄
- B、 肿瘤细胞的分化程度
- C、 患者是否绝经
- D、 子宫肌层和颈管是否被累及浸润
- E、 患者全身情况

答案: ABDE

244、下列哪项是葡萄胎清宫后随访时必须的

- A、 定期妇科检查
- B、 可靠避孕 1 年
- C、 定期胸部 X 线或 CT 检查
- D、 定期 HCG 定量测定
- E、 定期阴道细胞学检查

答案: ABCD

245、卵巢肿瘤的并发症有

- A、 蒂扭转
- B、 破裂
- C、 感染
- D、 出血
- E、 恶变

答案: ABCE

246、放置宫内节育器的并发症有

- A、 宫内节育器嵌顿
- B、 宫内节育器异位
- C、 宫内节育器脱落
- D、 带器妊娠
- E、 宫颈糜烂

答案： ABCD

247、盆腔炎性疾病的感染途径有

- A、 沿生殖道黏膜上行蔓延
- B、 经淋巴系统蔓延
- C、 经血循环传播
- D、 直接蔓延
- E、 以上都不对

答案： ABCD

248、子宫内膜异位症引起不孕的原因有

- A、 黄体期功能不足
- B、 排卵障碍
- C、 输卵管阻塞
- D、 痛经
- E、 月经过多

答案： ABC

249、影响分娩的因素有

- A、 产力
- B、 产道
- C、 胎儿
- D、 精神心理因素
- E、 免疫因素

答案： ABCD

250、用硫酸镁治疗子痫前期最早出现的毒性反应,错误的是

- A、 血压降低
- B、 心率减慢
- C、 膝反射消失
- D、 尿量减少
- E、 呼吸次数减少

答案: ABDE

251、卵巢恶性肿瘤的辅助诊断有意义的有哪些

- A、 腹水细胞学检查
- B、 CT 检查
- C、 超声检查
- D、 性激素测定
- E、 宫腔镜检查

答案: ABCD

252、关于产后出血正确的是

- A、 阴道分娩者胎儿娩出后 24 小时内阴道流血 \geq 500ml
- B、 阴道分娩者胎盘娩出后 24 小时内阴道流血 \geq 500ml
- C、 剖宫产者胎儿娩出后 24 小时内阴道流血 \geq 500ml
- D、 剖宫产者胎儿娩出后 24 小时内阴道流血 \geq 1000ml
- E、 剖宫产者胎盘娩出后 24 小时内阴道流血 \geq 1000ml

答案: AD

253、胎盘由以下哪项组织组成

- A、 平滑绒毛膜+包蜕膜+羊膜
- B、 平滑绒毛膜+底蜕膜+真蜕膜
- C、 叶状绒毛膜+包蜕膜+真蜕膜
- D、 叶状绒毛膜+底蜕膜+羊膜
- E、 叶状绒毛膜+包蜕膜+底蜕膜

答案: D

254、30岁女性,停经47天,阴道少量出血伴下腹隐痛2天。行吸宫术,病理报告为“蜕膜组织”。首先应考虑的疾病是

- A、闭经
- B、月经延迟
- C、先兆流产
- D、不全流产
- E、异位妊娠

答案: E

255、30岁已婚妇女,月经量多2年,自然流产3次,B超检查提示子宫前壁内探及8cm直径低回声团,双附件正常。最适宜的治疗是

- A、子宫全切除
- B、子宫次全切除
- C、肌瘤剔除术
- D、诊断性刮宫术
- E、药物保守治疗

答案: C

256、患者,26岁,人流术后半年,阴道不规则流血,近1个月开始厌食、恶心、肝区痛,肝脏超声,见多个异常回声,血hCG明显增高,诊断为绒癌肝转移,其分期为

- A、I期
- B、II期
- C、III期
- D、IV期
- E、分期依据不足

答案: D

257、25岁已婚女性,痛经3年逐渐加重,月经量增多,本次行经10天,血仍未止,2年前因不孕做过输卵管通液治疗,子宫较正常略大,后位,不活动,右侧触及5cm×4cm×3cm大的韧性包块与子宫粘连;左侧附件增厚,双宫骶韧带均及豆粒大痛性结节,本病首先考虑为

- A、陈旧性宫外孕
- B、生殖器结核

- C、慢性盆腔炎
- D、子宫内膜异位症
- E、输卵管卵巢囊肿

答案： D

258、患者, 28 岁。目前月经干净 3 天, 暂无生育要求, 来院咨询采取何种方法避孕。月经规则, 5/30, 已经生育一女, 3 岁
根据该患者的情况, 以下避孕方法哪种不合适

- A、宫内节育器
- B、输卵管绝育术
- C、短效口服避孕药
- D、长效口服避孕药
- E、皮下埋植剂

答案： B

259、正常分娩保护会阴的时间, 错误的是

- A、初产妇宫口全开时
- B、初产妇先露着冠时
- C、经产妇宫口开大 5-6cm 时
- D、经产妇宫口全开时
- E、初产妇头拨露使会阴后联合皮肤膨胀时

答案： ABCD

260、子宫颈细胞学检查 HSIL 提示
(1.5)

- A、宫颈正常
- B、宫颈炎
- C、炎症修复
- D、可疑癌前病变
- E、可疑宫颈鳞癌

答案： D

261、女性生殖器官最常见的恶性肿瘤是

- A、子宫颈癌

- B、 子宫内膜癌
- C、 输卵管癌
- D、 绒毛膜癌
- E、 卵巢癌

答案： A

262、绝经后子宫肌瘤迅速增大伴疼痛出血应考虑

- A、 感染
- B、 肉瘤样变
- C、 囊性变
- D、 红色变性
- E、 钙化

答案： B

263、四步触诊法中第二步的目的是判断

- A、 胎头的位置
- B、 宫底部的胎儿部分
- C、 胎背和肢体
- D、 胎臀的位置
- E、 胎儿先露部及其入盆程度

答案： C

264、足月妊娠时的羊水量约为

- A、 1000ml
- B、 800ml
- C、 600ml
- D、 400ml
- E、 300ml

答案： B

265、枕左前位胎头进入骨盆入口时衔接的径线是

- A、 双顶径

- B、 双颞径
- C、 枕下前凶径
- D、 枕额径
- E、 枕颈径

答案： D

266、新生儿娩出后首先应

- A、 断脐
- B、 擦洗新生儿面部
- C、 清理呼吸道
- D、 刺激新生儿足部
- E、 娩出胎盘及胎膜

答案： C

267、关于流产的治疗原则, 以下错误的是

- A、 早期先兆流产时可肌内注射黄体酮
- B、 不全流产应尽快行刮宫术
- C、 完全流产一般不需特殊处理
- D、 流产合并感染且阴道流血不多时应抗感染及刮宫同时进行
- E、 稽留流产处理前应常规查血常规、凝血功能, 并做好输血准备

答案： D

268、临产的标志是

- A、 腹痛
- B、 见红
- C、 不规律宫缩
- D、 规律宫缩
- E、 宫口开全

答案： D

**269、枕左前位胎头通过软产道时进行内旋转是使胎头的
(1.5)**

- A、 矢状缝与骨盆入口横径相一致

- B、 矢状缝与中骨盆横径相一致
- C、 矢状缝与中骨盆及骨盆出口前后径相一致
- D、 前囟转至耻骨弓下面
- E、 后囟转至骶骨前方

答案： C

270、胎盘早剥主要的病理变化是

- A、 包蜕膜出血
- B、 底蜕膜出血
- C、 真蜕膜出血
- D、 子宫肌层出血
- E、 胎盘边缘血窦破裂出血

答案： B

271、心脏病孕妇最容易发生心力衰竭的时期是

- A、 妊娠 20-22 周
- B、 妊娠 24-26 周
- C、 妊娠 28-30 周
- D、 妊娠 32-34 周
- E、 妊娠 36-38 周

答案： D

272、与葡萄胎诊断不符合的临床表现是

- A、 阴道不规则流血
- B、 卵巢黄素化囊肿
- C、 高血压、蛋白尿
- D、 胸痛及咯血
- E、 阵发性腹痛

答案： D

273、下列哪项不是盆腔炎性疾病手术指征

- A、 脓肿破裂

- B、 脓肿持续存在
- C、 输卵管积水
- D、 慢性输卵管炎
- E、 脓肿经药物治疗无效

答案： D

274、宫颈癌最常见的转移途径是

- A、 直接蔓延
- B、 腹股沟淋巴结
- C、 宫旁、闭孔淋巴结
- D、 血行转移
- E、 种植转移

答案： A

275、下列哪项不属于卵巢肿瘤并发症

- A、 破裂
- B、 扭转
- C、 恶变
- D、 感染
- E、 出血

答案： E

276、侵蚀性葡萄胎与绒癌的鉴别,主要依靠哪项

- A、 有无肺转移
- B、 黄素囊肿的大小
- C、 病理标本有无绒毛结构
- D、 有无阴道转移
- E、 有无脑转移

答案： C

277、生育年龄妇女最常见的闭经原因是

- A、 卵巢功能紊乱

- B、生殖器炎症
- C、妊娠
- D、生殖器肿瘤
- E、生殖器结核

答案： C

278、子宫内膜异位症病灶最多见的部位是

- A、输卵管
- B、卵巢
- C、子宫后壁下段
- D、直肠子宫陷凹
- E、宫骶韧带

答案： B

279、阴道内保持一定酸性,是由于那种细菌分解上皮细胞内糖原的结果

- A、大肠杆菌
- B、链球菌
- C、消化球菌
- D、乳杆菌
- E、酵母菌

答案： D

280、25岁女性,14岁初潮,月经周期规律,周期30日,持续7日,预测排卵日期应在月经周期的

- A、第14日
- B、第16日
- C、第21日
- D、第25日
- E、第29日

答案： B

281、30岁孕妇,妊娠37周,无宫缩。产科检查:宫底的胎儿部分宽而软,左侧胎儿部分呈结节状,右侧胎儿部分宽而平坦且占据大部分,耻上的胎儿部分圆而硬,此时胎位是

- A、枕右前位
- B、枕左前位
- C、枕左横位
- D、骶右前位
- E、骶左前位

答案: A

282、孕妇,30岁,妊娠7周,下腹隐痛及少量阴道流血,妇检:宫颈口未开,无宫颈举痛,子宫如孕7周大小,附件区未及异常。目前最有价值的检查是

- A、尿雌三醇测定
- B、血HPL测定
- C、尿HCG测定
- D、B超检查
- E、AFP测定

答案: D

283、女性,25岁,停经43日,少量阴道流血3日,3小时前突感左下腹撕裂样疼痛,随后出现肛门坠胀感伴头晕呕吐。体格检查:面色苍白,P120次/分,BP 80/40mmHg,腹肌紧张,下腹压痛,移动性浊音阳性。妇科检查:阴道少量血性物,宫颈举痛(+),后穹隆饱满,子宫稍大,附件区触诊不满意。最恰当的处理是

- A、纠正休克同时剖腹探查
- B、腹腔镜检查
- C、尽快行刮宫术
- D、快速补液并输血治疗
- E、立即行阴道后穹隆穿刺术

答案: A

284、30岁经产妇,孕37周,阴道无痛性多量流血3小时入院,查血压85/55mmHg,脉搏102次/分,无宫缩,宫底在剑突下2指,臀先露,胎心95次/分。本例最可能的诊断是

- A、前置胎盘
- B、正常产程
- C、先兆临产
- D、胎盘早剥
- E、先兆子宫破裂

答案： A

285、28岁已婚女性，停经50天，下腹痛伴阴道流血10小时，阴道流血较月经量多。妇科检查：子宫稍大，宫颈口扩张可容1指，并见活动性出血。本例最有效的止血措施是

- A、肌内注射止血药物
- B、尽早行刮宫术
- C、肌内注射或静滴缩宫素
- D、纱布填塞阴道压迫止血
- E、积极保胎治疗

答案： B

286、33岁已婚女性，停经46天，阴道少量流血伴下腹隐痛5天，行吸宫术，病理报告为蜕膜组织。首先应考虑的疾病是

- A、闭经
- B、先兆流产
- C、月经
- D、功血
- E、异位妊娠

答案： E

287、28岁初产妇，临产后静脉滴注缩宫素，破膜后不久突然出现呛咳，呼吸困难，发绀，数分钟后死亡。最可能的诊断是

- A、重度子痫前期
- B、低纤维蛋白原血症
- C、羊水栓塞
- D、胎盘早剥
- E、子宫破裂

答案： C

288、女性, 30 岁, 因肺炎入院治疗, 应用抗生素 2 周, 自觉外阴瘙痒, 分泌物增多, 应首先考虑

- A、 前庭大腺炎
- B、 细菌性阴道病
- C、 滴虫阴道炎
- D、 非特异性外阴炎
- E、 外阴阴道假丝酵母菌病

答案： E

289、女性, 31 岁, 婚后 3 年不孕至今。平日月经规则, 基础体温双相, 继发痛经 3 年, 妇科检查: 子宫正常, 双附件增厚。配偶精液正常, 其不孕原因可能是

- A、 排卵因素
- B、 输卵管因素
- C、 子宫因素
- D、 宫颈因素
- E、 免疫因素

答案： B

290、28 岁女性, 6 月前孕 50 天行人工流产术, 术后月经未来潮, 雌、孕激素试验均阴性, 闭经的原因应是

- A、 卵巢性闭经
- B、 垂体性闭经
- C、 下丘脑性闭经
- D、 子宫性闭经
- E、 难以确定

答案： D

291、女性, 55 岁, 绝经 2 年出现阴道少量流血半月。检查: 右附件区扪及胎儿头大小实性肿物, 阴道脱落细胞检查提示雌激素高度影响, 子宫内膜活检为单纯性增生。本例最可能的诊断是

- A、 纤维瘤

- B、浆液性囊腺瘤
- C、良性畸胎瘤
- D、液性囊腺瘤
- E、卵泡膜细胞瘤

答案： E

292、23岁已婚女性,人工流产术中突感胸闷、头晕、恶心。查体:面色苍白、大汗淋漓,血压80/50mmHg,脉搏50次/分。此时应首先给予

- A、输血补液
- B、阿托品静脉注射
- C、苯巴比妥钠肌注
- D、迅速消除宫腔内容物
- E、阿拉明静脉滴注

答案： B

293、35岁女性,婚后3年未孕,痛经逐年加重。妇科检查:宫底韧带处可触及黄豆大小结节2个,触痛明显,右侧附件可及一7×6×6cm大小的包块,活动差,半囊半实,最有效的确诊方法是

- A、B超
- B、诊断性刮宫
- C、宫腔镜检查
- D、腹腔镜+组织病理检查
- E、CA125测定

答案： D

294、已婚未育妇女,28岁,平时月经过多,已确诊为子宫肌瘤,呈单个结节,子宫如孕3个月大,血红蛋白80g/L,最恰当的处理是

- A、随访观察
- B、纠正贫血
- C、子宫肌瘤剔除术
- D、子宫次全切术
- E、子宫全切术

答案： C

295、子宫肌瘤与临床症状关系最密切的是

- A、 肌瘤大小
- B、 肌瘤数目
- C、 肌瘤生长部位
- D、 肌瘤有无变性
- E、 肌瘤与肌壁的关系

答案： E

296、正常分娩保护会阴的时间是

- A、 初产妇宫口全开时
- B、 初产妇先露着冠时
- C、 经产妇宫口开大 5~6cm 时
- D、 经产妇宫口全开时
- E、 初产妇头拨露使会阴后联合皮肤膨胀时

答案： E

297、胎头衔接是指

- A、 枕骨进入骨盆入口平面
- B、 顶骨进入骨盆入口平面
- C、 双顶径进入骨盆入口平面
- D、 双顶径到达坐骨棘水平
- E、 双顶径到达坐骨结节水平

答案： C

298、子宫收缩乏力性出血最常用的止血方法是

- A、 按摩子宫,应用宫缩剂
- B、 结扎子宫动脉上行支
- C、 结扎髂内动脉
- D、 髂内动脉栓塞术
- E、 子宫次全切除术

答案： A

299、绒癌最可靠的诊断依据是

- A、 尿妊免试验阳性
- B、 胸部 X 线摄片, 见肺部有转移结节
- C、 阴道可见蓝紫色结节
- D、 镜下见滋养细胞恶性增生, 无绒毛结构
- E、 镜下可见出血和坏死

答案： D

300、27 岁已婚女性, G2P1, 停经 36 周, 水肿一周, 头痛、视物不清 2 天, 加重伴恶心、呕吐半天, 抽搐 1 次急诊入院, 查体: 血压 195/120mmHg, 水肿 3+, 胎心 120 次/分, 不规律宫缩, 肛查: 宫口未开, 先露棘平, 骨产道正常. 本例应诊断为

- A、 36 周妊娠, 子痫前期
- B、 36 周妊娠, 产前子痫
- C、 36 周妊娠, 合并脑出血
- D、 36 周妊娠, 合并高血压危象
- E、 36 周妊娠, 合并癫痫发作

答案： B

301、符合绝经后女性的激素表现是

- A、 FSH 及 LH 均降低
- B、 FSH 及 LH 均升高
- C、 E2 水平低, FSH 低
- D、 FSH、LH、E2 均升高
- E、 FSH 持续低水平, LH 无高峰形成

答案： B

302、若卵子排出后未受精, 黄体开始萎缩的时间在排卵后

- A、 5~6 天
- B、 7~8 天
- C、 9~10 天
- D、 11~12 天

E、 13~14 天

答案： C

303、下列哪项不是胎盘剥离征象

- A、 子宫底升高达脐上
- B、 宫体变硬, 呈球形
- C、 阴道口外露的脐带自行下降
- D、 于耻骨上方压子宫下段, 脐带回缩
- E、 阴道少量流血

答案： D

304、输卵管妊娠最常见的部位是

- A、 输卵管伞部
- B、 输卵管峡部
- C、 输卵管间质部
- D、 输卵管壶腹部
- E、 输卵管间质部与峡部之间

答案： D

305、能产生甲胎蛋白的卵巢肿瘤是

- A、 卵泡膜细胞瘤
- B、 颗粒细胞瘤
- C、 成熟性畸胎瘤
- D、 卵黄囊瘤
- E、 粘液性囊腺瘤

答案： D

306、青春期功血的治疗原则是

- A、 减少月经量
- B、 调整周期, 减少经量
- C、 止血、调整周期、促排卵
- D、 促进子宫发育

E、刮宫

答案： C

307、欲行全子宫加双附件切除,不需要切断的韧带是

A、圆韧带

B、卵巢固有韧带

C、卵巢悬韧带

D、阔韧带

E、主韧带

答案： B

308、卵巢动脉来自

A、髂总动脉

B、髂内动脉

C、腹主动脉

D、子宫动脉

E、肾动脉

答案： C

309、关于外阴阴道假丝酵母菌病正确的是

答案：

310、关于短效口服避孕药作用机制,正确的是

A、抑制排卵

B、改变宫颈粘液性状

C、抑制子宫内膜增殖变化

D、使子宫内膜分泌反应不良

E、影响精子获能

答案： ABCE

311、子宫内膜癌的高危因素有

A、肥胖

B、高血压

- C、 糖尿病
- D、 长期服用孕激素
- E、 绝经延迟

答案： ABCE

312、放置宫内节育器的并发症有

- A、 宫内节育器嵌顿
- B、 宫内节育器异位
- C、 宫内节育器脱落
- D、 带器妊娠
- E、 子宫颈糜烂

答案： ABCD

313、盆腔炎性疾病的感染途径有

- A、 沿生殖道黏膜上行蔓延
- B、 经淋巴系统蔓延
- C、 经血循环传播
- D、 直接蔓延
- E、 以上都不对

答案： ABCD

314、子宫内膜异位症引起不孕的原因有

- A、 黄体期功能不足
- B、 排卵障碍
- C、 输卵管阻塞
- D、 痛经
- E、 月经过多

答案： ABC

315、影响分娩的因素有

- A、 产力
- B、 产道

- C、 胎儿
- D、 精神心理因素
- E、 免疫因素

答案： ABCD

316、用硫酸镁治疗子痫前期最早出现的毒性反应, 错误的是

- A、 血压降低
- B、 心率减慢
- C、 膝反射消失
- D、 尿量减少
- E、 呼吸次数减少

答案： ABDE

317、不属于宫颈癌前病变的是

- A、 宫颈鳞状上皮化生
- B、 宫颈鳞状上皮化
- C、 宫颈高级别鳞状上皮内病变
- D、 宫颈重度糜烂
- E、 宫颈息肉

答案： ABDE

318、关于产后出血正确的是

- A、 阴道分娩者胎儿娩出后 24 小时内阴道流血 \geq 500ml
- B、 阴道分娩者胎盘娩出后 24 小时内阴道流血 \geq 500ml
- C、 剖宫产者胎儿娩出后 24 小时内阴道流血 \geq 500ml
- D、 剖宫产者胎儿娩出后 24 小时内阴道流血 \geq 1000ml
- E、 剖宫产者胎盘娩出后 24 小时内阴道流血 \geq 1000ml

答案： AD

319、产后出血的原因有

- A、 宫缩乏力
- B、 胎盘植入

- C、 凝血功能障碍
- D、 软产道损伤
- E、 胎盘粘连

答案： ABCDE

320、属于阴道正常菌群的是

- A、 大肠埃希菌
- B、 支原体
- C、 衣原体
- D、 乳杆菌
- E、 假丝酵母菌

答案： ABDE

321、28岁已婚女性,停经52天,下腹痛伴阴道流血5小时,阴道流血较月经量多。妇科检查:子宫稍大,宫颈口扩张可容1指,并见活动性出血。本例最有效的止血措施是

- A、 肌内注射止血药物
- B、 尽早行刮宫术
- C、 肌内注射或静滴缩宫素
- D、 纱布填塞阴道压迫止血
- E、 积极保胎治疗

答案： B

322、胎头衔接是指

- A、 枕骨进入骨盆入口平面
- B、 顶骨进入骨盆入口平面
- C、 双顶径进入骨盆入口平面
- D、 双顶径到达坐骨棘水平
- E、 双顶径到达坐骨结节水平

答案： C

解析：

323、关于子宫痉挛性狭窄环,正确的是

- A、 不易发生胎儿窘迫
- B、 胎膜破裂后自然消失
- C、 该环随子宫收缩上升
- D、 与产妇的精神因素无关
- E、 是子宫局部肌肉不协调性过强收缩形成的环状狭窄

答案： E

324、胎盘由以下哪项组织组成

- A、 平滑绒毛膜+包蜕膜+羊膜
- B、 平滑绒毛膜+底蜕膜+真蜕膜
- C、 叶状绒毛膜+包蜕膜+真蜕膜
- D、 叶状绒毛膜+底蜕膜+羊膜
- E、 叶状绒毛膜+包蜕膜+底蜕膜

答案： D

325、子宫收缩乏力性出血最常用的止血方法是

- A、 按摩子宫,应用宫缩剂
- B、 结扎子宫动脉上行支
- C、 结扎髂内动脉
- D、 髂内动脉栓塞术
- E、 子宫次全切除术

答案： A

326、受精卵约在受精后第几日在宫腔内着床

- A、 3~4 日
- B、 4~5 日
- C、 5~6 日
- D、 6~7 日
- E、 7~8 日

答案： D

327、当测量坐骨结节间径<8cm,应进一步测量的径线是

- A、 坐骨切迹宽度
- B、 对角径
- C、 坐骨棘间径
- D、 出口前矢状径
- E、 出口后矢状径

答案： E

328、不协调性子宫收缩乏力,正确的处理是

- A、 第一产程中可使用哌替啶
- B、 静脉滴注缩宫素
- C、 人工破膜
- D、 立即剖宫产
- E、 助产前使用哌替啶

答案： A

329、若卵子排出后未受精,黄体开始萎缩的时间在排卵后

- A、 5~6 天
- B、 7~8 天
- C、 9~10 天
- D、 11~12 天
- E、 13~14 天

答案： C

解析：

330、正常分娩保护会阴的时间是

- A、 初产妇宫口全开时
- B、 初产妇先露着冠时
- C、 经产妇宫口开大 5~6cm 时
- D、 经产妇宫口全开时
- E、 初产妇头拨露使会阴后联合皮肤膨胀时

答案： E

解析：

331、下列哪项不是胎盘剥离征象

- A、 子宫底升高达脐上
- B、 宫体变硬, 呈球形
- C、 阴道口外露的脐带自行下降
- D、 于耻骨上方压子宫下段, 脐带回缩
- E、 阴道少量流血

答案: D

332、我国孕龄妇女现在最常用的避孕措施为

- A、 避孕套
- B、 皮下埋置
- C、 宫内节育器
- D、 口服避孕药
- E、 安全期避孕

答案: C

333、子宫肌瘤与临床症状关系最密切的是:

- A、 肌瘤大小
- B、 肌瘤数目
- C、 肌瘤生长部位
- D、 肌瘤有无变性
- E、 肌瘤与肌壁的关系

答案: E

334、子宫内膜癌首选的治疗方法是哪种:

- A、 化疗
- B、 手术治疗
- C、 放射治疗
- D、 内分泌治疗
- E、 免疫治疗

答案: B

335、阴道内保持一定酸性,是由于那种细菌分解上皮细胞内糖原的结果:

- A、 大肠杆菌
- B、 酵母菌
- C、 链球菌
- D、 肠球菌
- E、 乳杆菌

答案: E

336、子宫内膜癌最常见的病理类型是:

- A、 内膜样腺癌
- B、 腺棘皮癌
- C、 腺鳞癌
- D、 透明细胞癌
- E、 浆液性腺癌

答案: A

解析:

337、诊断子宫内膜结核,最可靠的依据是:

- A、 不育
- B、 血沉快
- C、 月经稀少
- D、 低热、乏力、消瘦
- E、 子宫内膜病理检查

答案: E

338、以下哪种卵巢肿瘤属于性索间质肿瘤

- A、 浆液性囊腺癌
- B、 Krukenberg 瘤
- C、 无性细胞瘤
- D、 畸胎瘤
- E、 颗粒细胞瘤

答案: E

339、子宫颈细胞学检查 LSIL 提示：

- A、 宫颈正常
- B、 宫颈炎
- C、 低度鳞状上皮内病变
- D、 可疑癌前病变
- E、 可疑宫颈鳞癌

答案： C

340、子宫颈癌临床分期, 主要根据：

- A、 临床症状的严重程度
- B、 癌瘤病灶侵犯的范围
- C、 阴道镜所见病灶大小
- D、 细胞病理分化程度
- E、 血管或淋巴管有无瘤栓

答案： B

341、27 岁女性, 停经 45 天, 阴道少量出血伴下腹隐痛 3 天。刮宫术后病理报告为“蜕膜组织”。首先应考虑的疾病是

- A、 闭经
- B、 月经延迟
- C、 先兆流产
- D、 不全流产
- E、 异位妊娠

答案： E

解析：

342、50 岁妇女, 绝经 3 年, 腹胀, 腹部长大 2 个月, 妇检: 宫颈光滑, 子宫水平位, 稍小于正常, 右附件扪及 10cm×8cm×6cm 大小实质性包块, 活动, 腹穿抽出清亮腹腔积液; 胸片: 双侧胸腔少量积液, 下述哪种卵巢瘤可能性最大

- A、 纤维瘤
- B、 颗粒细胞瘤
- C、 内胚窦瘤

- D、 库肯勃瘤
- E、 浆液性囊腺瘤

答案： A

解析：

343、 31 岁女性， 结婚 3 年不孕。 月经规律， 一年来经量明显减少。 检查子宫未产型， 活动欠佳， 双附件索条状增厚， 轻压痛。 可能的诊断是

- A、 子宫内膜炎
- B、 慢性盆腔炎
- C、 慢性附件炎
- D、 生殖器结核
- E、 子宫内膜异位症

答案： D

344、 39 岁女性患者， 继发闭经 1 年， 伴有潮热， 出汗， 查血清 FSH>40 U/L。 闭经原因可能是

- A、 卵巢功能早衰
- B、 子宫内膜结核
- C、 下丘脑性闭经
- D、 垂体性闭经
- E、 精神心理因素

答案： A

345、 28 岁女性患者， 两年前产钳助产分娩 4300g 女婴， 至今常感腰痛、 阴道下坠。 检查： 会阴侧切伤口愈合好， 于平处女膜缘处可见宫颈光滑， 子宫水平位、 经产大小， 双附件正常。 关于诊断， 以下哪项正确

- A、 正常盆腔
- B、 子宫脱垂 I 度轻
- C、 子宫脱垂 I 度重
- D、 子宫脱垂 II 度轻
- E、 子宫脱垂 II 度重

答案： C

346、26岁妊娠33周，因一周来皮肤瘙痒，轻微黄疸，一天来自感瘙痒加重，门诊查ALT58IU/L，收住院。对诊断最有帮助的检查是

- A、血小板+纤维蛋白原
- B、B超胆囊情况
- C、眼底检查
- D、胆汁酸
- E、血小板+胆红素

答案： D

347、45岁妇女，阴道不规则出血2月余，妇科检查：宫颈可见乳头样增生，触血，宫旁结节状增厚，未达盆壁，阴道穹隆部硬，可见小溃疡，宫颈活检为鳞状上皮癌，其治疗原则为

- A、全子宫及双附件切除术
- B、子宫根治术+盆腔淋巴结清扫术
- C、放疗+手术治疗
- D、放射治疗
- E、化疗

答案： D

348、32岁已婚妇女，月经量多2年，自然流产3次，B超检查提示子宫前壁内探及8cm直径低回声团，双附件正常。最适宜的治疗是

- A、子宫全切除
- B、子宫次全切除
- C、肌瘤剔除术
- D、诊断性刮宫术
- E、药物保守治疗

答案： C

349、25岁原发不孕，月经周期不规则，妇科检查正常，基础体温呈单相，诊断为

- A、黄体功能不足
- B、无排卵型功血
- C、子宫内膜不规则脱落

- D、 有排卵型功血
- E、 排卵型功血, 月经过多

答案: B

350、人流后 1 年未见月经来潮, 子宫、附件均正常, 孕激素试验(一), 基础体温双相, 人工周期治疗 3 个月仍不见月经, 其闭经原因可能是

- A、 子宫内膜损伤
- B、 卵巢病变
- C、 垂体病变
- D、 下丘脑病变
- E、 高催乳素血症

答案: A

351、患者, 25 岁, 人流术后半年, 阴道不规则流血, 近 1 个月开始厌食、恶心、肝区痛, 肝脏超声, 见多个异常回声, 血 hCG 明显增高, 诊断为绒癌肝转移, 其分期为

- A、 I 期
- B、 II 期
- C、 III 期
- D、 IV 期
- E、 分期依据不足

答案: D

352、27 岁经产妇, 人工流产术后 5 月余, 术后不规则阴道流血, 量少. 术后避孕套避孕. 尿妊娠试验阳性, 查子宫增大如孕 50 天左右, 质软. 胸片见两肺中下部有多处散在的棉絮团影. 本例最可能的疾病是

- A、 吸宫不全
- B、 葡萄胎
- C、 侵蚀性葡萄胎
- D、 绒毛膜癌
- E、 胎盘部位滋养细胞肿瘤

答案: D

353、26岁初孕妇,妊40周,胎位LOA,产前检查无异常。因阴道流水8小时,无宫缩入院。以下哪项处理错误

- A、 阴道检查了解宫颈条件
- B、 查白细胞及分类
- C、 催产素静脉点滴引产
- D、 立即行剖宫产
- E、 给予抗生素预防感染

答案: D

354、32岁第1胎,停经37周,1个月前血压正常,近2周出现下肢水肿,1周来头昏、眼花、视物模糊,血压160/100mmHg,尿蛋白(+),尿雌三醇10mg/24h,胎心好,下列处理哪项正确

- A、 立即行剖宫产
- B、 积极治疗1周,终止妊娠
- C、 积极治疗24~48小时,终止妊娠
- D、 积极治疗,等待自然分娩
- E、 立即行人工破膜及静滴缩宫素引产

答案: C

355、对于有接触性出血的患者,首先要做的检查措施是

- A、 TCT
- B、 B超检查
- C、 阴道检查
- D、 血常规
- E、 核磁共振

答案: A

356、25岁已婚女性,停经11周,阴道少量流血3天,增多3天,伴下腹胀痛,昨日起有畏寒发热,查血压80/60mmHg,脉搏120次/分,面色苍白,神清,阴道有活动性流血,子宫如妊娠50天大,软,宫口松,可容1指,宫口外仍有组织堵塞,子宫压痛明显,双侧穹窿未触及肿块,但有压痛。血红蛋白80g/L,白细胞 $18 \times 10^9/L$,中性85%,除立即抗休克抗炎治疗外,应作何恰当处理

- A、 立即钳夹出残留之胚胎组织
- B、 3天后再行剖宫术

- C、 立即行剖宫术
- D、 立即静滴宫缩素
- E、 静点止血药

答案： A

357、 孕妇 35 岁, G₁P₀ 孕 42⁺¹, 未临产, NST 监测 2 次无反应, OCT10 分钟内宫缩 2 次, 持续 40~50 秒, 均出现晚期减速, E/C 比值由 15 减至 10 以下, 目前最恰当的处理

- A、 缩宫素引产
- B、 人工破膜引产
- C、 吸氧观察 24 小时后复查
- D、 立即剖宫产
- E、 生物物理评分

答案： D

358、 26 岁, 痛经 3 年逐渐加重, 月经量增多, 本次行经 10 天, 血仍未止, 2 年前因不孕做过输卵管通液治疗, 子宫较正常略大, 后位, 不活动, 右侧触及 4cm×4cm×3cm 大的韧性包块与子宫粘连; 左侧附件增厚, 双宫骶韧带均及豆粒大痛性结节, 本病首先考虑为

- A、 陈旧性宫外孕
- B、 生殖器结核
- C、 慢性盆腔炎
- D、 子宫内膜异位症
- E、 输卵管卵巢囊肿

答案： D

359、 女, 28 岁, 婚后 4 年不孕, 月经规律, BBT 单相, 不孕的可能因素是

- A、 排卵障碍
- B、 输卵管因素
- C、 子宫因素
- D、 宫颈因素
- E、 男方因素

答案： A

360、女, 30 岁, 人工流产后一年不孕, 输卵管通畅试验显示不通。影响受孕的可能因素是

- A、 排卵障碍
- B、 输卵管因素
- C、 子宫因素
- D、 宫颈因素
- E、 阴道因素

答案: B

361、宫颈癌的好发部位是

- A、 宫颈外口柱状上皮与鳞状上皮交接处
- B、 宫颈内口宫体内膜与宫颈粘膜交接处
- C、 宫颈外口与阴道的鳞状上皮交界处
- D、 宫颈管内的柱状上皮
- E、 宫颈外口的鳞状上皮

答案: A

解析:

362、女性生殖器官最常见的恶性肿瘤是

- A、 子宫颈癌
- B、 子宫内膜癌
- C、 输卵管癌
- D、 绒毛膜癌
- E、 卵巢癌

答案: A

363、外阴癌晚期主要转移方式

- A、 直接浸润
- B、 淋巴转移
- C、 血行转移
- D、 种植
- E、 直接浸润+淋巴转移

答案: E

364、某妇女, 30 岁。孕 1 产 0, 宫内妊娠 20 周, 合并子宫壁间肌瘤, 主诉: 下腹痛 7 天, 合并低热, 无阴道流血。WBC: $9 \times 10^9/L$ 。最可能的诊断是

- A、 子宫肌瘤合并感染
- B、 子宫肌瘤红色变性
- C、 子宫肌瘤囊性变
- D、 子宫肌瘤蒂扭转
- E、 妊娠合并阑尾炎

答案: B

365、29 岁妇女, 孕 5 产 0, 白带中有血丝, 曾患外阴尖锐湿疣, 现已治愈。妇查: 子宫正常大小, 宫颈中度糜烂, 子宫活动好, 附件(-), 双穹(-), 宫颈刮片检查 1 次阳性。阴道镜下宫颈活检, CINIII, 该患者要求保留生育功能, 应采取何种治疗方法

- A、 子宫全切术
- B、 扩大子宫切除术
- C、 宫颈锥切术, 术后密切定期随访
- D、 子宫根治术
- E、 子宫根治术+盆腔淋巴结清扫术

答案: C

366、40 岁妇女, 孕 5 产 1, 阴道不规则出血达 8 个月, 妇查: 宫颈肥大, 可见凹陷样溃疡, 边缘硬。左侧宫颈旁组织厚而硬, 双穹(-), 宫颈活检为鳞状上皮癌。其分期

- A、 宫颈癌 II A 期
- B、 宫颈癌 II B 期
- C、 宫颈癌 III A 期
- D、 宫颈癌 III B 期
- E、 宫颈癌 IV A 期

答案: B

367、43 岁妇女病理切片: 子宫肌壁间可见内膜间质。她有慢性下腹疼痛及痛经, 激素治疗无效, 最可能的诊断是

- A、 子宫内膜异位症
- B、 子宫腺肌症

- C、 子宫内膜癌
- D、 子宫肥大症
- E、 子宫肌瘤

答案： B

368、 37 岁，因左附件肿物 10cm×10cm×9cm 拟入院手术，入院后 2h 突感下腹剧痛，再次妇科检查：左侧肿物隐约可及，大小边界不清，后穹窿穿刺抽出 10ml 深咖啡粘稠液体，最可能的诊断是

- A、 卵巢肿物蒂扭转
- B、 卵巢肿物破裂
- C、 卵巢巧克力囊肿破裂
- D、 残角子宫妊娠破裂
- E、 子宫浆膜下肌瘤蒂扭转

答案： C

369、 33 岁妇女。婚后 7 年未孕，痛经逐年加重，妇查：宫底韧带处可触及黄豆大结节 2 个，触痛明显，右侧附件可及一 5cm×6cm 大小包块活动差，囊实性，最有效的确诊方法

- A、 B 超
- B、 诊断性刮宫
- C、 宫腔镜检查
- D、 腹腔镜+组织病检
- E、 CA₁₂₅

答案： D

370、 患者，26 岁女性，分娩后出现产后出血，现产后 2 年，无月经，伴毛发脱落，最可能为

- A、 Swyer 综合征
- B、 Asherman 综合征
- C、 Sheehan 综合征
- D、 Turner 综合征
- E、 Stein-Leventhal 综合征

答案： C

371、15岁,月经周期7-10/15~20天,量多,此次月经持续10余天未净,量多,基础体温单相,采用下列哪种止血较合适

- A、诊断性刮宫
- B、孕激素20mg/D×5肌注
- C、克罗米酚
- D、大量雌激素止血后逐渐减量,2周后加用孕激素
- E、止血芳酸

答案: D

372、患者30岁,原发不孕,肥胖,毛发重,对诊断最有帮助的检查是

- A、基础体温
- B、阴道超声见双卵巢增大,有多个卵泡
- C、内膜活检
- D、血清CA125
- E、以上均是

答案: B

373、女性患者20岁,学生,闭经版不规则出血,痤疮重,最恰当的治疗是

- A、人工周期
- B、积极促排卵治疗
- C、口服达英-35
- D、腹腔镜手术
- E、以上均不是

答案: C

374、某妇,孕3产1,人流术后3个月未行经,应考虑有可能存在下列哪种异常

- A、宫腔粘连
- B、宫颈撕裂
- C、卵巢早衰
- D、内膜致密层破坏
- E、内膜海绵层破坏

答案: A

375、患者,28岁。目前月经干净3天,暂无生育要求,来院咨询采取何种方法避孕。月经规则,5/30,已经生育一女,3岁

根据该患者的情况,以下避孕方法哪种不合适

- A、 宫内节育器
- B、 输卵管绝育术
- C、 短效口服避孕药
- D、 长效口服避孕药
- E、 皮下埋植剂

答案: B

376、患者,28岁。目前月经干净3天,暂无生育要求,来院咨询采取何种方法避孕。月经规则,5/30,已经生育一女,3岁。如患者选择宫内节育器,术前应作如下哪些准备,除了

- A、 白带检查
- B、 妇科检查
- C、 向患者交代宫内节育器可能出现的副作用
- D、 排除禁忌症
- E、 宫腔镜检查

答案: E

377、患者,28岁。目前月经干净3天,暂无生育要求,来院咨询采取何种方法避孕。月经规则,5/30,已经生育一女,3岁。下列哪项不是放置宫内节育器的近期并发症

- A、 阴道流血
- B、 下腹隐痛
- C、 节育器异变
- D、 异位妊娠
- E、 感染

答案: D

378、孕妇,28岁,孕34周,10天前开始纳差、乏力,近5天加重,伴恶心、呕吐,巩膜发黄,神志欠清而入院。入院时血压130/90mmHg,化验ALT 35 IU/L,胆红素176 μ mol/L。胆蛋白(-)。首选的检查是

- A、尿常规
- B、碱性磷酸酶测定
- C、胆酸测定
- D、肝炎病毒标志物
- E、血糖测定

答案： D

379、孕妇, 28岁, 孕34周, 10天前开始纳差、乏力, 近5天加重, 伴恶心、呕吐, 巩膜发黄, 神志欠清而入院。入院时血压130/90mmHg, 化验ALT 35 IU/L, 胆红素 $176 \mu\text{mol/L}$ 。胆蛋白(-)。最佳的诊断是下列哪项

- A、妊娠急性脂肪肝
- B、妊娠肝内胆汁淤积症
- C、妊娠高血压肝损
- D、药物性肝损
- E、HELLP综合征

答案： A

380、孕妇, 28岁, 孕34周, 10天前开始纳差、乏力, 近5天加重, 伴恶心、呕吐, 巩膜发黄, 神志欠清而入院。入院时血压130/90mmHg, 化验ALT 35 IU/L, 胆红素 $176 \mu\text{mol/L}$ 。胆蛋白(-)。适当的治疗是

- A、尽快终止妊娠
- B、防止肝昏迷
- C、积极保肝
- D、使用广谱抗生素
- E、消除黄疸

答案： A

381、26岁女性, G1P0, 停经36周, 水肿一周, 头痛、视物不清2天, 加重伴恶心、呕吐半天, 抽搐1次急诊入院, 查体: 血压195/120mmHg, 水肿3+, 胎心120次/分, 不规律宫缩, 肛查: 宫口未开, 先露棘平, 骨产道正常。本例应诊断为

- A、36周妊娠, 子痫前期
- B、36周妊娠, 产前子痫
- C、36周妊娠, 合并脑出血
- D、36周妊娠, 合并高血压危象

E、 36 周妊娠, 合并癫痫发作

答案: B

382、 25 岁, G1P0, 停经 36 周, 水肿一周, 头痛、 视物不清 2 天, 加重伴恶心、 呕吐半天, 抽搐 1 次急诊入院, 查体: 血压 195/120mmHg, 水肿 3+, 胎心 120 次/分, 不规律宫缩, 肛查: 宫口未开, 先露棘平, 骨产道正常. 首选紧急处理是

- A、 肌内注射地西洋
- B、 肌内注射山莨菪碱
- C、 静脉注射甘露醇
- D、 静脉推注肼屈嗪
- E、 静脉滴注硫酸镁, 并给予镇静剂

答案: E

383、 25 岁, G1P0, 停经 36 周, 水肿一周, 头痛、 视物不清 2 天, 加重伴恶心、 呕吐半天, 抽搐 1 次急诊入院, 查体: 血压 195/120mmHg, 水肿 3+, 胎心 120 次/分, 不规律宫缩, 肛查: 宫口未开, 先露棘平, 骨产道正常. 入院处理 6 小时未再抽搐, 血压 185/105mmHg, 最适当的处理是

- A、 即刻剖宫产终止妊娠
- B、 进入第二产程后予以助产
- C、 积极解痉、 镇静防止再抽搐
- D、 人工破膜, 静脉滴注缩宫素引产
- E、 继续治疗 24~48 小时, 血压控制不满意即终止妊娠

答案: A

384、 女性, 45 岁。 既往月经正常, 近一年来经期延长 10-15 天, 量多, 此次停经 50 天后阴道出血 20 天, 血红蛋白 80g/L, 盆腔检查(-), 基础体温单相. 为排除宫体癌应该进行下列何项辅助检查

- A、 CA125 测定
- B、 腹腔镜检查并作活检
- C、 分段诊刮并送病理
- D、 超声检查
- E、 子宫输卵管造影

答案: C

385、女性, 45 岁。既往月经正常, 近一年来经期延长 10-15 天, 量多, 此次停经 50 天后阴道出血 20 天, 血红蛋白 80g/L, 盆腔检查(-), 基础体温单相. 如通过检查排除宫体癌后, 应考虑为

- A、 子宫黏膜下肌瘤
- B、 子宫内膜炎
- C、 子宫内膜息肉
- D、 无排卵型功血
- E、 排卵型功血

答案: D

386、女性, 45 岁。既往月经正常, 近一年来经期延长 10-15 天, 量多, 此次停经 50 天后阴道出血 20 天, 血红蛋白 80g/L, 盆腔检查(-), 基础体温单相. 对该病人最佳治疗方案是

- A、 雌激素周期疗法, 以调整周期
- B、 雌-孕激素联合周期治疗
- C、 促排卵药以调整周期
- D、 雌-孕激素序贯疗法
- E、 月经周期后半期应用孕激素

答案: E

387、患者, 37 岁。闭经, 伴有潮热, 易出汗, 查体: 子宫、附件无异常所见, 曾做雌激素试验(+). 该患者的诊断首先考虑为

- A、 子宫性闭经
- B、 下丘脑性闭经
- C、 垂体性闭经
- D、 多囊卵巢综合征
- E、 卵巢功能早衰

答案: E

388、患者, 37 岁。闭经, 伴有潮热, 易出汗, 查体: 子宫、附件无异常所见, 曾做雌激素试验(+). 上述患者血化验的结果应为

- A、 HCG ↑
- B、 LH, RH ↑

C、 LH, FSH ↑

D、 LH, FSH ↓

E、 E ↑

答案： C

389、患者, 37 岁。闭经, 伴有潮热, 易出汗, 查体: 子宫、附件无异常所见, 曾做雌激素试验(+). 上述患者下一步治疗应为

A、 雌一孕激素序贯

B、 促排卵

C、 大剂量雌激素

D、 大剂量孕激素

E、 雄激素

答案： A

390、30 岁孕妇, 妊娠 33 周, 2 周内阴道少量流血 3 次, 今凌晨突然阴道流血多于月经量, 无腹痛, 血压 13. 3/10. 7kPa, 脉率 96 次/分, 宫高 30cm, 腹围 85cm, 臀先露, 未入盆, 胎心音清楚, 144 次/分. 应最先考虑的疾病是

A、 早产

B、 前置胎盘

C、 胎盘早期剥离

D、 宫颈息肉

E、 妊娠合并宫颈癌

答案： B

391、29 岁孕妇, 妊娠 32 周, 3 周内阴道少量流血 2 次, 今凌晨突然阴道流血多于月经量, 无腹痛, 血压 13. 3/10. 7kPa, 脉率 96 次/分, 宫高 30cm, 腹围 85cm, 臀先露, 未入盆, 胎心音清楚, 144 次/分. 以下辅助检查中应首选哪一项对确定诊断意义最大

A、 血常规

B、 血小板测定

C、 B 超

D、 X 线摄片

E、 阴道检查

答案： C

392、29岁孕妇,妊娠32周,3周内阴道少量流血2次,今凌晨突然阴道流血多于月经量,无腹痛,血压13.3/10.7kPa,脉率96次/分,宫高30cm,腹围85cm,臀先露,未入盆,胎心音清楚,144次/分.下述何项处理是错误的

- A、 住院观察
- B、 绝对卧床休息
- C、 配血备用
- D、 口服镇静药片
- E、 肛指检查

答案: E

393、32岁妇女,孕3产2,阴道排液及接触性出血3月。一般状态良好,妇查:宫颈轻糜,宫体前位,大小正常,活动好,双附件(一),宫颈活检为,宫颈鳞癌细胞呈泪滴状向间质浸润,深度<3mm,无病灶融合及脉管侵犯。其诊断应为

- A、 0期
- B、 IA
- C、 IB
- D、 IIA
- E、 IIIA

答案: B

394、32岁妇女,孕3产2,阴道排液及接触性出血3月。一般状态良好,妇查:宫颈轻糜,宫体前位,大小正常,活动好,双附件(一),宫颈活检为,宫颈鳞癌细胞呈泪滴状向间质浸润,深度<3mm,无病灶融合及脉管侵犯。应采用何种治疗方法

- A、 宫颈锥形切除术
- B、 经腹子宫切除术
- C、 放射治疗
- D、 广泛性子宫切除术+盆腔淋巴结清扫术
- E、 子宫切除术

答案: E

395、女性.32岁,外阴瘙痒伴分泌物增多4~5天,妇科检查:阴道黏膜散在红色斑点,阴道内多量脓性泡沫状分泌物,有臭味.对此病人进行检查时,不正确操作是

- A、取分泌物前不能做双合诊
- B、取分泌物前先行碱性液体冲洗
- C、取分泌物行悬滴法检查
- D、可疑病人多次悬滴法阴性时做培养
- E、检查标本应注意保暖

答案： B

396、女性. 32 岁, 外阴瘙痒伴分泌物增多 4~5 天, 妇科检查: 阴道黏膜散在红色斑点, 阴道内多量脓性泡沫状分泌物, 有臭味. 此病人确切诊断为

- A、细菌性阴道病
- B、外阴阴道假丝酵母菌病
- C、滴虫阴道炎
- D、淋球菌阴道炎
- E、外阴瘙痒症

答案： C

397、女性. 32 岁, 外阴瘙痒伴分泌物增多 4~5 天, 妇科检查: 阴道黏膜散在红色斑点, 阴道内多量脓性泡沫状分泌物, 有臭味. 此病人治疗应首选

- A、局部用药即可达治愈
- B、全身及局部同时用药效果最佳
- C、使用碱性液冲洗阴道可提高疗效
- D、症状消失复查分泌物转阴即停药
- E、男方不易感染, 无需用药治疗

答案： B

398、女, 28 岁, 因停经 52 天, 阴道出血 1 周, 诊断先兆流产, 入院安胎。次日腹痛伴阴道流血增多, 蹲厕时见到有组织物排出, 阴道出血仍不止, 腹痛减轻. 最可能的诊断是

- A、难免流产
- B、不完全流产
- C、完全流产
- D、稽留流产
- E、习惯性流产

答案： B

399、女, 28 岁, 因停经 52 天, 阴道出血 1 周, 诊断先兆流产, 入院安胎。次日腹痛伴阴道流血增多, 蹲厕时见到有组织物排出, 阴道出血仍不止, 腹痛减轻。最有助于诊断的检查是

- A、 B 型超声检查附件有无肿块
- B、 阴道检查子宫大小和宫口开张情况
- C、 血 β -hCG 定量测定
- D、 后穹窿穿刺有不凝血液
- E、 阴道检查宫颈举痛

答案： B

400、女, 28 岁, 因停经 52 天, 阴道出血 1 周, 诊断先兆流产, 入院安胎。次日腹痛伴阴道流血增多, 蹲厕时见到有组织物排出, 阴道出血仍不止, 腹痛减轻。此时最恰当的处理是

- A、 清宫
- B、 B 超检查宫腔有无残留胚胎, 然后决定处理方案
- C、 缩宫素静脉滴注
- D、 抗炎+观察
- E、 宫腔镜检查

答案： A

401、女性, 36 岁, 阴道黏液脓性分泌物增多, 性交后出血, 尿急、尿频、尿痛 3 天。妇科检查: 尿道口、阴道口黏膜充血, 多量脓性分泌物。宫颈充血、水肿、黏膜外翻, 宫颈管内可见大量脓性分泌物, 宫颈触血阳性。该患可能的诊断为

- A、 急性淋病
- B、 急性宫颈炎
- C、 急性盆腔炎
- D、 急性尿路感染
- E、 慢性盆腔炎

答案： B

402、女性, 36 岁, 阴道黏液脓性分泌物增多, 性交后出血, 尿急、尿频、尿痛 3 天。妇科检查: 尿道口、阴道口黏膜充血, 多量脓性分泌物。宫颈充血、水肿、黏膜外翻, 宫颈管内可见大量脓性分泌物, 宫颈触血阳性。下一步治疗应选择

- A、 理疗
- B、 观察经过
- C、 抗炎治疗
- D、 子宫全切术
- E、 宫颈电锥切术

答案： C

403、 28 岁足月孕妇, 临产 3 小时自然破水, 羊水黄绿, 胎心(110~120)次/分, 宫缩 40 秒/(2~3)分, 立即行剖宫产术。术中取出胎儿后, 产妇突然呛咳, 烦躁不安, 呼吸困难, 口唇发绀, 血压 80/50mmHg, 呼吸 50 次/分, 两肺闻及湿啰音, 子宫软, 出血较多。最可能的诊断为

- A、 子痫
- B、 休克
- C、 羊水栓塞
- D、 心力衰竭
- E、 急性肺炎

答案： C

404、 28 岁足月孕妇, 临产 3 小时自然破水, 羊水黄绿, 胎心(110~120)次/分, 宫缩 40 秒/(2~3)分, 立即行剖宫产术。术中取出胎儿后, 产妇突然呛咳, 烦躁不安, 呼吸困难, 口唇发绀, 血压 80/50mmHg, 呼吸 50 次/分, 两肺闻及湿啰音, 子宫软, 出血较多。立即进行的以下处理, 哪项错误

- A、 正压给氧, 补充血容量
- B、 静推氨茶碱
- C、 阿托品静注
- D、 静脉推注地塞米松
- E、 静点宫缩素

答案： E

405、 28 岁足月孕妇, 临产 3 小时自然破水, 羊水黄绿, 胎心(110~120)次/分, 宫缩 40 秒/(2~3)分, 立即行剖宫产术。术中取出胎儿后, 产妇突然呛咳, 烦躁不安, 呼吸困难, 口唇发绀, 血压 80/50mmHg, 呼吸 50 次/分, 两肺闻及湿啰音, 子宫软, 出血较多。为预防本病, 最应注意以下哪项

- A、 静脉输液速度不可过快

- B、 避免宫缩过强过频
- C、 避免在宫缩时人工破膜
- D、 剖宫产时吸净子宫切口处羊水再取胎儿
- E、 产程过长时应给予抗生素预防感染

答案： D

406、 28 岁足月孕妇, 临产 3 小时自然破水, 羊水黄绿, 胎心(110~120)次/分, 宫缩 40 秒/(2~3)分, 立即行剖宫产术。术中取出胎儿后, 产妇突然呛咳, 烦躁不安, 呼吸困难, 口唇发绀, 血压 80/50mmHg, 呼吸 50 次/分, 两肺闻及湿啰音, 子宫软, 出血较多。本病的死亡率约为

- A、 80%~90%
- B、 70%~80%
- C、 60%~70%
- D、 50%~60%
- E、 40%~50%

答案： B

407、 32 岁初产妇, 孕 41 周, 规则宫缩 12 小时, 破膜 2 小时, 宫口开全 1 小时, 宫缩 40~45 秒, 间隔 1~2 分钟。羊水黄绿色, 胎心 110 次/分, CST 示晚期减速, 胎儿头皮血 pH7. 19。此时最可能的诊断是

- A、 过期妊娠
- B、 胎膜早破
- C、 胎儿窘迫
- D、 宫缩过强
- E、 第二产程延长

答案： C

408、 30 岁初产妇, 孕 41 周, 规则宫缩 12 小时, 破膜 2 小时, 宫口开全 1 小时, 宫缩 40~45 秒, 间隔 1~2 分钟。羊水黄绿色, 胎心 110 次/分, CST 示晚期减速, 胎儿头皮血 pH7. 19。此时最需要的检查是

- A、 肛查
- B、 阴道检查
- C、 B 超检查
- D、 羊膜镜检查

E、血常规

答案： B

409、30岁初产妇,孕40周,规则宫缩12小时,破膜2小时,宫口开全1小时,宫缩40~45秒,间隔1~2分钟。羊水黄绿色,胎心110次/分,CST示晚期减速,胎儿头皮血pH7.19。阴道检查先露+3,ROA,此时最不恰当的处理是

- A、吸氧
- B、纠正酸中毒
- C、持续胎心监测
- D、产钳助产
- E、立即剖宫产

答案： E

410、23岁女性,停经3月余,阴道少量血性分泌物2日就诊,停经40日尿妊娠试验阳性,妇检:子宫如妊娠8周大小,B超宫内见到妊娠囊,未见原始心管搏动根据患者的临床表现,可能的诊断是

- A、先兆流产
- B、稽留流产
- C、难免流产
- D、习惯性流产
- E、不全流产

答案： B

411、23岁女性,停经3月余,阴道少量血性分泌物2日就诊,停经40日尿妊娠试验阳性,妇检:子宫如妊娠8周大小,B超宫内见到妊娠囊,未见原始心管搏动,还必须做的检查是

- A、血清HCG
- B、血清尿素氮
- C、血清肌酐
- D、血清胆红素
- E、血浆纤维蛋白原

答案： E

412、23 岁女性, 停经 3 月余, 阴道少量血性分泌物 2 日就诊, 停经 40 日尿妊娠试验阳性, 妇检: 子宫如妊娠 8 周大小, B 超宫内见到妊娠囊, 未见原始心管搏动, 治疗的方针

- A、 清宫手术
- B、 继续观察, 一周后复查 B 超
- C、 肌内注射黄体酮
- D、 注射缩宫素
- E、 给予止血药物

答案: A

413、28 岁经产妇, 妊娠 40 周, 因胎膜早破入院。因宫缩乏力曾静脉点滴缩宫素, 随后宫缩增强, 2h 后发现胎心不规则, 产妇自述下腹剧痛伴少量阴道出血。腹部检查: 腹壁紧张, 超声多普勒未听及胎心, 宫口开大 4cm, 先露胎头、高浮, 阴道内手指向上推动时流出多量血性液体, 本例最可能的诊断是

- A、 胎盘边缘血窦破裂
- B、 宫颈裂伤
- C、 胎盘早剥
- D、 前置胎盘
- E、 子宫破裂

答案: E

414、28 岁经产妇, 妊娠 40 周, 因胎膜早破入院。因宫缩乏力曾静脉点滴缩宫素, 随后宫缩增强, 2h 后发现胎心不规则, 产妇自述下腹剧痛伴少量阴道出血。腹部检查: 腹壁紧张, 超声多普勒未听及胎心, 宫口开大 4cm, 先露胎头、高浮, 阴道内手指向上推动时流出多量血性液体, 本例应该采取的处理措施

- A、 立即剖宫产手术
- B、 根据胎儿情况决定手术方式
- C、 抢救休克同时手术
- D、 行子宫切除术
- E、 立即转上级医院

答案: C

415、28 岁经产妇, 妊娠 40 周, 因胎膜早破入院。因宫缩乏力曾静脉点滴缩宫素, 随后宫缩增强, 2h 后发现胎心不规则, 产妇自述下腹剧痛伴少量阴道出血。腹部

检查:腹壁紧张,超声多普勒未听及胎心,宫口开大 4cm,先露胎头、高浮,阴道内手指向上推动时流出多量血性液体,子宫破裂的预防措施中错误的是

- A、 减少多产
- B、 正确处理产程
- C、 严格掌握缩宫素应用指征
- D、 尽量以剖宫产终止妊娠
- E、 掌握产科助产指征及操作常规

答案: D

416、经产妇,40岁。近2年痛经并逐渐加重,伴经量增多及经期延长,解释需服强止痛药。查子宫均匀增大如孕8周,质硬,有压痛,经期压痛明显,痛经逐渐加重的原因,最可能的是

- A、 功能型痛经
- B、 子宫腺肌病
- C、 子宫内膜结核
- D、 子宫内膜癌
- E、 子宫粘膜下肌层

答案: B

417、经产妇,40岁。近2年痛经并逐渐加重,伴经量增多及经期延长,解释需服强止痛药。查子宫均匀增大如孕8周,质硬,有压痛,经期压痛明显,本例确诊后的处置应选择

- A、 镇痛药物治疗
- B、 雌激素治疗
- C、 化学药物治疗
- D、 手术治疗
- E、 放射治疗

答案: D

418、26岁已婚妇女,停经37天,少量咖啡色阴道流血7天。尿妊娠试验阳性,1小时前突发下腹痛伴肛门坠胀感。妇科检查:阴道少量血性分泌物,宫颈举痛(+),后穹窿饱满,子宫增大不明显,附件区触诊不满意。本例最可能的诊断为

- A、 急性盆腔炎
- B、 异位妊娠

- C、先兆流产
- D、卵巢囊肿蒂扭转
- E、难免流产

答案： B

419、26岁已婚妇女,停经37天,少量咖啡色阴道流血7天。尿妊娠试验阳性,1小时前突发下腹痛伴肛门坠胀感。妇科检查:阴道少量血性分泌物,宫颈举痛(+),后穹隆饱满,子宫增大不明显,附件区触诊不满意。患者肛门坠胀是因为

- A、子宫直肠窝有积液
- B、宫颈炎
- C、子宫内膜异位
- D、盆腔充血
- E、患者有便秘

答案： A

420、26岁已婚妇女,停经37天,少量咖啡色阴道流血7天。尿妊娠试验阳性,1小时前突发下腹痛伴肛门坠胀感。妇科检查:阴道少量血性分泌物,宫颈举痛(+),后穹隆饱满,子宫增大不明显,附件区触诊不满意。本病例宫颈举痛是因为

- A、盆腔炎症
- B、盆腔充血
- C、盆腔积液
- D、子宫内膜炎症
- E、附件部位牵拉

答案： E

421、女,15岁,发育正常,自诉月经未来潮,近4~5个月有周期性腹痛,并渐加剧,此次发生于1周前,至今不能缓解,同时有排尿困难,腹部触诊可及包块。最可能的诊断为

- A、卵巢肿瘤
- B、卵巢子宫内膜异位囊肿
- C、输卵管结石
- D、处女膜闭锁
- E、膀胱输尿管炎

答案： D

422、女, 15 岁, 发育正常, 自诉月经未来潮, 近 4~5 个月有周期性腹痛, 并渐加剧, 此次发生于 1 周前, 至今不能缓解, 同时有排尿困难, 腹部触诊可及包块. 首选的辅助检查为

- A、 X 线
- B、 血常规
- C、 B 超
- D、 尿常规
- E、 肿瘤标记物检查

答案: C

423、女, 15 岁, 发育正常, 自诉月经未来潮, 近 4~5 个月有周期性腹痛, 并渐加剧, 此次发生于 1 周前, 至今不能缓解, 同时有排尿困难, 腹部触诊可及包块. 首选治疗为

- A、 抗菌素应用
- B、 手术切开
- C、 化疗
- D、 腹腔镜
- E、 继续观察

答案: B

424、女, 36 岁, 半小时前不小心高处跌落, 骑跨于一停放的三轮车上, 外阴部胀痛难忍. 最不可能的诊断为

- A、 尿道裂伤
- B、 阴道裂伤
- C、 大阴唇血肿
- D、 会阴裂伤
- E、 前庭大腺脓肿

答案: C

425、女, 36 岁, 半小时前不小心高处跌落, 骑跨于一停放的三轮车上, 外阴部胀痛难忍. 经检查为大阴唇血肿, 该部位是下面哪条韧带的终点

- A、 圆韧带
- B、 耻骨膀胱宫颈韧带

- C、 骨盆漏斗韧带
- D、 主韧带
- E、 宫骶韧带

答案： A

426、女，36岁，半小时前不小心高处跌落，骑跨于一停放的三轮车上，外阴部胀痛难忍。该创伤部位的特点为

- A、 其皮下脂肪层富含丰富的血管、淋巴管和神经
- B、 有很多横纹皱襞，有很大的伸展性
- C、 位于大阴唇后部，被球海绵体肌覆盖
- D、 表面湿润，色褐，富含神经末梢
- E、 受性激素影响有周期性的变化

答案： A

427、一新生儿出生后1分钟，全身皮肤苍白，无呼吸，心率100次/分，规律，四肢稍屈，吸痰时无反应。该患儿Apgar评分为

- A、 1分
- B、 2分
- C、 3分
- D、 4分
- E、 5分

答案： C

428、一新生儿出生后1分钟，全身皮肤苍白，无呼吸，心率100次/分，规律，四肢稍屈，吸痰时无反应。病例最先采取的急救措施应是

- A、 胸外心脏按摩
- B、 气管插管
- C、 面罩给氧
- D、 静脉注射碱性药物
- E、 应用呼吸中枢兴奋药

答案： B

429、一新生儿出生后 1 分钟, 全身皮肤苍白, 无呼吸, 心率 100 次/分, 规律, 四肢稍屈, 吸痰时无反应。新生儿得到复苏后, 做动脉血气, pH 为 7. 35, PaO₂ 为 60mmHg, PaCO₂ 为 43. 8mmHg, 下述哪项措施不恰当

- A、 注意保暖
- B、 预防感染
- C、 持续给纯氧
- D、 延期哺乳
- E、 肌内注射维生素 K₁

答案: C

430、关于女性生殖器淋巴引流, 哪项错误

- A、 女性生殖器淋巴分外生殖器淋巴和盆腔淋巴
- B、 外生殖器的淋巴汇入腹股沟浅淋巴结
- C、 盆腔淋巴分髂淋巴、腰淋巴、和髂前淋巴结组
- D、 宫体两侧淋巴汇入腹股沟浅淋巴结
- E、 宫颈淋巴大部分汇入髂前淋巴结

答案: E

431、关于肛提肌的组成从前内向后外分别是

- A、 耻尾肌、髂尾肌和坐尾肌
- B、 耻尾肌、髂尾肌和球海绵体肌
- C、 坐尾肌、耻尾肌和球海绵体肌
- D、 坐尾肌、耻尾肌和坐骨海绵体肌
- E、 耻尾肌、髂尾肌和坐骨海绵体肌

答案: A

432、卵巢与子宫连接的韧带是:

- A、 圆韧带
- B、 骨盆漏斗韧带

- C、 主韧带
- D、 阔韧带
- E、 卵巢固有韧带

答案： E

433、关于前庭大腺的描述，哪项正确

- A、 又称那氏腺
- B、 一般检查时可触及
- C、 开口于阴道口两侧
- D、 与性生活无关
- E、 可形成囊肿或脓肿

答案： E

434、关于子宫峡部，哪项错误

- A、 是宫体与宫颈之间最狭窄的部分
- B、 其上端是组织学内口，下端是解剖学内口
- C、 子宫峡部下端一下的内膜由宫腔内膜转化为宫颈粘膜
- D、 非孕期长约 1cm，妊娠晚期可达 7~10cm，形成子宫下段
- E、 子宫峡部的内膜可随月经周期而呈周期性变化

答案： B

435、生殖器官与邻近器官的关系，哪项错误

- A、 经前穹窿穿刺易引起膀胱损伤
- B、 女性尿道长约 6cm，邻近阴道与肛门，易感染
- C、 输尿管于宫颈前内口水平外侧 2cm 向前如膀胱
- D、 肛门外括约肌为骨盆底浅层肌的一部分
- E、 阑尾的下端可达右附件，发炎时可波及右附件

答案： B

436、关于骨盆的分界，以下说法那种正确

- A、 真骨盆的入口与出口之间为骨盆腔
- B、 假骨盆的径线长短与真骨盆的大小无关
- C、 真假骨盆的分界线为耻骨联合上缘、髂骨线及骶岬下缘的连线
- D、 假骨盆的径线与真骨盆的大小无关
- E、 骨盆腔的后壁是骶骨、侧壁是坐骨、前壁是耻骨联合

答案： A

437、卵巢动脉来自

- A、 髂总动脉
- B、 髂内动脉
- C、 腹主动脉
- D、 子宫动脉
- E、 肾动脉

答案： C

438、关于子宫的描述，哪项错误

- A、 子宫为一空腔器官，非孕时容量约 50ml
- B、 子宫肌壁较厚，在非孕时厚约 0.8cm
- C、 子宫肌壁平滑肌束外层纵行，内层环形、中层交叉排列
- D、 子宫内膜表面的 2/3 称功能层，能发生周期性变化
- E、 子宫浆膜层为与肌层紧贴的腹膜

答案： A

439、若卵子排出后未受精，黄体开始萎缩的时间在排卵后

- A、 5~6 天
- B、 7~8 天
- C、 9~10 天
- D、 11~12 天

E、 13~14 天

答案： C

440、子宫内膜异位症引起不孕的原因，错误的是

- A、 子宫固定在后位
- B、 自身免疫反应干扰受精和着床
- C、 盆腔的广泛粘连，致使输卵管蠕动减弱
- D、 卵巢功能失调
- E、 多见于输卵管壁发生结节性病灶而输卵管腔阻塞

答案： A

441、关于子宫内膜异位症，下列哪项描述是错误的

- A、 常发生于育龄妇女
- B、 以手术治疗为主
- C、 腹腔镜检查为最佳辅助检查方法
- D、 最常发生的部位为卵巢
- E、 可合并子宫肌瘤

答案： B

442、丹那唑治疗子宫内膜异位症的药理作用，错误的是

- A、 抑制下丘脑性腺激素释放激素和（或）垂体促性腺激素
- B、 直接与子宫内膜雌、孕激素受体结合
- C、 直接抑制卵巢甾体类激素的产生
- D、 增加体内雌二醇和孕酮的清除率
- E、 促使异位内膜转变为增殖期子宫内膜

答案： E

443、女，45 岁，不规则阴道流血 2 个月，性交后出血。宫颈锥切标本显微镜下可见低分化鳞状细胞癌，间质浸润深度 2mm。宽度 6mm，正确的分期为

- A、 I A2 期
- B、 I B1 期

C、 I B2 期

D、 II A 期

E、 I A1 期

答案： E

444、宫颈癌的病因主要为

A、 初次性生活小于 16 岁、早年分娩、多产

B、 与高危男子（阴茎癌或性伴侣患宫颈癌）性接触

C、 高危型人类乳头状瘤病毒感染

D、 吸烟

E、 以上多种因素协同作用

答案： C

445、子宫颈癌的好发部位是

A、 子宫颈管内

B、 宫颈阴道部

C、 宫颈阴道上部

D、 鳞-柱状交接部

E、 柱状上皮处

答案： D

446、葡萄胎清宫后 HCG 转阴时间一般不超过

A、 1 周

B、 3 周

C、 6 周

D、 9 周

E、 14 周

答案： E

447、关于良性葡萄胎的处理, 下列哪项是错误的

- A、 一经诊断,应尽快排空子宫
- B、 子宫过大者应行第 2 次刮宫
- C、 应取近子宫壁的刮出物送病理检查
- D、 葡萄胎排出后,均应进行预防性化疗
- E、 40 岁以上的妇女水泡较小,滋养层细胞增生明显,可考虑切除子宫

答案: D

448、绒癌最可靠的诊断依据是

- A、 尿妊免试验阳性
- B、 胸部 X 线摄片,见肺部有转移结节
- C、 阴道可见蓝紫色结节
- D、 镜下见滋养细胞恶性增生,无绒毛结构
- E、 镜下可见出血和坏死

答案: D

449、绒癌最常见的死亡原因是

- A、 肺转移
- B、 脑转移
- C、 肾转移
- D、 肠道转移
- E、 肝转移

答案: B

450、简述何谓妊娠期高血压疾病,其病的基本病理生理变化及治疗原则?

答案:

妊娠期高血压疾病是妊娠期特有的疾病,主要表现为一过性高血压、蛋白尿症状。其基本的病理生理变化是:全身小血管痉挛,全身各系统各脏器灌流量减少,对母儿造成危害,甚至导致母儿死亡。治疗原则:休息、镇静、解痉、降压、合理扩容和必要利尿、适时终止妊娠。

451、简述枕先露的分娩机制

答案:

1. 衔接(engagement)

胎头双顶径进入骨盆入口平面, 颅骨的最低点接近或达到坐骨棘水平, 称为衔接。胎头呈半俯屈状态进入骨盆入口, 以枕额径衔接。由于枕额径大于骨盆入口前后径, 胎头矢状缝多在骨盆入口右斜径上。部分初产妇在预产期前 1 -2 周内衔接, 经产妇多在临产后才衔接。

2 下降(descent) 胎头沿骨盆轴前进的动作称为下降。下降贯穿于分娩全过程, 并与其他动作同时进行。当宫缩时胎头下降, 间歇时胎头又稍退缩, 因此胎头与骨盆之间的相互挤压也呈间歇性, 这样对母婴均有利。促使胎头下降的因素有:①宫缩时通过羊水传导, 压力经胎轴传至胎头;②宫缩时宫底直接压迫胎臀;③胎体伸直伸长;④腹肌收缩使腹压增加。初产妇因宫口扩张缓慢, 软组织阻力大, 胎头下降速度较经产妇慢。观察胎头下降程度是临床判断产程进展的重要标志。

3. 俯屈(lexion) 当胎头继续下降至骨盆底时, 处于半俯屈状态的胎头遇到肛提肌阻力, 进一步俯屈, 使胎头下颏更加接近胸部, 使胎头衔接时的枕额径变为枕下前囟径, 有利于胎头继续下降。

4. 内旋转(internal rotation) 当胎头下降至骨盆底遇到阻力时, 胎头为适应前后径长、横径短的特点, 枕部向母体中线方向旋转 45° 达耻骨联合后方, 使其矢状缝与中骨盆及骨盆出口前后径相一致的动作称内旋转。胎头于第一产程末完成内旋转。枕先露时胎头枕部最低, 遇到骨盆底肛提肌阻力, 肛提肌收缩将胎头枕部推向阻力小、部位宽的前方。

5. 仰伸(extension) 当胎头完成内旋转后, 俯屈的胎头即达到阴道口。宫缩、腹压迫使胎头下降, 而肛提肌收缩又将胎头向前推进, 两者的合力使胎头沿骨盆轴下段向下向前的方向转向上。当胎头枕骨下都达耻骨联合下缘时即以耻骨弓为支点, 胎头逐渐仰伸, 胎头的顶、额、鼻、口、颌相继娩出。当胎头仰伸时胎儿双肩径进入骨盆入口左斜径。

6 复位及外旋转 胎头娩出时, 胎儿双肩径沿骨盆入口左斜径下降。胎头娩出后, 为使胎头与胎肩恢复正常解制关系, 面头枕部向母体左外旋转 45° 。胎肩在盆腔内继续下降, 前肩向前向母体中线旋转 45° 时, 胎儿双肩径转成与骨盆出口前后径相一致的方向, 胎儿枕部需在外继续向母体左外侧旋转 45° , 以保持胎头与胎肩的垂直关系, 称外旋转(external rotation)。

7. 胎肩及胎儿娩出外旋转后, 胎儿前肩在耻骨弓下先娩出, 后肩从会阴体前缘娩出, 胎体及下肢随之娩出, 完成分娩全部过程。

452、接产步骤

答案:

接产步骤:接生者站在产妇正面,当宫缩来临产妇有便意感时指导产妇屏气用力。胎头着冠时,指导产妇何时用力 and 呼气。会阴水肿、过紧、炎症,耻骨弓过低,胎儿过大、娩出过快等,均易造成会阴撕裂。接产者应在接产前作初步评估,接生时个体化指导产妇用力,并用手控制胎头娩出速度,同时左手轻轻下压胎头枕部,协助胎头俯屈,使胎头双顶径缓慢娩出,此时若娩出过急则可能撕裂会阴。当胎头枕部在耻骨弓下露出时,让产妇在宫缩间歇时期稍向下屏气,左手协助胎头仰伸,使胎头缓慢娩出,清理口腔黏液。胎头娩出后,不宜急于娩出胎肩,而应等待宫缩使胎头自然完成外旋转复位,使胎肩旋转至骨盆出口前后径。再次宫缩时接生者右手托住会阴,左手将胎儿颈部向下牵拉胎头,使前肩从耻骨弓下顺势娩出,继之托胎颈向上,使后肩从会阴前缘缓慢娩出。双肩娩出后,保护会阴的右手放松,双手协助胎体娩出。胎儿娩出后用器皿置于产妇臀下计量产后失血量。

453、 会阴切开缝合术

答案:

会阴切开缝合术:阴部神经阻滞麻醉联合会阴切口局麻生效后常用以下两种术式:①会阴后-侧切开术:多为左侧,术者于宫缩时以左手示、中两指伸入阴道内撑起左侧阴道壁,右手用剪刀自会阴后联合中线向左向后 45° 剪开会阴,长4~5cm;②会阴正中切开术:术者于宫缩时沿会阴后联合正中垂直剪开2cm。此法优点为剪开组织少、出血量少、术后组织肿胀疼痛轻微。但切口有自然延长撕裂肛门括约肌的危险,胎儿大或接产技术不熟练者不宜采用。胎儿娩出前纱布压迫切口止血。胎儿胎盘娩出后缝合切口,注意彻底止血,恢复解剖结构。

454、产钳助产术

答案:

取膀胱截石位。外阴消毒、导尿排空膀胱。阴道检查。切开会阴。放置左叶产钳:右手四指伸入胎头与阴道后壁之间,触摸耳廓。以左手握左叶产钳垂直向下沿右手掌和胎头之间徐徐向胎头左侧滑行,将钳叶置于胎头左侧,助手固定之。放置右叶产钳:以同样方法,左手伸入胎头和阴道后壁之间指引右钳放至胎头右侧,与左钳对应。合拢钳扣:两叶产钳位置正确时,左右产钳锁扣容易,若不能对合,可稍移动钳柄调整甚至重新放置。检查产钳:将手伸入阴道与胎头之间有无宫颈组织嵌入。胎头矢状缝应位于两产钳之中间(若胎方位不正,应先徒手旋转胎头,再放置产钳)。牵拉:宫缩时向外、向下牵拉,当枕部位于耻骨联合下时,向上缓慢牵引。胎头枕部娩出后,松开钳扣,取出产钳,然后娩出整个胎儿。必要时也可在宫缩间歇期牵引。缝合会阴。

455、下列哪项不是葡萄胎患者的高危因素

- A、 子宫大于停经月份,尤其宫底达脐平者
- B、 早婚,多产
- C、 年龄大于 40 岁
- D、 两次刮宫后血 HCG 水平持续升高
- E、 伴有咯血

答案: B

456、关于葡萄胎,下列哪项是正确的

- A、 葡萄胎排出后,至少应避孕一年
- B、 葡萄胎排除后,血 β -HCG 应立即转为阴性
- C、 葡萄胎恶变率为 35%
- D、 葡萄胎是低度滋养细胞肿瘤
- E、 葡萄胎排除后,最好一律给与预防性化疗

答案: A

457、 下面哪项是葡萄胎刮宫后必须检查的项目

- A、 测基础体温 3 个月,看是否有双相

- B、 定期做宫颈防癌涂片
- C、 每月一次胸部 X 线摄片
- D、 定期查 HCG
- E、 怀疑恶变时, 立即行诊断性刮宫

答案: C

458、葡萄胎清宫后, 避孕期间常用的方法是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

- A、 宫内节育器
- B、 长效口服避孕药
- C、 短效口服避孕药
- D、 避孕套
- E、 输卵管结扎

答案: D

459、葡萄胎清宫后 HCG 转阴时间一般不超过

- A、 1 周
- B、 3 周
- C、 6 周
- D、 9 周
- E、 12 周

答案: E

460、侵蚀性葡萄胎可能发生于

- A、 过期流产后
- B、 足月产后
- C、 葡萄胎清宫后

D、 异位妊娠后

E、 早产后

答案： C

461、盆腔内可扪及固定的囊性块物，周围粘连多，下列哪种疾病可能性大

A、 卵巢恶性肿瘤

B、 附件结核

C、 子宫内膜异位症

D、 重度慢性盆腔炎

E、 侵蚀性葡萄胎

答案： C

462、应用孕激素治疗有效的是

A、 II度闭经

B、 功血子宫内膜萎缩型

C、 子宫内膜结核

D、 子宫内膜异位症

E、 过期流产

答案： D

463、子宫脱垂最主要的病理改变是

A、 阔韧带变厚

B、 圆韧带松弛

C、 骨盆漏斗韧带松弛

D、 宫骶韧带松弛

E、 盆底组织松弛，失去正常张力

答案： E

464、防止子宫脱垂最主要的韧带是

- A、 子宫圆韧带
- B、 子宫骶韧带
- C、 子宫阔韧带
- D、 骨盆漏斗韧带
- E、 子宫主韧带

答案： E

465、宫脱垂最主要的病因是

- A、 长期腹压增加
- B、 先天发育异常
- C、 分娩损伤和产褥早期体力劳动
- D、 长期慢性咳嗽
- E、 缺乏雌激素

答案： C

466、患者用力屏气时，子宫颈脱出阴道口外，临床诊断

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

- A、 膀胱膨出
- B、 子宫脱垂 I 度
- C、 子宫脱垂 II 轻
- D、 子宫脱垂 II 重
- E、 子宫脱垂 III 度

答案： C

467、27 岁，妇女，无职业。孕 2 产 2，产后阴道脱出一物 2 年，日渐加重而来就诊。查体：一般状态良好，妇查：加腹压时见宫颈及部分宫体脱出阴道口

外，宫颈长 4cm，阴道前后壁膨出，其处理应是

- A、 使用子宫托
- B、 Manchester 手术
- C、 阴式子宫全切+阴道前后壁修补术
- D、 行宫颈部分切除术
- E、 经腹行子宫全切术

答案： B

468、女，45 岁，不规则阴道流血 2 个月，性交后出血。宫颈锥切标本显微镜下可见低分化鳞状细胞癌，间质浸润深度 2mm。宽度 6mm，正确的分期为

- A、 I A2 期
- B、 I B1 期
- C、 I B2 期
- D、 II A 期
- E、 I A1 期

答案： E

469、子宫颈癌的好发部位是

- A、 子宫颈管内
- B、 宫颈阴道部
- C、 子宫颈阴道上部
- D、 鳞一柱状交接部
- E、 柱状上皮处

答案： D

470、宫颈癌主要转移途径

- A、 血行转移
- B、 腹膜播散

- C、 直接蔓延和淋巴转移
- D、 跳跃转移
- E、 以上都是

答案： C

471、发现宫颈癌的最可靠方法是

- A、 阴道镜检查
- B、 碘试验
- C、 宫颈刮片细胞学检查
- D、 宫颈和宫颈管活体组织检查
- E、 宫颈锥形切除

答案： D

472、下述哪项是早期宫颈癌的症状

- A、 阴道大量排液
- B、 反复阴道出血
- C、 接触性阴道出血
- D、 大腿及腰骶部疼痛
- E、 恶病质

答案： C

473、简述四步触诊法

答案：

第 1 步手法:检查者两手置子宫底部, 了解子宫外形并测得宫底高度, 估计胎儿大小与孕周数是否相符。然后以两手指腹相对轻推, 判断宫底部的胎儿部分, 胎头硬而圆且有浮球感, 胎臀软而宽且形状不规则。

第 2 步手法:检查者左右手分别置于腹部左右侧, 一手固定, 另手轻轻深按检查, 触及平坦饱满者为胎背, 可变形的高低不平部分是胎儿肢体, 有时感到胎儿肢体活动。

第 3 步手法:检查者右手拇指与其余 4 指分开, 置于耻骨联合上方握住胎先露部, 进一步查清是胎头或胎臀, 左右推动以确定是否衔接。若胎先露部仍浮动, 表示尚未入盆。若已衔接, 则胎先露部不能推动。(师 E 2)

第4步手法:检查者左右手分别置于胎先露部的两侧,向骨盆人口方向向下深按,再次核对胎先露部的诊断是否正确,并确定胎先露部入盆的程度。

474、产前检查的内容

答案:

475、早期减速

答案:

指伴随宫缩出现的减速,通常是对称性地、缓慢地下降到最低点再恢复到基线。减速的开始到胎心率最低点的时间 ≥ 30 秒,减速的最低点常与宫缩的峰值同时出现;一般来说,减速的开始、最低值及恢复与宫缩的起始、峰值及结束同步

476、晚期减速

答案:

指伴随宫缩出现的减速,通常是对称性地、缓慢地下降到最低点再恢复到基线。减速的开始到胎心率最低点的时间 ≥ 30 秒,减速的最低点通常晚于宫缩峰值;一般来说,减速的开始、最低值及恢复分别延后于宫缩的起始、峰值及结束

477、变异减速

答案:

指突发的显著的胎心率急速下降。减速的开始到最低点的时间 < 30 秒,胎心率下降 ≥ 15 次/分,持续时间 ≥ 15 秒,但 < 2 分钟。当变异减速伴随宫缩时,减速的起始、深度和持续时间与宫缩之间无固定规律(图6-11)。典型的变异减速是先有一初始加速的肩峰,紧接一快速的减速,之后快速恢复到正常基线伴有继发性加速(双肩峰)

478、子宫压缩缝合术的手术适应症

答案:

子宫收缩乏力、胎盘因素(前置胎盘、胎盘粘连等)引起的产后出血,不同子宫压迫缝合术的适应证有所不同。B-Lynch 缝合术和 Hayman 缝合术主要用于子宫收缩乏力性产后出血;CHO 缝合术主要用于子宫收缩乏力性产后出血和前置胎盘引起的产后出血;针对前置胎盘子宫下段胎盘剥离面出血的止血方法有子宫下段水平峡部-宫颈压迫缝合法、子宫下段平行垂直压迫缝合法、子宫峡部-宫颈环状压迫缝合法、子宫下段横行环状压迫缝合法。子宫压迫缝合术还可用于晚期产后出血经保守治疗无效、孕早、中期流产或引产后的出血等。

479、宫腔镜检查的适应症

答案:

1. 异常子宫出血。
2. 可疑宫腔粘连及畸形。
3. 可疑妊娠物残留。
4. 影像学检查提示宫腔内占位病变。
5. 原因不明的不孕或反复流产。
6. 宫内节育器异常。
7. 宫腔内异物。
8. 宫腔镜术后相关评估。

480、宫腔镜手术适应症

答案:

1. 子宫内膜息肉。
2. 子宫黏膜下肌瘤及部分影响宫腔形态的肌壁间肌瘤。
3. 宫腔粘连。
4. 纵隔子宫。
5. 子宫内膜切除。
6. 宫腔内异物取出,如嵌顿节育器及流产残留物等。

7. 宫腔镜引导下输卵管插管通液、注药及绝育术。

481、胎儿附属物包括哪些？

答案：

胎盘、胎膜、脐带、羊水

482、胎盘的功能

答案：

胎盘介于胎儿与母体之间，是维持胎儿生长发育的总要器官。具有物质交换、防御、合成及免疫等功能