

神经病学-题库

1、下列有关 Alzheimer 病认知功能障碍的叙述不正确的是() (2.0)

- A、 缓慢、进行性加重
- B、 在神志不清的基础上不断发展
- C、 可出现全面的智力减退
- D、 . 计算力受损失十分常见
- E、 可出现阅读、书写困难

答案： B

2、阿尔茨海默病的主要临床症状不包括以下哪类() (2.0)

- A、 性欲降低
- B、 认知障碍
- C、 日常生活能力下降
- D、 精神行为

答案： A

3、下列哪项不是偏头痛的预防性治疗药物?() (2.0)

- A、 麦角类制剂
- B、 β 肾上腺素受体阻滞剂
- C、 钙离子拮抗剂
- D、 抗癫痫药
- E、 5-HT 受体拮抗剂

答案： A

4、下列哪项不属于特发性面神经麻痹的临床表现:(2.0)

- A、 病变侧额纹消失
- B、 病变侧巩膜征阳性
- C、 病变侧眼球外展不能
- D、 病变侧舌前 2/3 味觉缺失
- E、 病变侧鼓腮不能

答案： C

5、低颅压性头痛的颅内压必须低于() (2.0)

- A、 60mmH₂O
- B、 70mmH₂O
- C、 80mmH₂O
- D、 90mmH₂O
- E、 100mmH₂O

答案： A

6、进行性肌营养不良临床特点是：() (2.0)

- A、 四肢近端无力,心电图示U波
- B、 四肢无力,脑脊液蛋白细胞分离
- C、 四肢近端无力,腓肠肌肥大
- D、 四肢近端无力,疼痛,压痛
- E、 四肢远端无力,远端感觉障碍

答案： C

7、关于脑底异常血管网病,不正确的是() (2.0)

- A、 多见于儿童及青壮年
- B、 儿童患者以出血性卒中为主
- C、 儿童患者以缺血性卒中及反复发生的TIA为主
- D、 TIA发作可表现为双侧肢体交替出现的轻偏瘫
- E、 部分病例可表现为反复晕厥

答案： C

8、关于传导性失语特点不正确的是：(2.0)

- A、 病变位于优势半球额中回后部
- B、 病变位于优势半球缘上回皮质或白质
- C、 听理解正常
- D、 自发语言正常
- E、 自发讲话能说出的词语不能复述

答案： A

9、脑死亡的确定标准不包括下列哪项() (2.0)

- A、 . 患者对仍何外界刺激均无反应
- B、 . 脊髓反射消失
- C、 . 脑干反射消失
- D、 . 脑电活动消失
- E、 . 无脑血流灌注现象

答案： B

10、 以下动脉狭窄不能引起脑动脉盗血综合征的是：() (2.0)

- A、 一侧锁骨下动脉近心端发出椎动脉前
- B、 一侧无名动脉近心端发出椎动脉前
- C、 一侧颈内动脉闭塞
- D、 基底动脉明显狭窄
- E、 一侧大脑中动脉 M1 段狭窄

答案： E

11、 选择：重症肌无力的下列哪项表述是错误的：(2.0)

- A、 是一种获得性自身免疫性疾病
- B、 以部分或全身性骨骼肌疲劳为临床特征
- C、 症状晨轻暮重或活动后加重、休息后减轻
- D、 抗胆碱酯酶药物治疗有效
- E、 腾喜龙试验阴性

答案： E

12、 20 岁女患, 发作性抽搐 2 个月。发作时意识清楚, 抽搐从一侧手指开始, 向腕部、前臂、肘部、肩部及口角面部逐渐发展。这种癫痫发作形式最可能是：() (2.0)

- A、 部分感觉性发作
- B、 复杂部分性发作
- C、 Jackson 发作
- D、 自主神经性发作
- E、 自动症

答案： C

13、 癫痫病人禁用的药物是 (2.0)

- A、 尼可刹米
- B、 二甲弗林
- C、 哌醋甲酯
- D、 甲氯芬酯
- E、 以上均不是

答案： C

14、根据简易精神状态量表,当得分()分时,诊断为重度痴呆:(2.0)

- A、 15~20
- B、 10~20
- C、 <10
- D、 21~25

答案： C

15、紧张型头痛伴随的常见症状有() (2.0)

- A、 焦虑
- B、 呕吐
- C、 类 Horner 征
- D、 畏光
- E、 畏声

答案： A

16、有关 Lennox-Gastaut 综合征的说法错误的是() (2.0)

- A、 多种发作类型共存
- B、 精神发育正常
- C、 好发于 1-8 岁,少数出现在青春期
- D、 易出现癫痫持续状态
- E、 预后不良

答案： B

17、丛集性头痛的发作持续时间() (2.0)

- A、 .15 分钟-3 小时
- B、 2-4 小时

- C、 4-72 小时
- D、 .72 小时
- E、 大于 72 小时

答案： A

18、关于帕金森病运动减少下列哪项说法不正确() (2.0)

- A、 . 始动困难
- B、 . 随意运动缓慢
- C、 精细动作尚可
- D、 联带运动减少

答案： C

19、在椎一基底动脉血栓形成的病例中,下列临床表现不正确的是() (2.0)

- A、 眩晕
- B、 眼球运动障碍
- C、 吞咽困难
- D、 失语
- E、 交叉性瘫痪

答案： D

20、哪种病不属于运动神经元病 (2.0)

- A、 脊肌萎缩症
- B、 进行性肌萎缩
- C、 原发性侧索硬化
- D、 进行性延髓麻痹

答案： A

21、脊髓前动脉综合征最容易发生的两个节段是 ____ (2.0)

- A、 T2 和 L2
- B、 C7 和 T1
- C、 C5 和 C6
- D、 T4 和 L1
- E、 T6 和 L3

答案： D

22、痴呆的诊断方法包括() (2.0)

- A、 病史、躯体及神经精神检查;
- B、 神经心理学检查;
- C、 实验室及影像学检查;
- D、 以上都是

答案： D

23、脑出血的病因不包括() (2.0)

- A、 高血压合并动脉硬化
- B、 动-静脉血管畸形
- C、 脑淀粉样血管变性
- D、 糖尿病
- E、 抗凝或溶栓治疗等

答案： D

24、复方左旋多巴是治疗帕金森病最重要的药物,下列哪类患者禁用该药物()
(2.0)

- A、 糖尿病患者
- B、 青光眼患者
- C、 易栓症患者
- D、 .甲亢患者

答案： B

25、下列不符合典型的急性脊髓炎脑脊液特点的是(2.0)

- A、 压力正常
- B、 外观无色透明
- C、 细胞数正常或轻度升高
- D、 压力明显升高
- E、 蛋白正常或轻度升高

答案： D

26、下列哪项步态见于帕金森患者() (2.0)

- A、 .跨越步态
- B、 蹒跚步态
- C、 慌张步态
- D、 偏瘫步态

答案： C

27、下列哪项不适特殊类型意识障碍() (2.0)

- A、 .闭锁综合征
- B、 .去大脑强直
- C、 .无动性缄默
- D、 去皮质综合征
- E、 .植物状态

答案： A

28、下列红斑性肢痛症临床表现哪项是错误的() (2.0)

- A、 疼痛剧烈
- B、 遇热缓解
- C、 局部发热, 脉跳有力
- D、 抬高患肢可缓解
- E、 水杨酸制剂可缓解

答案： B

29、下列哪种食物不能诱发偏头痛?() (2.0)

- A、 奶酪
- B、 含亚硝酸盐的肉类
- C、 巧克力
- D、 干果类
- E、 葡萄酒

答案： D

30、下列关于化脓性脑膜炎的叙述, 正确的是() (2.0)

- A、 脑脊液细胞数显著升高, 以单粒细胞为主
- B、 化脓性脑膜炎是典型的急性炎症渗出期改变

- C、化脓性脑膜炎是典型的亚急性炎症增殖期改变
- D、脑脊液中白细胞数多不超过 $200 \times 10^6/L$

答案： B

31、下列哪项不属于三叉神经痛的规范治疗:(2.0)

- A、药物治疗
- B、药物治疗无效封闭治疗
- C、经皮半月神经射频电凝疗法
- D、手术治疗
- E、局部热敷理疗

答案： E

32、关于 PM 的肌无力症状,下列哪些说法不对(2.0)

- A、首发症状通常为四肢近端无力
- B、肌无力常伴有关节、肌肉痛
- C、眼外肌通常受累
- D、晚期有肌萎缩和关节挛缩
- E、肌无力可累及四肢肌、颈肌、咽喉肌及呼吸机等

答案： C

33、脊髓亚急性联合变性最有效的治疗是()。(2.0)

- A、激素
- B、维生素 B12
- C、神经营养因子
- D、输血
- E、叶酸

答案： B

34、腔隙性脑梗死最常见的临床表现 () (2.0)

- A、纯运动性偏瘫
- B、纯感觉性卒中
- C、共济失调轻偏瘫
- D、构音障碍-手笨拙综合征

E、感觉运动性卒中

答案： A

35、以下关于药物过度使用性头痛错误的是：(2.0)

A、 MOH 患者头痛的性质、部位、严重程度及伴随症状在不同病人之间变化不大。

B、 可预测的药物依赖性节律, 药物摄入后改善药物衰减后头痛恢复。MOH 的头痛也常发生在早晨, 可使病人从睡眠中痛醒。

C、 MOH 患者常共患焦虑与抑郁障碍。偏头痛患者容易共患焦虑与抑郁, 慢性疾病时更易罹患。

D、 大部分患者诉睡眠差, 精力不能得到恢复, 可能是由于咖啡因的作用、每日应用药物的戒断、或是抑郁的原因。药物撤退后睡眠常会改善, 否则要考虑其他的原因。

答案： A

36、低钾型周期性瘫痪治疗：(5.0)

A、 发作期:10%氯化钾或 10%枸橼酸钾 40-50ml 顿服, 24 小时内再分次口服, 一日总量为 10g

B、 也可静脉滴注氯化钾溶液

C、 预防发作:间歇期口服钾盐, 或乙酰唑胺, 或螺旋内酯

D、 避免诱因, 低钠饮食, 忌食过多高碳水化合物等

E、 对症治疗, 出现呼吸机麻痹时应予辅助呼吸, 严重心律失常者应积极纠正。

答案： ABCDE

37、慢性脊髓压迫症临床表现三期包括(5.0)

A、 根痛期

B、 脊髓部分受压期

C、 感觉障碍期

D、 运动障碍期

E、 脊髓完全受压期

答案： ABE

38、低颅压性头痛是脑脊液压力降低($<60\text{mmH}_2\text{O}$)导致的头痛, 与体位无关。(1.0)

答案： 错误

39、脑出血的局限性定位表现只取决于出血部位。(1.0)

答案： 错误

40、弥漫性硬化只发生于青少年男性,呈亚急性或慢性进行性恶化疾病。(1.0)

答案： 错误

41、对蛛网膜下腔出血诊断最有意义的检查是 MRI(1.0)

答案： 错误

42、心源性脑栓塞急性期应立即启动抗凝治疗() (1.0)

答案： 错误

43、脑栓塞患者并发出血性梗死时,可以继续使用抗凝和抗血小板聚集药物
() (1.0)

答案： 错误

44、帕金森病最显著的生物化学特征是脑内多巴胺含量减少。(1.0)

答案： 正确

45、多发性硬化的诊断标准中,从病史和神经系统检查,表明中枢神经系统白质内同时存在着两处以上的病灶,起病年龄在 10-50 岁之间。(1.0)

答案： 正确

46、脑桥中央髓鞘溶解症是一种渗透失常导致脑桥基底部分对称性脱髓鞘为病理特征的疾病。特别是低(高)钠血症,纠正过快容易诱发该病。(1.0)

答案： 正确

47、重症肌无力危象包括胆碱能危象和肌无力危象两种。(1.0)

答案： 错误

48、帕金森病首先需要与帕金森综合征鉴别,后者均有明确的病因,如药物、中毒、感染、脑外伤、脑卒中。(1.0)

答案： 正确

49、弥漫性硬化一般认为属于自身免疫性疾病。(1.0)

答案： 正确

50、短暂性脑缺血发作恢复后遗留后遗症
(1.0)

答案： 错误

51、同心圆硬化病程呈现脑白质脱髓鞘疾病,即病灶内髓鞘脱失带与髓鞘保存带呈同心圆层状交互排列,行成树木年轮状改变。(1.0)

答案: 正确

52、线粒体肌病及线粒体脑肌病可出现低乳酸血症。(1.0)

答案: 错误

53、肾上腺脑白质营养不良可有效治疗(1.0)

答案: 错误

54、腔隙性脑梗死的大小一般小于 2mm?(1.0)

答案: 错误

55、同心圆硬化预后差,无有效治疗药物。(1.0)

答案: 错误

56、NMO 患者脊髓 MRI 表现为节段炎性脱髓鞘病灶,连续长度一般 ≤ 3 个椎体节段。(1.0)

答案: 错误

57、面偏侧萎缩症临床表现为患侧皮肤萎缩、菲薄、光滑、常伴脱发、色素沉着等,但不累及大脑半球。(1.0)

答案: 错误

58、男,18岁。四肢无力3天,大小便正常。病前1周有“上感”史。查体:双眼闭合无力,双侧咽反射迟钝,四肢肌力1~2级,肌张力低,腱反射消失,无明显感觉障碍。最可能的诊断是

答案: ();

59、West 综合症的脑电图表现为() (2.0)

- A、棘-慢复合波和睡眠中 10Hz 的快节律。
- B、. 高度节律失调。
- C、一侧或双侧枕区阵发性高波幅棘-慢波或尖波,呈反复节律性发放
- D、中央-颞区高波幅棘-慢波
- E、双侧对称 3Hz 棘-慢综合波。

答案: B

60、癫痫大发作首选(2.0)

- A、 苯妥英钠
- B、 乙琥胺
- C、 丙戊酸钠
- D、 地西洋
- E、 硝西洋

答案： A

61、脑血栓形成的最常见病因是() (2.0)

- A、 高血压
- B、 脑动脉粥样硬化
- C、 各种脑动脉炎
- D、 血压偏低
- E、 红细胞增多症

答案： B

62、肌炎的特异性抗体是(2.0)

- A、 Hu
- B、 抗核抗体
- C、 抗肌球蛋白抗体
- D、 抗中性粒细胞浆抗体
- E、 Jo-1, PL-7

答案： E

63、下列哪项不是原发性三叉神经痛的特点:(2.0)

- A、 局部可见疱疹分布
- B、 仅集中在三叉神经分布区
- C、 短暂性并反复发作
- D、 女性多于男性
- E、 疼痛剧烈

答案： A

64、低钠血症如快速纠正可诱发以下哪种疾病(2.0)

- A、 同心圆硬化

- B、 多发性硬化
- C、 病毒性脑膜炎
- D、 脑桥中央髓鞘溶解症
- E、 急性播散性脑脊髓炎

答案： D

65、关于髓内病变描述正确的是(2.0)

- A、 痛温觉障碍自下而上发展,尾侧重,早期出现括约肌功能障碍
- B、 痛温觉障碍自下而上发展,头侧重,晚期出现括约肌功能障碍
- C、 痛温觉障碍自上而下发展,尾侧重,晚期出现括约肌功能障碍
- D、 痛温觉障碍自上而下发展,头侧重,早期出现括约肌功能障碍
- E、 .痛温觉障碍自上而下发展,头侧重,晚期出现括约肌功能障碍

答案： D

66、运动神经元病一般没有哪种表现(2.0)

- A、 肌萎缩
- B、 锥体束征
- C、 延髓麻痹
- D、 感觉障碍

答案： D

67、关于交叉瘫描述正确的是() (2.0)

- A、 病变侧肢体中枢性瘫痪,对侧感觉障碍
- B、 病变侧颅神经上运动神经元性瘫痪,对侧肢体下运动神经元性瘫痪
- C、 病变侧颅神经下运动神经元性瘫痪,对侧肢体上运动神经元性瘫痪
- D、 病变侧周围性面瘫,病变对侧肢体下运动神经元性瘫痪
- E、 病变侧感觉障碍,病变对侧肢体下运动神经元性瘫痪

答案： C

68、高血压脑出血最常见的部位是() (2.0)

- A、 豆状核和丘脑
- B、 内囊和基底节
- C、 蛛网膜下腔

- D、侧脑室
- E、大脑髓质

答案： B

69、以下关于线粒体肌病及线粒体脑肌病描述错误的是() (2.0)

- A、由于 ATP 合成不足造成
- B、由于 ATP 合成过多造成
- C、可累及骨骼肌
- D、可累及中枢神经系统
- E、遗传方式为母系遗传

答案： B

70、紧张型头痛的性质为() (2.0)

- A、刺痛
- B、钻痛
- C、炸裂样疼痛
- D、紧箍样胀痛
- E、波动性疼痛

答案： D

71、老年期最常见的痴呆类型是() (2.0)

- A、帕金森病痴呆
- B、血管性痴呆
- C、阿尔茨海默病
- D、额颞叶痴呆
- E、亨廷顿病

答案： C

72、继发性红斑性肢痛症常由下面哪种疾病引起() (2.0)

- A、雷诺病
- B、糖尿病
- C、甲状腺功能亢进
- D、真性红细胞增多症

E、 皮炎

答案： D

73、化脓性脑膜炎的描述下列哪项是正确的() (2.0)

A、 起病急,可表现为头痛、发热、呕吐等。颈部强直及克氏征阳性是诊断的重要依据

B、 多为急性或亚急起病,有上呼吸道或肠道感染史,脑脊液中白细胞和蛋白轻度升高,糖和氯化物正常

C、 隐袭起病,前驱期以情感症状为主

D、 病程缓慢发展,早期多表现为记忆障碍和人格改变

答案： A

74、化脓性脑膜炎最常见的致病菌有() (2.0)

A、 大肠埃希菌

B、 脑膜炎双球菌

C、 肺炎克雷伯杆菌

D、 链球菌

答案： B

75、Alzheimer 病早期时,常常出现一系列临床表现,其中哪种说法不对() (2.0)

A、 爱忘事,如忘记电话号码或关煤气

B、 社交礼仪通常保持良好

C、 头痛、恶心、呕吐

D、 腰穿检查脑脊液常规和生化正常

E、 非找词和找名字困难

答案： C

76、与进行性肌营养不良发病相关的蛋白是:() (2.0)

A、 抗肌萎缩蛋白

B、 肌球蛋白

C、 肌动蛋白

D、 肌钙蛋白

E、 原肌球蛋白

答案： A

77、下列哪项不属于帕金森病的特有表现() (2.0)

- A、搓丸样动作
- B、. 齿轮样强直
- C、写字过小症
- D、跨阈步态

答案： D

78、癫痫持续状态时静脉注射的首选药是(2.0)

- A、 硫喷妥钠
- B、 苯妥英钠
- C、 地西洋
- D、 乙琥胺
- E、 以上均不是

答案： C

79、下列不符合急性脊髓炎临床特点的是(2.0)

- A、 散在发病、多见于青壮年
- B、 病前可有上呼吸道感染症状
- C、 可先有病灶相应部位的疼痛
- D、 急性发生脊髓横贯损伤症状
- E、 早期一般不出现脊髓休克现象

答案： E

80、下列哪项不属于癫痫单纯部分性发作 () (2.0)

- A、 运动性发作
- B、 感觉性发作
- C、 失神发作
- D、 自主神经发作
- E、 精神症状性发作

答案： C

81、脑血栓形成不应出现的临床表现是() (2.0)

- A、 意识不清

- B、 肢体瘫痪
- C、 头痛
- D、 癫痫发作
- E、 脑膜刺激征

答案： E

82、运动神经元病中哪种类型最常见(2.0)

- A、 肌萎缩侧索硬化
- B、 进行性肌萎缩
- C、 原发性侧索硬化
- D、 进行性延髓麻痹

答案： A

83、“写字过小征”是下列哪种疾病的特征性表现() (2.0)

- A、 运动神经元病
- B、 额颞叶痴呆
- C、 多系统萎缩
- D、 帕金森病

答案： D

84、一侧颈内动脉闭塞可以不出现临床症状,是由于() (2.0)

- A、 同侧颈外动脉未闭塞
- B、 对侧颈内动脉未闭塞
- C、 正常的脑底动脉环可迅速建立侧支循环
- D、 双侧椎动脉末端闭塞
- E、 颅内血管变异

答案： C

85、帕金森病的典型震颤为?() (2.0)

- A、 静止性震颤
- B、 意向性震颤
- C、 姿势性震颤
- D、 扑翼样震颤

答案： A

86、下列哪项不适雷诺病治疗药物() (2.0)

- A、 .硝苯地平
- B、 草酸奈呋胺
- C、 前列地尔
- D、 .维生素 C
- E、 .低分子右旋糖酐

答案： D

87、多发硬化具有诊断价值的检查(2.0)

- A、 脑脊液 IgG 指数
- B、 脑脊液 IgG 寡克隆带检查
- C、 头部 MRI
- D、 头部 CT
- E、 神经诱发电位检查

答案： B

88、下列哪项不适额叶的生理功能() (2.0)

- A、 .皮质运动区
- B、 .运动性语言中枢
- C、 .皮质感觉中枢
- D、 .书写中枢
- E、 .皮质侧视中枢

答案： C

89、目前在帕金森病的各种治疗方法中哪一种治疗方法最为有效() (2.0)

- A、 手术治疗
- B、 康复治疗
- C、 细胞移植及基因治疗
- D、 药物治疗

答案： D

90、关于强制性肌营养不良的描述正确的是: (5.0)

- A、叩击出现肌球
- B、中青年起病的特征性无力、肌萎缩和强直
- C、典型肌强直放电肌电图
- D、腾喜龙试验阳性
- E、主要累及四肢远端肌、头面部肌和胸锁乳突肌

答案： ABCE

91、面偏侧萎缩症病因可能有哪些？

(5.0)

- A、创伤、病毒感染
- B、基因因素、自身免疫、内分泌紊乱
- C、外周三叉神经炎
- D、颈交感神经过度活跃

答案： ABCD

92、膝腱反射定位于 L1-2

(1.0)

答案： 错误

93、短暂性脑缺血发作好发年龄 50~70 岁

(1.0)

答案： 错误

94、强直性肌营养不良血清 CK 和 LDH 等肌酶均显著增高。(1.0)

答案： 错误

95、假性癫痫发作是由心理障碍引起的脑部功能异常,可有运动、感觉和意识模糊等类似癫痫发作症状,难以区分。(1.0)

答案： 正确

96、深反射增强多见于皮质运动区及锥体束损害而反射弧完整时

(1.0)

答案： 正确

97、线粒体肌病及线粒体脑肌病是绝对母系遗传。(1.0)

答案： 错误

98、脑白质营养不良属于遗传因素导致的疾病(1.0)

答案： 正确

99、角膜反射是深反射
(1.0)

答案： 错误

100、脑白质营养不良分为异染性脑白质营养不良、肾上腺脑白质营养不良
(1.0)

答案： 正确

101、基底核区出血在脑出血中最为常见。(1.0)

答案： 正确

102、短暂性脑缺血发作持续时间不超过 12 小时
(1.0)

答案： 错误

103、帕金森病的肌强直特点是伸肌而不是屈肌的肌张力增高。(1.0)

答案： 错误

104、红斑性肢痛症以夜间疼痛明显, 发作次数多。() (1.0)

答案： 正确

105、帕金森病的主要病理变化发生在黑质纹状体。(1.0)

答案： 正确

106、脊髓亚急性联合变性的临床特点中常有贫血或胃肠道疾病, 但不包括锥体束征, 对吗?(1.0)

答案： 错误

107、男, 18 岁。四肢无力 3 天, 大小便正常。病前 1 周有“上感”史。查体: 双眼闭合无力, 双侧咽反射迟钝, 四肢肌力 1~2 级, 肌张力低, 腱反射消失, 无明显感觉障碍。最可能的诊断是

A、

多发性肌炎

B、 重症肌无力

C、 吉兰-巴雷综合征

D、 周期性瘫痪

答案： C

108、大脑皮质运动区病变的瘫痪多表现为

A、 单瘫或不均等偏瘫

B、 完全性均等性偏瘫

C、 交叉性瘫

D、 四肢瘫

答案： A

109、易出现“三偏”综合征的病损部位在

A、 A. 脊髓

B、 B. 脑干

C、 C. 小脑

D、 D. 内囊

答案： D

110、脑干病损时瘫痪的特点是

A、 A. 完全性均等性偏瘫

B、 B. 单瘫

C、 C. 截瘫

D、 D. 交叉性瘫痪

答案： D

111、中枢性面瘫与周围性面瘫表现不同的关键是

A、 A. 有无肢体瘫痪

B、 B. 有无伸舌偏斜

C、 C. 有无病理反射

D、 D. 有无皱额闭眼障碍

答案： D

112、下列哪项属锥体束征

A、 Kernig 征

B、 Babinski 征

- C、 Romberg 征
- D、 Brudzinski 征
- E、 Lasegue 征

答案： B

113、三叉神经痛的扳机点常常存在于

- A、 鼻根、面颊部
- B、 颈部和下颌
- C、 耳前近颞颌关节处
- D、 眼角和眉间
- E、 口角、鼻翼近颊部

答案： E

114、帕金森病起病时,肢体累及方式常见为

- A、 一侧上、下肢先累及
- B、 双侧上肢先累及
- C、 左上肢、右下肢先累及
- D、 右上肢、左下肢先累及
- E、 双下肢先累及

答案： A

115、尽管 Parkinson 病是由于多巴胺缺乏所致,治疗用 L-dopa 而不是多巴胺的原因是…() (0.0)

- A、 L-dopa 较多巴胺会产生较少的恶心、呕吐
- B、 多巴胺在胃肠道容易代谢成无效成分
- C、 L-dopa 更易于在胃肠道吸收
- D、 多巴胺不能穿过血脑屏障,对中枢神经系统没有治疗效果
- E、 L-dopa 较多巴胺在受体部位的效率更高

答案： D

116、下运动神经元性瘫痪肢体可出现的表现之一是

- A、 神经传导速度异常,失神经电位
- B、 腱反射亢进

- C、 Babinski 征阳性
- D、 无肌肉萎缩
- E、 肌张力增高

答案： A

117、脑梗死发生后,普遍认为 rt-PA(阿替谱酶)治疗时间窗是……………() (0.0)

- A、 2 小时内
- B、 3 小时内
- C、 4.5 小时内
- D、 12 小时内
- E、 24 小时内

答案： C

118、关于周围性面瘫,下列哪项不正确

- A、 同侧闭目无力
- B、 同侧鼻唇沟浅
- C、 同侧额纹消失
- D、 同侧 Bell 现象阳性
- E、 张口时口角歪向同侧

答案： E

119、男性,62 岁,双手相继出现震颤 8 个月,如“搓丸样”,走路慌张步态,面无表情。该患者双上肢肌张力特点最可能是

- A、 交替样增强
- B、 混合样增强
- C、 折刀样增强
- D、 齿轮样增强
- E、 肌张力减弱

答案： D

120、原发性三叉神经痛有哪种表现

- A、 面部感觉消失
- B、 角膜反射消失

- C、 张口下颌偏斜
- D、 下颌反射减弱
- E、 以上均没有

答案： E

121、 意识清楚的患者对别人和自己说的话不理解, 但能流畅地讲话, 错语(错词)很多, 然而常答非所问, 复述和听写能力受损, 这种失语称为

- A、 Broca 失语
- B、 Wernicke 失语
- C、 传导性失语
- D、 命名性失语
- E、 经皮质失语

答案： B

122、 前角型瘫痪表现不正确的为

- A、 常伴有感觉障碍
- B、 肌肉萎缩
- C、 肌张力低下
- D、 有肌纤维颤动
- E、 节段性瘫痪

答案： A

123、 一侧瞳孔散大, 直接和间接光反射消失, 对侧间接光反射正常, 病损位于

- A、 同侧视神经
- B、 对侧视神经
- C、 同侧动眼神经
- D、 对侧动眼神经
- E、 同侧视神经及动眼神经

答案： C

124、 垂体瘤导致的视野障碍最常见的是

- A、 双鼻侧偏盲
- B、 双颞侧偏盲

- C、 双眼同向偏盲
- D、 象限盲
- E、 单眼偏盲

答案： B

125、 癫痫持续状态, 一般所说指的是

- A、 精神运动性发作数
- B、 一侧肢体抽搐不止
- C、 阵挛发作一处开始逐渐扩散
- D、 大发作频繁, 间期意识持续丧失

答案： D

126、 患者, 男性, 42 岁, 反复全身抽搐 2 小时, 昏迷, 心肺正常。首要处理

- A、 立即行颅脑 CT
- B、 腰椎穿刺, 化验脑脊液
- C、 降颅压
- D、 立即静脉注射地西洋

答案： D

127、 多发性硬化是一种什么疾病

- A、 螺旋体感染病
- B、 脱髓鞘疾病
- C、 维生素 B12 缺乏病
- D、 脂类代谢病

答案： B

128、 脑神经共有 12 对。..... () (0.1)

答案： 正确

129、 脑干损伤可出现典型的“三偏”征。..... () (0.1)

答案： 错误

130、 脑膜刺激征是脑出血的典型表现。..... () (0.1)

答案： 错误

131、CT 是确诊癫痫的首要检查方法。……………
() (0.1)

答案： 错误

132、高血压是最重要的和独立的脑卒中的危险因素。……………
() (0.1)

答案： 正确

133、青年男性, 发作性头痛, 有视觉先兆, 伴有恶心呕吐, 服用麦角胺有效, 查体无阳性体征, 最可能的诊断是紧张性头痛…………… ()
(0.1)

答案： 错误

134、治疗癫痫持续状态首选的药物是安定静脉注射。…………… () (0.1)

答案： 正确

135、重症肌无力是一种神经肌肉接头病变所致的疾病。…………… () (0.1)

答案： 正确

136、高度提示多发性硬化的两个重要体征是眼球震颤和核间性眼肌麻痹。…………… () (0.1)

答案： 正确

137、脊髓颈膨大横贯性损伤, 双上肢表现为上运动神经元瘫痪…………… ()
(0.1)

答案： 错误

138、下列哪项属锥体束征

- A、 Kernig 征
- B、 Babinski 征
- C、 Romberg 征
- D、 Brudzinski 征
- E、 Lasegue 征

答案： B

139、三叉神经痛的扳机点常常存在于

- A、 鼻根、面颊部
- B、 颈部和下颌
- C、 耳前近颞颌关节处
- D、 眼角和眉间
- E、 口角、鼻翼近颊部

答案： E

140、帕金森病起病时,肢体累及方式常见为

- A、 一侧上、下肢先累及
- B、 双侧上肢先累及
- C、 左上肢、右下肢先累及
- D、 右上肢、左下肢先累及
- E、 双下肢先累及

答案： A

141、尽管 Parkinson 病是由于多巴胺缺乏所致,治疗用 L-dopa 而不是多巴胺的原因是

- A、 L-dopa 较多巴胺会产生较少的恶心、呕吐
- B、 多巴胺在胃肠道容易代谢成无效成分
- C、 L-dopa 更易于在胃肠道吸收
- D、 多巴胺不能穿过血脑屏障,对中枢神经系统没有治疗效果
- E、 L-dopa 较多巴胺在受体部位的效率更高

答案： D

142、下运动神经元性瘫痪肢体可出现的表现之一是

- A、 神经传导速度异常,失神经电位
- B、 腱反射亢进
- C、 Babinski 征阳性
- D、 无肌肉萎缩
- E、 肌张力增高

答案： A

143、脑梗死发生后,普遍认为 rt-PA(阿替谱酶)治疗时间窗是

- A、 2 小时内
- B、 3 小时内
- C、 4.5 小时内
- D、 12 小时内
- E、 24 小时内

答案: C

144、关于周围性面瘫,下列哪项不正确

- A、 同侧闭目无力
- B、 同侧鼻唇沟浅
- C、 同侧额纹消失
- D、 同侧 Bell 现象阳性
- E、 张口时口角歪向同侧

答案: E

145、同向性偏盲不见于

- A、 视束损害
- B、 外侧膝状体损害
- C、 视放射病变
- D、 视皮质病变
- E、 视神经损害

答案: E

146、男性,62岁,双手相继出现震颤8个月,如“搓丸样”,走路慌张步态,面无表情。该患者双上肢肌张力特点最可能是

- A、 交替样增强
- B、 混合样增强
- C、 折刀样增强
- D、 齿轮样增强
- E、 肌张力减弱

答案: D

147、原发性三叉神经痛有哪种表现

- A、 面部感觉消失
- B、 角膜反射消失
- C、 张口下颌偏斜
- D、 下颌反射减弱
- E、 以上均没有

答案： E

148、意识清楚的患者对别人和自己说的话不理解,但能流畅地讲话,错语(错词)很多,然而常答非所问,复述和听写能力受损,这种失语称为

- A、 Broca 失语
- B、 Wernicke 失语
- C、 传导性失语
- D、 命名性失语
- E、 经皮质失语

答案： B

149、前角型瘫痪表现不正确的为

- A、 常伴有感觉障碍
- B、 肌肉萎缩
- C、 肌张力低下
- D、 有肌纤维颤动
- E、 节段性瘫痪

答案： A

150、一侧瞳孔散大,直接和间接光反射消失,对侧间接光反射正常,病损位于

- A、 同侧视神经
- B、 对侧视神经
- C、 同侧动眼神经
- D、 对侧动眼神经
- E、 同侧视神经及动眼神经

答案： C

151、垂体瘤导致的视野障碍最常见的是

- A、 双鼻侧偏盲
- B、 双颞侧偏盲
- C、 双眼同向偏盲
- D、 象限盲
- E、 单眼偏盲

答案： B

152、癫痫持续状态,一般所说指的是

- A、 精神运动性发作数
- B、 一侧肢体抽搐不止
- C、 阵挛发作一处开始逐渐扩散
- D、 大发作频繁,间期意识持续丧失

答案： D

153、诊断癫痫主要依据

- A、 可靠的病史
- B、 神经系统检查
- C、 脑脊液检查
- D、 脑电图检查

答案： A

154、患者,男性,42岁,反复全身抽搐2小时,昏迷,心肺正常。首要处理

- A、 立即行颅脑CT
- B、 腰椎穿刺,化验脑脊液
- C、 降颅压
- D、 立即静脉注射地西洋

答案： D

155、闭锁综合征系病变累及:()

- A、 边缘系统
- B、 上行网状激活系统
- C、 桥脑基底部病变

D、广泛大脑皮质层

答案： C

156、与深感觉传导有关的结构是：()

- A、 楔束
- B、 锥体束
- C、 脊髓丘脑束
- D、 内侧纵束

答案： A

157、脑神经共有 12

对。..... () (1.0)

答案： 正确

158、脑干损伤可出现典型的“三偏”

征。..... () (1.0)

答案： 错误

159、脑膜刺激征是脑出血的典型表

现。..... () (1.0)

答案： 错误

160、CT 是确诊癫痫的首要检查方法。.....

() (1.0)

答案： 错误

161、高血压是最重要的和独立的脑卒中的危险因素。.....

() (1.0)

答案： 正确

162、脊髓颈膨大横贯性损伤,双上肢表现为上运动神经元瘫

痪。..... ()

(1.0)

答案： 错误

163、治疗癫痫持续状态首选的药物是安定静脉注

射。..... () (1.0)

答案： 正确

164、脑梗死最常见的病因是脑动脉硬化……………()
(1.0)

答案： 正确

165、舌前 2/3 的味觉由舌咽神经支配。
(1.0)

答案： 错误

166、青年男性,发作性头痛,有视觉先兆,伴有恶心呕吐,服用麦角胺有效,查体无阳性体征,最可能的诊断是紧张性头痛。
(1.0)

答案： 错误

167、下列哪项属锥体束征……………() (1.5)

- A、 Kernig 征
- B、 Babinski 征
- C、 Romberg 征
- D、 Brudzinski 征
- E、 Lasegue 征

答案： B

168、三叉神经痛的扳机点常常存在于……………() (1.5)

- A、 鼻根、面颊部
- B、 颈部和下颌
- C、 耳前近颞颌关节处
- D、 眼角和眉间
- E、 口角、鼻翼近颊部

答案： E

169、帕金森病起病时,肢体累及方式常见为……………() (1.5)

- A、 一侧上、下肢先累及
- B、 双侧上肢先累及
- C、 左上肢、右下肢先累及

D、 右上肢、左下肢先累及

E、 双下肢先累及

答案： A

170、尽管 Parkinson 病是由于多巴胺缺乏所致,治疗用 L-dopa 而不是多巴胺的原因是…() (1.5)

A、 L-dopa 较多巴胺会产生较少的恶心、呕吐

B、 多巴胺在胃肠道容易代谢成无效成分

C、 L-dopa 更易于在胃肠道吸收

D、 多巴胺不能穿过血脑屏障,对中枢神经系统没有治疗效果

E、 L-dopa 较多巴胺在受体部位的效率更高

答案： D

171、下运动神经元性瘫痪肢体可出现的表现之一是……………() (1.5)

A、 神经传导速度异常,失神经电位

B、 腱反射亢进

C、 Babinski 征阳性

D、 无肌肉萎缩

E、 肌张力增高

答案： A

172、脑梗死发生后,普遍认为 rt-PA(阿替谱酶)治疗时间窗是……………() (1.5)

A、 2 小时内

B、 3 小时内

C、 4.5 小时内

D、 12 小时内

E、 24 小时内

答案： C

173、关于周围性面瘫,下列哪项不正确……………() (1.5)

A、 同侧闭目无力

B、 同侧鼻唇沟浅

- C、 同侧额纹消失
- D、 同侧 Bell 现象阳性
- E、 张口时口角歪向同侧

答案： E

174、同向性偏盲不见于.....() (1.5)

- A、 视束损害
- B、 外侧膝状体损害
- C、 视放射病变
- D、 视皮质病变
- E、 视神经损害

答案： E

175、男性,62岁,双手相继出现震颤8个月,如“搓丸样”,走路慌张步态,面无表情。该患者双上肢肌张力特点最可能是.....() (1.5)

- A、 交替样增强
- B、 混合样增强
- C、 折刀样增强
- D、 齿轮样增强
- E、 肌张力减弱

答案： D

176、原发性三叉神经痛有哪种表现.....() (1.5)

- A、 面部感觉消失
- B、 角膜反射消失
- C、 张口下颌偏斜
- D、 下颌反射减弱
- E、 以上均没有

答案： E

177、意识清楚的患者对别人和自己说的话不理解,但能流畅地讲话,错语(错词)很多,然而常答非所问,复述和听写能力受损,这种失语称为……………() (1.5)

- A、 Broca 失语
- B、 Wernicke 失语
- C、 传导性失语
- D、 命名性失语
- E、 经皮质失语

答案: B

178、前角型瘫痪表现不正确的为……………() (1.5)

- A、 常伴有感觉障碍
- B、 肌肉萎缩
- C、 肌张力低下
- D、 有肌纤维颤动
- E、 节段性瘫痪

答案: A

179、一侧瞳孔散大,直接和间接光反射消失,对侧间接光反射正常,病损位于……………() (1.5)

- A、 同侧视神经
- B、 对侧视神经
- C、 同侧动眼神经
- D、 对侧动眼神经
- E、 同侧视神经及动眼神经

答案: C

180、垂体瘤导致的视野障碍最常见的是……………() (1.5)

- A、 双鼻侧偏盲
- B、 双颞侧偏盲
- C、 双眼同向偏盲
- D、 象限盲

E、 单眼偏盲

答案： B

181、 癫痫持续状态, 一般所说指的是……………() (1.5)

- A、 精神运动性发作数
- B、 一侧肢体抽搐不止
- C、 阵挛发作一处开始逐渐扩散
- D、 大发作频繁, 间期意识持续丧失

答案： D

182、 诊断癫痫主要依据 ……………() (1.5)

- A、 可靠的病史
- B、 神经系统检查
- C、 脑脊液检查
- D、 脑电图检查

答案： A

183、 患者, 男性, 42 岁, 反复全身抽搐 2 小时, 昏迷, 心肺正常。首要处理……………() (1.5)

- A、 立即行颅脑 CT
- B、 腰椎穿刺, 化验脑脊液
- C、 降颅压
- D、 立即静脉注射地西洋

答案： D

184、 多发性硬化是一种什么疾病……………() (1.5)

- A、 螺旋体感染病
- B、 脱髓鞘疾病
- C、 维生素 B12 缺乏病
- D、 脂类代谢病

答案： B

185、 闭锁综合征系病变累及:()

(1.5)

- A、 边缘系统
- B、 上行网状激活系统
- C、 桥脑基底节病变
- D、 广泛大脑皮质层

答案： C

186、与深感觉传导有关的结构是：()
(1.5)

- A、 楔束
- B、 锥体束
- C、 脊髓丘脑束
- D、 内侧纵束

答案： A

187、舌前 2/3 的味觉由舌咽神经支配。
(1.0)

答案： 错误

188、下列哪项属锥体束征

- A、 Kernig 征
- B、 Babinski 征
- C、 Romberg 征
- D、 Brudzinski 征
- E、 Lasegue 征

答案： B

189、三叉神经痛的扳机点常常存在于

- A、 鼻根、面颊部
- B、 颞部和下颌
- C、 耳前近颞颌关节处
- D、 眼角和眉间
- E、 口角、鼻翼近颊部

答案： E

190、帕金森病起病时,肢体累及方式常见为

- A、 一侧上、下肢先累及
- B、 双侧上肢先累及
- C、 左上肢、右下肢先累及
- D、 右上肢、左下肢先累及
- E、 双下肢先累及

答案： A

191、尽管 Parkinson 病是由于多巴胺缺乏所致,治疗用 L-dopa 而不是多巴胺的原因是

- A、 L-dopa 较多巴胺会产生较少的恶心、呕吐
- B、 多巴胺在胃肠道容易代谢成无效成分
- C、 L-dopa 更易于在胃肠道吸收
- D、 多巴胺不能穿过血脑屏障,对中枢神经系统没有治疗效果
- E、 L-dopa 较多巴胺在受体部位的效率更高

答案： D

192、下运动神经元性瘫痪肢体可出现的表现之一是

- A、 神经传导速度异常,失神经电位
- B、 腱反射亢进
- C、 Babinski 征阳性
- D、 无肌肉萎缩
- E、 肌张力增高

答案： A

193、脑梗死发生后,普遍认为 rt-PA(阿替谱酶)治疗时间窗是

- A、 2 小时内
- B、 3 小时内
- C、 4.5 小时内
- D、 12 小时内
- E、 24 小时内

答案： C

194、关于周围性面瘫,下列哪项不正确

- A、 同侧闭目无力

- B、 同侧鼻唇沟浅
- C、 同侧额纹消失
- D、 同侧 Bell 现象阳性
- E、 张口时口角歪向同侧

答案： E

195、同向性偏盲不见于

- A、 视束损害
- B、 外侧膝状体损害
- C、 视放射病变
- D、 视皮质病变
- E、 视神经损害

答案： E

196、男性, 62 岁, 双手相继出现震颤 8 个月, 如“搓丸样”, 走路慌张步态, 面无表情。该患者双上肢肌张力特点最可能是

- A、 交替样增强
- B、 混合样增强
- C、 折刀样增强
- D、 齿轮样增强
- E、 肌张力减弱

答案： D

197、原发性三叉神经痛有哪种表现

- A、 面部感觉消失
- B、 角膜反射消失
- C、 张口下颌偏斜
- D、 下颌反射减弱
- E、 以上均没有

答案： E

198、意识清楚的患者对别人和自己说的话不理解, 但能流畅地讲话, 错语(错词)很多, 然而常答非所问, 复述和听写能力受损, 这种失语称为

- A、 Broca 失语

- B、 Wernicke 失语
- C、 传导性失语
- D、 命名性失语
- E、 经皮质失语

答案： B

199、前角型瘫痪表现不正确的为

- A、 常伴有感觉障碍
- B、 肌肉萎缩
- C、 肌张力低下
- D、 有肌纤维颤动
- E、 节段性瘫痪

答案： A

200、一侧瞳孔散大,直接和间接光反射消失,对侧间接光反射正常,病损位于

- A、 同侧视神经
- B、 对侧视神经
- C、 同侧动眼神经
- D、 对侧动眼神经
- E、 同侧视神经及动眼神经

答案： C

201、垂体瘤导致的视野障碍最常见的是

- A、 双鼻侧偏盲
- B、 双颞侧偏盲
- C、 双眼同向偏盲
- D、 象限盲
- E、 单眼偏盲

答案： B

202、癫痫持续状态,一般所说指的是

- A、 精神运动性发作数
- B、 一侧肢体抽搐不止

- C、阵挛发作一处开始逐渐扩散
- D、大发作频繁,间期意识持续丧失

答案: D

203、诊断癫痫主要依据

- A、可靠的病史
- B、神经系统检查
- C、脑脊液检查
- D、脑电图检查

答案: A

204、患者,男性,42岁,反复全身抽搐2小时,昏迷,心肺正常。首要处理

- A、立即行颅脑CT
- B、腰椎穿刺,化验脑脊液
- C、降颅压
- D、立即静脉注射地西洋

答案: D

205、多发性硬化是一种什么疾病

- A、螺旋体感染病
- B、脱髓鞘疾病
- C、维生素B12缺乏病
- D、脂类代谢病

答案: B

206、闭锁综合征系病变累及

- A、边缘系统
- B、上行网状激活系统
- C、桥脑基底部病变
- D、广泛大脑皮质层

答案: C

207、与深感觉传导有关的结构是

- A、楔束

- B、 锥体束
- C、 脊髓丘脑束
- D、 内侧纵束

答案： A

208、纯感觉性卒中病变主要位于() (2.0)

- A、 脑干
- B、 对侧丘脑腹后外侧核
- C、 基底节
- D、 小脑
- E、 大脑半球深部白质

答案： B

209、急性播散性脑脊髓炎的主要治疗:() (2.0)

- A、 抗炎
- B、 抗病毒
- C、 糖皮质激素
- D、 免疫球蛋白

答案： C

210、运动神经元病中,脑干的运动神经核一般不受累及的是(2.0)

- A、 舌下神经核
- B、 动眼神经核
- C、 面神经核
- D、 疑核

答案： B

211、特发性面神经麻痹致味觉消失的范围为() (2.0)

- A、 舌前 1/3
- B、 舌前 2/3
- C、 舌后 1/3
- D、 舌后 2/3
- E、 舌前 1/2

答案： B

212、最常见的偏头痛类型是() (2.0)

- A、 有先兆偏头痛
- B、 无先兆偏头痛
- C、 偏瘫型偏头痛
- D、 基底型偏头痛
- E、 视网膜性偏头痛

答案： B

213、下列哪种说法是错误的: (2.0)

- A、 PM 和 DM 发病与细胞和体液免疫异常有关
- B、 PM 病变仅限于骨骼肌
- C、 DM 病变仅限于骨骼肌
- D、 DM 和 PM 的发生可能与病毒感染有关
- E、 PM 和 DM 激素治疗效果不好

答案： C

214、以下关于药物过度使用性头痛错误的是: (2.0)

- A、 依赖撤药才能做出诊断。
- B、 与每月应用药物的天数有关系,与每天应用的药物剂量无关系。
- C、 头痛的特点与程度不在诊断标准之内。
- D、 鼓励撤药,做为治疗的第一步。

答案： A

215、关于视神经脊髓炎(NMO)的预后叙述正确的是() (2.0)

- A、 因仅影响视神经和脊髓,总体预后较 MS 要好
- B、 复发型 NMO 多较单相病程 NMO 预后更差
- C、 单相病程者多因一连串的发作而加剧,而复发型 NMO 多进展缓慢,少有发生全盲或完全性截瘫者
- D、 同 MS 相似,约有 1/3 的 NMO 患者死于呼吸衰竭
- E、 多数 NMO 呈复发-缓解病程,预后视神经炎和脊髓炎之间存在差异

答案： B

216、下列关于去大脑强直的临床表现描述错误的是() (2.0)

- A、角弓反张
- B、.病理征阳性
- C、.双侧瞳孔散大固定
- D、睁眼昏迷
- E、.病变可位于中脑水平

答案： D

217、脊髓压迫症首选内科治疗药物:(2.0)

- A、.呋塞米
- B、苯巴比妥
- C、卡马西平
- D、吗啡
- E、.地塞米松

答案： E

218、红斑性肢痛症临床表现中的四大症状是() (2.0)

- A、肿、痛、破、溃
- B、感染、坏疽、痛、热
- C、红、肿、痛、热
- D、凉、痛、肿、热
- E、热、破、溃、痛

答案： C

219、下列关于PM及DM的哪些说法是正确的(2.0)

- A、儿童预后差
- B、伴肿瘤的老年患者预后差
- C、PM患者中极少数可基本痊愈
- D、免疫抑制剂为多发性肌炎的首选药物
- E、免疫球蛋白为多发性肌炎的首选药物

答案： B

220、下运动神经元瘫痪的特点是() (2.0)

- A、 迟缓性瘫痪
- B、 肌张力增高
- C、 出现病理反射
- D、 腱反射亢进
- E、 不伴肌萎缩

答案： A

221、下列哪项最能提示可能是脑桥中央髓鞘溶解症(2.0)

- A、 . 成年人突然发生的意识障碍
- B、 . 脑干听觉诱发电位(BAEP)异常
- C、 . 不完全闭锁综合征
- D、 . MRI 发现脑桥基底部蝙蝠翅膀样边界清楚的脱髓鞘病灶
- E、 . 脑梗死后出现咀嚼、吞咽及言语障碍

答案： D

222、脑神经共有 12 对。

答案： 正确

223、脑干损伤可出现典型的“三偏”征。

答案： 错误

224、脑膜刺激征是脑出血的典型表现。

答案： 错误

225、CT 是确诊癫痫的首要检查方法。

答案： 错误

226、高血压是最重要的和独立的脑卒中的危险因素。

答案： 正确

227、脊髓颈膨大横贯性损伤,双上肢表现为上运动神经元瘫痪。

答案： 错误

228、治疗癫痫持续状态首选的药物是安定静脉注射。

答案： 正确

229、脑梗死最常见的病因是脑动脉硬化

答案： 正确

230、舌前 2/3 的味觉由舌咽神经支配。

答案： 错误

231、青年男性,发作性头痛,有视觉先兆,伴有恶心呕吐,服用麦角胺有效,查体无阳性体征,最可能的诊断是紧张性头痛。

答案： 错误

232、单纯部分性感觉发作继发全面性发作常常为枕叶癫痫。

答案： 错误

233、短暂性脑缺血发作持续时间不超过 12 小时

答案： 错误

234、脑桥中央髓鞘溶解症的可能发病因素包括酒精中毒晚期、甘露醇脱水治疗、肾衰透析后、肝功能衰竭、肝移植后、癌症晚期、营养不良和严重烧伤等。

答案： 错误

235、弥漫性硬化一般认为属于自身免疫性疾病。

答案： 正确

236、深感觉的感觉中枢在中央后回。

答案： 正确

237、线粒体肌病及线粒体脑肌病可出现低乳酸血症

答案： 错误

238、SPECT 和 PET 能从不同的角度反映脑局部代谢变化,辅助癫痫灶的定位。

答案： 正确

239、同心圆硬化病程呈现脑白质脱髓鞘疾病,即病灶内髓鞘脱失带与髓鞘保存带呈同心圆层状交互排列,行成树木年轮状改变。

答案： 正确

240、三叉神经痛患者轻触口角,颊部时诱发疼痛,此处称为触发点。

答案： 正确

241、下列有关 Alzheimer 病认知功能障碍的叙述不正确的是()

A、 .缓慢、进行性加重

- B、 在神志不清的基础上不断发展
- C、 可出现全面的智力减退
- D、 . 计算力受损失十分常见
- E、 可出现阅读、书写困难

答案： B

242、阿尔茨海默病的主要临床症状不包括以下哪类()

- A、 性欲降低
- B、 认知障碍
- C、 日常生活能力下降
- D、 精神行为

答案： A

243、下列哪项不是偏头痛的预防性治疗药物?()

- A、 麦角类制剂
- B、 β 肾上腺素受体阻滞剂
- C、 钙离子拮抗剂
- D、 抗癫痫药
- E、 5-HT 受体拮抗剂

答案： A

244、下列哪项不属于特发性面神经麻痹的临床表现：

- A、 病变侧额纹消失
- B、 病变侧巩膜征阳性
- C、 病变侧眼球外展不能
- D、 病变侧舌前 2/3 味觉缺失
- E、 病变侧鼓腮不能

答案： C

245、低颅压性头痛的颅内压必须低于()

- A、 60mmH₂O
- B、 70mmH₂O
- C、 80mmH₂O

- D、 90mmH₂O
- E、 100mmH₂O

答案： A

246、进行性肌营养不良临床特点是：()

- A、 四肢近端无力,心电图示 U 波
- B、 四肢无力,脑脊液蛋白细胞分离
- C、 四肢近端无力,腓肠肌肥大
- D、 四肢近端无力,疼痛,压痛
- E、 四肢远端无力,远端感觉障碍

答案： C

247、关于脑底异常血管网病,不正确的是()

- A、 多见于儿童及青壮年
- B、 儿童患者以出血性卒中为主
- C、 儿童患者以缺血性卒中及反复发生的 TIA 为主
- D、 TIA 发作可表现为双侧肢体交替出现的轻偏瘫
- E、 部分病例可表现为反复晕厥

答案： C

248、关于传导性失语特点不正确的是：

- A、 病变位于优势半球额中回后部
- B、 病变位于优势半球缘上回皮质或白质
- C、 听理解正常
- D、 自发语言正常
- E、 自发讲话能说出的词语不能复述

答案： A

249、脑死亡的确定标准不包括下列哪项()

- A、 . 患者对任何外界刺激均无反应
- B、 . 脊髓反射消失
- C、 . 脑干反射消失
- D、 . 脑电活动消失

E、 .无脑血流灌注现象

答案： B

250、以下动脉狭窄不能引起脑动脉盗血综合征的是：()

A、 一侧锁骨下动脉近心端发出椎动脉前

B、 一侧无名动脉近心端发出椎动脉前

C、 一侧颈内动脉闭塞

D、 基底动脉明显狭窄

E、 一侧大脑中动脉 M1 段狭窄

答案： E

251、选择:重症肌无力的下列哪项表述是错误的：

A、 是一种获得性自身免疫性疾病

B、 以部分或全身性骨骼肌疲劳为临床特征

C、 症状晨轻暮重或活动后加重、休息后减轻

D、 抗胆碱酯酶药物治疗有效

E、 腾喜龙试验阴性

答案： E

252、20 岁女患,发作性抽搐 2 个月。发作时意识清楚,抽搐从一侧手指开始,向腕部、前臂、肘部、肩部及口角面部逐渐发展。这种癫痫发作形式最可能是：()

A、 部分感觉性发作

B、 复杂部分性发作

C、 Jackson 发作

D、 自主神经性发作

E、 自动症

答案： C

253、癫痫病人禁用的药物是

A、 尼可刹米

B、 二甲弗林

C、 哌醋甲酯

D、 甲氯芬酯

E、 以上均不是

答案： C

254、根据简易精神状态量表,当得分()分时,诊断为重度痴呆:

- A、 15~20
- B、 10~20
- C、 <10
- D、 21~25

答案： C

255、紧张型头痛伴随的常见症状有()

- A、 焦虑
- B、 呕吐
- C、 类 Horner 征
- D、 畏光
- E、 畏声

答案： A

256、有关 Lennox-Gastaut 综合征的说法错误的是()

- A、 多种发作类型共存
- B、 精神发育正常
- C、 好发于 1-8 岁,少数出现在青春期
- D、 易出现癫痫持续状态
- E、 预后不良

答案： B

257、丛集性头痛的发作持续时间()

- A、 .15 分钟-3 小时
- B、 2-4 小时
- C、 4-72 小时
- D、 .72 小时
- E、 大于 72 小时

答案： A

258、关于帕金森病运动减少下列哪项说法不正确()

- A、 .始动困难
- B、 .随意运动缓慢
- C、 精细动作尚可
- D、 联带运动减少

答案： C

259、在椎一基底动脉血栓形成的病例中,下列临床表现不正确的是()

- A、 眩晕
- B、 眼球运动障碍
- C、 吞咽困难
- D、 失语
- E、 交叉性瘫痪

答案： D

260、哪种病不属于运动神经元病

- A、 脊肌萎缩症
- B、 进行性肌萎缩
- C、 原发性侧索硬化
- D、 进行性延髓麻痹

答案： A

261、单纯疱疹病毒脑炎的病灶部位是() (2.0)

- A、 颞叶、额叶最常受累
- B、 脑干为重
- C、 枕叶明显
- D、 上述均是

答案： A

262、下列选项中哪项不是意识障碍() (2.0)

- A、 闭锁综合征
- B、 .昏迷
- C、 .植物状态
- D、 去皮质综合征

E、 谵妄

答案： A

263、不属于 CADASIL 临床特点的是：() (2.0)

A、 伴皮质下梗死

B、 白质脑病

C、 常染色体阴性遗传

D、 可办偏头痛症状

E、 晚期出现痴呆

答案： C

264、以下关于药物过度使用性头痛错误的是：(2.0)

A、 MOH 的患病率约为 1%~2%。

B、 女男比为 3~4:1。

C、 MOH 常见于青少年人,中年和老人少见。

D、 危险因素:女性、精神心理共患病(抑郁与焦虑)、社会经济状况低、肥胖等。

答案： C

265、女患,22岁,反复出现左眼闪光、视物模糊,约20分钟后出现左额颞部剧烈疼痛,难以忍受,伴恶心、呕吐,畏光、畏声。以往头痛发作时口服布洛芬效果不明显。为终止头痛急性发作,则应选用的治疗药物是() (2.0)

A、 萘替生

B、 哌替啶

C、 麦角胺

D、 氟桂利嗪

E、 阿米替林

答案： C

266、血管闭塞后患者出现偏瘫、偏身感觉障碍及偏盲的动脉为() (2.0)

A、 大脑前动脉主干

B、 大脑中动脉主干

C、 大脑后动脉主干

D、 内听动脉

E、 格基底动脉

答案： B

267、Wernicke 失语 :(2.0)

- A、 优势侧顶叶角回损害
- B、 优势侧颞中回后部病变
- C、 优势侧颞上回后部病变
- D、 优势侧额下回病变
- E、 双侧脑桥基底部病变

答案： C

268、下列关于新型隐球菌脑膜炎不正确的是() (2.0)

- A、 发病率低、病情重
- B、 隐球菌为条件致病菌
- C、 脑脊液细胞、蛋白轻中度升高,糖氯正常
- D、 常用颅内压增高临床表现

答案： C

269、进行性肌营养不良的特异治疗是:() (2.0)

- A、 加兰他敏与三磷腺苷
- B、 多种氨基酸与蛋白质合并激素
- C、 肾上腺皮质激素
- D、 胆碱酯酶抑制剂
- E、 以上都不是

答案： E

270、男性患者,27岁,2年来时有发作性意识丧失,四肢抽搐,当日凌晨,发作后意识一直未恢复,来院后又有一次四肢抽搐发作,该患者所患病情属() (2.0)

- A、 强直性大发作
- B、 肌阵挛性大发作
- C、 癫痫持续状态
- D、 癫痫强直-阵挛发作
- E、 单纯部分发作继全面性发作

答案： C

271、下面哪项不属于上运动神经元系统() (2.0)

- A、 大锥体细胞
- B、 皮质脊髓束
- C、 皮质脑干束
- D、 脊髓前角细胞
- E、 大锥体细胞发出的神经轴突

答案： D

272、男, 18 岁。四肢无力 3 天, 大小便正常。病前 1 周有“上感”史。查体: 双眼闭合无力, 双侧咽反射迟钝, 四肢肌力 1~2 级, 肌张力低, 腱反射消失, 无明显感觉障碍。最可能的诊断是: ()

- A、 多发性肌炎
- B、 重症肌无力
- C、 吉兰-巴雷综合征
- D、 周期性瘫痪
- E、 急性脊髓炎

答案： C

273、West 综合症的脑电图表现为()

- A、 棘-慢复合波和睡眠中 10Hz 的快节律。
- B、 . 高度节律失调。
- C、 一侧或双侧枕区阵发性高波幅棘-慢波或尖波, 呈反复节律性发放
- D、 中央-颞区高波幅棘-慢波
- E、 双侧对称 3Hz 棘-慢综合波。

答案： B

274、癫痫大发作首选

- A、 苯妥英钠
- B、 乙琥胺
- C、 丙戊酸钠
- D、 地西洋
- E、 硝西洋

答案： A

275、脑血栓形成的最常见病因是()

- A、 高血压
- B、 脑动脉粥样硬化
- C、 各种脑动脉炎
- D、 血压偏低
- E、 红细胞增多症

答案： B

276、肌炎的特异性抗体是

- A、 Hu
- B、 抗核抗体
- C、 抗肌球蛋白抗体
- D、 抗中性粒细胞浆抗体
- E、 Jo-1, PL-7

答案： E

277、下列哪项不是原发性三叉神经痛的特点：

- A、 局部可见疱疹分布
- B、 仅集中在三叉神经分布区
- C、 短暂性并反复发作
- D、 女性多于男性
- E、 疼痛剧烈

答案： A

278、低钠血症如快速纠正可诱发以下哪种疾病

- A、 同心圆硬化
- B、 多发性硬化
- C、 病毒性脑膜炎
- D、 脑桥中央髓鞘溶解症
- E、 急性播散性脑脊髓炎

答案： D

279、关于髓内病变描述正确的是

- A、痛温觉障碍自下而上发展,尾侧重,早期出现括约肌功能障碍
- B、痛温觉障碍自下而上发展,头侧重,晚期出现括约肌功能障碍
- C、痛温觉障碍自上而下发展,尾侧重,晚期出现括约肌功能障碍
- D、痛温觉障碍自上而下发展,头侧重,早期出现括约肌功能障碍
- E、痛温觉障碍自上而下发展,头侧重,晚期出现括约肌功能障碍

答案: D

280、运动神经元病一般没有哪种表现

- A、肌萎缩
- B、锥体束征
- C、延髓麻痹
- D、感觉障碍

答案: D

281、关于交叉瘫描述正确的是()

- A、病变侧肢体中枢性瘫痪,对侧感觉障碍
- B、病变侧颅神经上运动神经元性瘫痪,对侧肢体下运动神经元性瘫痪
- C、病变侧颅神经下运动神经元性瘫痪,对侧肢体上运动神经元性瘫痪
- D、病变侧周围性面瘫,病变对侧肢体下运动神经元性瘫痪
- E、病变侧感觉障碍,病变对侧肢体下运动神经元性瘫痪

答案: C

282、高血压脑出血最常见的部位是()

- A、豆状核和丘脑
- B、内囊和基底节
- C、蛛网膜下腔
- D、侧脑室
- E、大脑髓质

答案: B

283、以下关于线粒体肌病及线粒体脑肌病描述错误的是()

- A、由于 ATP 合成不足造成
- B、由于 ATP 合成过多造成

- C、 可累及骨骼肌
- D、 可累及中枢神经系统
- E、 遗传方式为母系遗传

答案： B

284、紧张型头痛的性质为()

- A、 刺痛
- B、 钻痛
- C、 炸裂样疼痛
- D、 紧箍样胀痛
- E、 波动性疼痛

答案： D

285、老年期最常见的痴呆类型是()

- A、 帕金森病痴呆
- B、 血管性痴呆
- C、 阿尔茨海默病
- D、 额颞叶痴呆
- E、 亨廷顿病

答案： C

286、继发性红斑性肢痛症常由下面哪种疾病引起()

- A、 雷诺病
- B、 糖尿病
- C、 甲状腺功能亢进
- D、 真性红细胞增多症
- E、 皮炎

答案： D

287、化脓性脑膜炎的描述下列哪项是正确的()

- A、 起病急,可表现为头痛、发热、呕吐等。颈部强直及克氏征阳性是诊断的重要依据
- B、 多为急性或亚急性起病,有上呼吸道或肠道感染史,脑脊液中白细胞和蛋白轻度升高,糖和氯化物正常

- C、 隐袭起病,前驱期以情感症状为主
- D、 病程缓慢发展,早期多表现为记忆障碍和人格改变

答案: A

288、化脓性脑膜炎最常见的致病菌有()

- A、 大肠埃希菌
- B、 脑膜炎双球菌
- C、 肺炎克雷伯杆菌
- D、 链球菌

答案: B

289、Alzheimer 病早期时,常常出现一系列临床表现,其中哪种说法不对()

- A、 爱忘事,如忘记电话号码或关煤气
- B、 社交礼仪通常保持良好
- C、 头痛、恶心、呕吐
- D、 腰穿检查脑脊液常规和生化正常
- E、 非找词和找名字困难

答案: C

290、与进行性肌营养不良发病相关的蛋白是:()

- A、 抗肌萎缩蛋白
- B、 肌球蛋白
- C、 肌动蛋白
- D、 肌钙蛋白
- E、 原肌球蛋白

答案: A

291、下列哪项不属于帕金森病的特有表现()

- A、 搓丸样动作
- B、 . 齿轮样强直
- C、 写字过小症
- D、 跨阈步态

答案: D

292、在有先兆的偏头痛中,下列哪种类型的先兆最为常见() (2.0)

- A、 听觉先兆
- B、 视觉先兆
- C、 嗅觉先兆
- D、 烦躁
- E、 偏侧肢体感觉或运动障碍

答案: B

293、女性,23岁,工作压力大,长期头痛,全头胀痛紧缩感,按住后可缓解,不伴恶心呕吐,可以坚持日常工作,每日均有发作,但各项检查未见异常。该患者最有可能的诊断是() (2.0)

- A、 . 颅内感染
- B、 . 颅内占位
- C、 紧张型头痛
- D、 抑郁症
- E、 偏头痛

答案: C

294、关于脑桥中央髓鞘溶解症不正确的描述是() (2.0)

- A、 . 是以脑桥基底部分称性脱髓鞘为病理特征的可致死性疾病
- B、 . 多在电解质紊乱、营养不良的疾病基础上发生
- C、 . 常在原发病基础上突发四肢弛缓性瘫,言语障碍,眼震,咀嚼和吞咽障碍
- D、 . 应与脑桥基底部分梗死、肿瘤和多发性硬化等鉴别
- E、 . 多数患者预后好

答案: E