

精神病学-题库

1、精神疾病的共同特点是

- A、 幻觉
- B、 妄想
- C、 人格障碍
- D、 无自知力
- E、 心理活动异常

答案： E

2、谵妄状态时幻视觉的特点是

- A、 形象不鲜明
- B、 多为单调的光、色等
- C、 常具有恐怖性质
- D、 往往不产生紧张和恐惧的情绪反应
- E、 常伴有协调性精神运动性兴奋

答案： C

3、假性痴呆

- A、 由大脑弥散性损害引起
- B、 由大脑局部性损害引起
- C、 由小脑弥漫性损害引起
- D、 由小脑局部性损害引起
- E、 脑组织结构无任何器质性损害

答案： E

4、语词新作多见于

- A、 精神分裂症
- B、 躁狂发作
- C、 抑郁发作
- D、 强迫障碍
- E、 痴呆

答案： A

5、医生如询问患者“同学和邻居对他态度怎么样,是否有故意刁难、非议他的人,群众、报纸、广播、电视有无含沙射影的讲他,是否他的一举一动受到某些人的特别注意”等问题。其目的是检查

- A、 幻觉
- B、 牵连观念与被害妄想
- C、 思维破裂
- D、 情绪异常
- E、 认知功能损害

答案： B

6、目前精神障碍分类的原则主要依据

- A、 病因
- B、 病理解剖
- C、 症状表现
- D、 处理手段
- E、 病程预后

答案： C

7、库欣综合征患者往往合并精神症状,以下哪项一般不会出现

- A、 认知障碍
- B、 幻觉、妄想
- C、 人格解体
- D、 抑郁状态
- E、 典型的愉悦心境

答案： E

8、血管性痴呆的特征是

- A、 早期全面性智能损害
- B、 常伴错觉
- C、 有阶段性波动,智能呈“岛状”损害
- D、 早期人格明显改变
- E、 白天精神障碍加重

答案： C

9、老年性痴呆的病理学特征性诊断依据是

- A、 脑神经细胞减少
- B、 脑神经细胞缩小
- C、 老年斑
- D、 染色体溶解
- E、 胶质细胞增生

答案： C

10、海洛因戒断反应一般持续多久

- A、 24~48 小时
- B、 3~4 天
- C、 7~10 天
- D、 15~20 天
- E、 1 个月

答案： C

11、关于精神分裂症单纯型的特征, 以下何种说法不正确

- A、 多在青少年期发病
- B、 病程进展缓慢
- C、 社会退缩行为
- D、 幻觉妄想较为明显
- E、 预后较差

答案： D

12、关于分离转换性障碍, 以下哪种说法错误

- A、 女性多见
- B、 首发年龄多为 20~30 岁
- C、 主要表现为分离和转换性症状
- D、 多数可在一年内自发缓解
- E、 长期结局不良

答案： E

13、疑病障碍的最基本治疗为

- A、 药物治疗
- B、 行为治疗
- C、 物理治疗
- D、 心理治疗
- E、 气功治疗

答案： D

14、 以下哪项不符合处于应激状态下个体的表现

- A、 体内神经递质发生改变
- B、 体内神经内分泌发生改变
- C、 体内免疫功能发生变化
- D、 可能导致脑功能损害
- E、 交感神经抑制, 副交感神经兴奋

答案： E

15、 下列关于自杀危险性评估的基本线索的说法中正确的是

- A、 不愿与别人讨论自杀问题, 有意掩盖自杀意愿是一个重要的危险信号
- B、 “丧失性事件” 常是自杀的诱发性事件, 在事件发生的晚期, 容易自杀
- C、 抑郁症患者在疾病的缓解期自杀风险较低
- D、 当患者采取自杀并没有真正解决其问题后, 再次自杀的危险性将会降低
- E、 多次自杀未遂者的自杀风险将会降低

答案： A

16、 随境转移主要见于()

- A、 精神分裂症
- B、 神经衰弱
- C、 疑病症
- D、 躁狂症
- E、 精神发育迟滞

答案： D

17、 下列关于孤独症智能的说法中, 哪项不对

- A、 仅极少数患者有智能损害
- B、 有特征性的智力损害模式
- C、 操作智商一般比言语智商好
- D、 通常机械记忆发育较好
- E、 最佳能力与最差能力之间差距很大

答案： A

18、精神发育迟滞的治疗原则是

- A、 药物治疗为主
- B、 教育和训练为主
- C、 行为治疗为主
- D、 增智药物使用为主
- E、 心理治疗为主

答案： B

19、下列哪项不属于思维形式障碍()

- A、 思维迟缓
- B、 思维散漫
- C、 病理性赘述
- D、 思维中断
- E、 牵连观念

答案： E

20、有关司法精神医学鉴定的叙述, 以下哪项不对

- A、 司法精神医学鉴定是受司法部门的委托
- B、 鉴定人应有丰富的临床精神病学知识、技术和经验
- C、 鉴定对象为涉及法律问题又患有或怀疑患有精神疾病者
- D、 根据被鉴定人的精神症状判断被鉴定人是否有罪
- E、 目的是维护精神病人的合法权益, 维护司法公正

答案： D

21、精神分裂症患者, 男, 25 岁。3 个月前开始感到同事在窃窃私语的议论他, 大街上不认识的人也用特殊眼光看他, 为此不敢出门。该表现属于

- A、 关系妄想

- B、 被害妄想
- C、 错觉
- D、 幻觉
- E、 恐惧

答案： A

22、患者女性, 20 岁, 大学生。家人诉患者近 3 年来逐渐变得少语少动, 孤僻离群, 对亲友冷淡, 个人卫生需督促, 有时发呆, 学习成绩明显下降, 对自己的前途无打算。未发现幻觉妄想。此病人最可能的诊断是

- A、 青春型精神分裂症
- B、 品行障碍
- C、 单纯型精神分裂症
- D、 抑郁症
- E、 人格障碍

答案： C

23、患者女性, 22 岁, 大学生。近 1 个月来出现入睡困难, 经常在早晨 4 点多就醒来, 醒后难以入睡。觉得自己比不上别人, 喜欢卧床, 不愿去教室, 说同学看不起她, 说同学经常在说话时暗暗地贬低她。交谈时低着头, 语音低, 流泪, 后悔自己不该来读大学而浪费了父母的钱。1 个月来体重至少下降了 3 千克。此病人目前最可能的诊断是

- A、 偏执型分裂症
- B、 恶劣心境障碍
- C、 抑郁症
- D、 神经衰弱
- E、 单纯型分裂症

答案： C

24、患者言语缓慢、语量减少, 语声甚低, 自觉脑子不灵了, 反应慢, 思考问题困难。该症状是

- A、 思维贫乏
- B、 思维迟缓
- C、 思维散漫
- D、 思维扩散
- E、 思维破裂

答案： B

25、男, 40 岁。反复检查门窗是否关好一年来诊。患者近半年上班总是迟到, 每于出门前担心门窗未锁好反复回去检查, 自感痛苦不已, 但又无法自控。该患者最可能的诊断是

- A、 强迫障碍
- B、 焦虑障碍
- C、 恐惧症
- D、 疑病症
- E、 急性应激反应

答案： A

26、女, 29 岁, 教师。因多次恋爱失败, 自卑感明显。近两年渐发展到不敢与异性目光接触, 有意躲避异性, 必须与异性接触时, 感到紧张, 出现心慌、头晕、出汗, 情绪不稳, 甚至面对男性学生仍出现类似情况, 严重影响工作和生活。该患者最可能的诊断为

- A、 精神分裂症
- B、 广泛性焦虑
- C、 社交焦虑障碍
- D、 抑郁症
- E、 惊恐障碍

答案： C

27、女, 54 岁。因阵发性紧张、上腹部不适、失眠 3 个月来诊, 怀疑自己患重病。患者丈夫半年前诊断为晚期肝癌。体格检查和各项辅助检查无异常。最可能的诊断是

- A、 急性应激障碍
- B、 惊恐障碍
- C、 精神分裂症
- D、 心境障碍
- E、 疑病症

答案： E

28、男, 32 岁。反复思考, 犹豫不决 3 年来诊。患者凡事爱钻牛角尖, 如想: “先有鸡还是先有蛋”, “为什么太阳从东边出来”, 小事情苦思冥想, 自觉无必要又停不下来, 因此烦躁不安, 不时胸闷心慌, 情绪低落, 高兴不起来。躯体检查无异常。最可能的诊断是

- A、 抑郁障碍
- B、 强迫障碍
- C、 广泛性焦虑障碍
- D、 神经衰弱
- E、 精神分裂症

答案： B

29、女性, 22 岁, 服务员。同男友交往 3 年, 对方提出分手, 出现情绪不稳, 失眠, 噩梦, 头昏痛。某晚半夜突然尖叫一声, 意识丧失, 四肢抽动, 小便失禁, 持续 2~3 分钟, 自行停止, 清醒后对发作过程不能回忆。最可能的诊断是

- A、 恐惧症
- B、 焦虑症
- C、 疑病症
- D、 分离(转换)性障碍
- E、 癫痫

答案： E

30、男性, 30 岁, 工程师。近两年怀疑自己患脑癌, 多次 CT、MRI 检查正常, 患者不信, 认为可能是早期, 机器检查不出来。该患者最可能是

- A、 恐惧症
- B、 焦虑症
- C、 疑病症
- D、 强迫症
- E、 适应障碍

答案： C

31、岁女孩。1 年前患者因舍友嘲笑自己体形较胖(66kg), 觉得被同学笑话了, 于是开始节食, 早餐一片面包, 午餐一份粥, 晚餐不进食, 开始还觉得饿, 后来自我感觉不饿并且厌恶食物的味道, 体重迅速下降至 25 kg, 被学校强令休学。患者已出现闭经, 身体无力, 潮热, 盗汗, 极少进食。被家人带来入院。既往健康, 无阳性家族史。采集病史时应特别注意询问

- A、 家族史
- B、 老师同学的观察
- C、 患者对体形的评价
- D、 生长发育史

E、 重大疾病史

答案： C

32、 岁女孩。1年前患者因舍友嘲笑自己体形较胖(66kg),觉得被同学笑话了,于是开始节食,早餐一片面包,午餐一份粥,晚餐不进食,开始还觉得饿,后来自我感觉不饿并且厌恶食物的味道,体重迅速下降至 25 kg,被学校强令休学。患者已出现闭经,身体无力,潮热,盗汗,极少进食。被家人带来入院。既往健康,无阳性家族史。进行精神检查时除要注意患者有无精神病性症状外,还要重点检查有

- A、 躁狂症状群
- B、 抑郁症状群
- C、 疑病症状
- D、 强迫症状
- E、 怪异行为

答案： B

33、 岁女孩。1年前患者因舍友嘲笑自己体形较胖(66kg),觉得被同学笑话了,于是开始节食,早餐一片面包,午餐一份粥,晚餐不进食,开始还觉得饿,后来自我感觉不饿并且厌恶食物的味道,体重迅速下降至 25 kg,被学校强令休学。患者已出现闭经,身体无力,潮热,盗汗,极少进食。被家人带来入院。既往健康,无阳性家族史。经询问患者现在仍觉得自己太胖了,需要减肥。有轻度抑郁情绪。重度贫血,盆腔结核,既往无结核病史,考虑该患者最可能是

- A、 结核
- B、 抑郁症
- C、 强迫症
- D、 神经性厌食症
- E、 神经性贪食症

答案： D

34、 岁女孩。1年前患者因舍友嘲笑自己体形较胖(66kg),觉得被同学笑话了,于是开始节食,早餐一片面包,午餐一份粥,晚餐不进食,开始还觉得饿,后来自我感觉不饿并且厌恶食物的味道,体重迅速下降至 25 kg,被学校强令休学。患者已出现闭经,身体无力,潮热,盗汗,极少进食。被家人带来入院。既往健康,无阳性家族史。此病人的治疗计划中,哪项不合适

- A、 强迫进食
- B、 纠正电解质紊乱
- C、 静脉补充营养

D、 认知疗法

E、 行为疗法

答案： A

35、 岁女孩。1年前患者因舍友嘲笑自己体形较胖(66kg),觉得被同学笑话了,于是开始节食,早餐一片面包,午餐一份粥,晚餐不进食,开始还觉得饿,后来自我感觉不饿并且厌恶食物的味道,体重迅速下降至 25 kg,被学校强令休学。患者已出现闭经,身体无力,潮热,盗汗,极少进食。被家人带来入院。既往健康,无阳性家族史。进行认知治疗时,除改变错误认知外,最好的措施是

A、 要求患者自觉按量进食

B、 固定进食量,如违反就惩罚

C、 为其制定进食计划,让其严格执行

D、 顺其自然

E、 共同制定进食计划,要求其执行,如目标达到,表扬或奖励

答案： E

36、 岁女孩。1年前患者因舍友嘲笑自己体形较胖(66kg),觉得被同学笑话了,于是开始节食,早餐一片面包,午餐一份粥,晚餐不进食,开始还觉得饿,后来自我感觉不饿并且厌恶食物的味道,体重迅速下降至 25 kg,被学校强令休学。患者已出现闭经,身体无力,潮热,盗汗,极少进食。被家人带来入院。既往健康,无阳性家族史。此病人的长期治疗计划中,哪项最重要

A、 抗结核治疗

B、 纠正电解质紊乱

C、 改善认知

D、 增加体重

E、 保持好心情

答案： C

解析： C

患者男,45岁。半年前因偶然一次失眠,后不断担心,继而形成习惯性失眠,查体无异常,精神科检查,神情憔悴,有轻度抑郁症状,无烦躁不安,无精神病性症状,余未见异常。实验室检查:脑MRI未见异常。既往健康,无阳性病史。此患者最可能的诊断是

A、 抑郁症

B、 躁狂发作

C、 精神分裂症

D、 失眠症

E、 强迫症 D

患者男,45岁。半年前因偶然一次失眠,后不断担心,继而形成习惯性失眠,查体

无异常,精神科检查,神情憔悴,有轻度抑郁症状,无烦躁不安,无精神病性症状,余未见异常。实验室检查:脑MRI未见异常。既往健康,无阳性病史。此患者目前最佳处理方案是

- A、继续观察
- B、氟西汀治疗
- C、氟西汀+认知疗法
- D、认知疗法
- E、镇静催眠药+认知疗法 E

女性病人,23岁。周末和男友驾车出游,途中遭遇车祸,双双被送进医院。其男友不治身亡,而病人本人受轻伤。正在给病人包扎伤口时,病人突然大哭大叫,扯掉绑带,赤脚往诊室外冲,口中不停喊叫,行为冲动,表情激动。此病人最可能的诊断是

- A、急性应激障碍
- B、创伤后应激障碍
- C、分离性障碍
- D、病理性激情发作
- E、躁狂状态 A

女性病人,23岁。周末和男友驾车出游,途中遭遇车祸,双双被送进医院。其男友不治身亡,而病人本人受轻伤。正在给病人包扎伤口时,病人突然大哭大叫,扯掉绑带,赤脚往诊室外冲,口中不停喊叫,行为冲动,表情激动。此病人目前的紧急处理措施是

- A、氯丙嗪
 - B、地西洋
 - C、支持性心理治疗
 - D、暗示治疗
 - E、碳酸锂治疗
- 治疗 B

37、每一精神症状均有明确定义,并具有以下特点

- A、症状的出现不受病人意识控制
- B、症状出现可受病人意识控制
- C、症状可以通过转移的方法使其消失
- D、症状内容与周围环境不相称
- E、症状给病人带来不同程度的功能损害

答案: ADE

38、偏执性精神障碍与偏执型精神分裂症的鉴别在于后者

- A、妄想不系统,易于泛化
- B、妄想内容荒谬,缺乏现实性
- C、常伴有幻觉

- D、 对药物治疗反应不佳
- E、 不出现人格衰退

答案： ABC

39、关于人格障碍的治疗, 以下说法哪些正确

- A、 抗精神药物可通过改变人格结构而起效
- B、 对有攻击行为的人格障碍者, 可以给予少量碳酸锂
- C、 总体而言, 人格障碍的治疗效果较好
- D、 治疗目的之一是帮助病人建立良好的行为模式, 纠正不良习惯
- E、 心理治疗和教育、训练有一定帮助

答案： BDE

40、抗精神病药物治疗期间常见的锥体外系不良反应是

- A、 急性肌张力障碍
- B、 静坐不能
- C、 类帕金森综合征
- D、 迟发性运动障碍
- E、 意识模糊

答案： ABCD

41、儿童孤独症患者可以有以下临床表现

- A、 言语发育和人际交往障碍
- B、 兴趣范围狭窄和行为方式刻板
- C、 不同程度的智力低下
- D、 感知觉障碍
- E、 抽动症状或癫痫发作

答案： ABCDE

42、患者男, 45 岁。半年前因偶然一次失眠, 后不断担心, 继而形成习惯性失眠, 查体无异常, 精神科检查, 神情憔悴, 有轻度抑郁症状, 无烦躁不安, 无精神病性症状, 余未见异常。实验室检查: 脑 MRI 未见异常。既往健康, 无阳性病史。此患者最可能的诊断是

- A、 抑郁症
- B、 躁狂发作

- C、精神分裂症
- D、失眠症
- E、强迫症

答案： D

43、患者男, 45 岁。半年前因偶然一次失眠, 后不断担心, 继而形成习惯性失眠, 查体无异常, 精神科检查, 神情憔悴, 有轻度抑郁症状, 无烦躁不安, 无精神病性症状, 余未见异常。实验室检查: 脑 MRI 未见异常。既往健康, 无阳性病史。此患者目前最佳处理方案是

- A、继续观察
- B、氟西汀治疗
- C、氟西汀+认知疗法
- D、认知疗法
- E、镇静催眠药+认知疗法

答案： E

44、女性病人, 23 岁。周末和男友驾车出游, 途中遭遇车祸, 双双被送进医院。其男友不治身亡, 而病人本人受轻伤。正在给病人包扎伤口时, 病人突然大哭大叫, 扯掉绑带, 赤脚往诊室外冲, 口中不停喊叫, 行为冲动, 表情激动。此病人最可能的诊断是

- A、急性应激障碍
- B、创伤后应激障碍
- C、分离性障碍
- D、病理性激情发作
- E、躁狂状态

答案： A

45、女性病人, 23 岁。周末和男友驾车出游, 途中遭遇车祸, 双双被送进医院。其男友不治身亡, 而病人本人受轻伤。正在给病人包扎伤口时, 病人突然大哭大叫, 扯掉绑带, 赤脚往诊室外冲, 口中不停喊叫, 行为冲动, 表情激动。此病人目前的紧急处理措施是

- A、氯丙嗪
- B、地西洋
- C、支持性心理治疗
- D、暗示治疗

E、 碳酸锂治疗
治疗

答案： B

46、某男, 42 岁, 司机。从小听话, 做事认真, 要求完美。自小家中经济条件不好, 但是喜欢“穷讲究”, 讲卫生, 衣服上有小点污迹就自觉不适, 非要洗干净或更换干净衣服才觉舒服。做事不放心, 高考时因对每一道题反复检查未能全部完成考题, 名落孙山。成为一名司机后认为工作与生命安全相关, 更加小心谨慎。每次出车前总是莫名其妙的紧张、担心, 具体不知道自己在担心什么。爱护车辆清洁, 有小点污点即反复冲洗。担心自己忘带相关证件每天反复检查, 即使明知带了仍忍不住要不停检查。有时看见人群在前方就担心自己会驾车把人群撞飞, 自知这种担心没有道理, 但控制不住担心, 从而感到非常痛苦。每次发动车之前必说三次“阿弥陀佛”, 否则下车重来。以上资料提示该患者可能存在哪些精神症状

- A、 焦虑症状
- B、 强迫怀疑
- C、 人格解体
- D、 强迫洗涤
- E、 强迫检查
- F、 强迫性仪式动作
- G、 强迫意向
- H、 强制性思维

答案： ABDEFG

47、某男, 42 岁, 司机。从小听话, 做事认真, 要求完美。自小家中经济条件不好, 但是喜欢“穷讲究”, 讲卫生, 衣服上有小点污迹就自觉不适, 非要洗干净或更换干净衣服才觉舒服。做事不放心, 高考时因对每一道题反复检查未能全部完成考题, 名落孙山。成为一名司机后认为工作与生命安全相关, 更加小心谨慎。每次出车前总是莫名其妙的紧张、担心, 具体不知道自己在担心什么。爱护车辆清洁, 有小点污点即反复冲洗。担心自己忘带相关证件每天反复检查, 即使明知带了仍忍不住要不停检查。有时看见人群在前方就担心自己会驾车把人群撞飞, 自知这种担心没有道理, 但控制不住担心, 从而感到非常痛苦。每次发动车之前必说三次“阿弥陀佛”, 否则下车重来。目前需要考虑的诊断有

- A、 强迫障碍
- B、 偏执性精神障碍
- C、 焦虑障碍
- D、 适应障碍
- E、 人格障碍

- F、 社交焦虑障碍
- G、 恐惧症
- H、 创伤后应激障碍

答案： AC

48、某男, 42 岁, 司机。从小听话, 做事认真, 要求完美。自小家中经济条件不好, 但是喜欢“穷讲究”, 讲卫生, 衣服上有小点污迹就自觉不适, 非要洗干净或更换干净衣服才觉舒服。做事不放心, 高考时因对每一道题反复检查未能全部完成考题, 名落孙山。成为一名司机后认为工作与生命安全相关, 更加小心谨慎。每次出车前总是莫名其妙的紧张、担心, 具体不知道自己在担心什么。爱护车辆清洁, 有小点污点即反复冲洗。担心自己忘带相关证件每天反复检查, 即使明知带了仍忍不住要不停检查。有时看见人群在前方就担心自己会驾车把人群撞飞, 自知这种担心没有道理, 但控制不住担心, 从而感到非常痛苦。每次发动车之前必说三次“阿弥陀佛”, 否则下车重来。诊断依据包括

- A、 自我强迫
- B、 自我反强迫
- C、 有自知力
- D、 有抑郁
- E、 伴有人格障碍
- F、 伴有冲动行为
- G、 有明确对象的恐惧
- H、 应激后起病

答案： ABC

49、某男, 42 岁, 司机。从小听话, 做事认真, 要求完美。自小家中经济条件不好, 但是喜欢“穷讲究”, 讲卫生, 衣服上有小点污迹就自觉不适, 非要洗干净或更换干净衣服才觉舒服。做事不放心, 高考时因对每一道题反复检查未能全部完成考题, 名落孙山。成为一名司机后认为工作与生命安全相关, 更加小心谨慎。每次出车前总是莫名其妙的紧张、担心, 具体不知道自己在担心什么。爱护车辆清洁, 有小点污点即反复冲洗。担心自己忘带相关证件每天反复检查, 即使明知带了仍忍不住要不停检查。有时看见人群在前方就担心自己会驾车把人群撞飞, 自知这种担心没有道理, 但控制不住担心, 从而感到非常痛苦。每次发动车之前必说三次“阿弥陀佛”, 否则下车重来。可以给患者的治疗包括

- A、 氯米帕明
- B、 行为治疗
- C、 奥氮平
- D、 利培酮

- E、阿普唑仑
- F、帕罗西汀
- G、ECT
- H、喹硫平

答案： ABEF

50、某男, 42 岁, 司机。从小听话, 做事认真, 要求完美。自小家中经济条件不好, 但是喜欢“穷讲究”, 讲卫生, 衣服上有小点污迹就自觉不适, 非要洗干净或更换干净衣服才觉舒服。做事不放心, 高考时因对每一道题反复检查未能全部完成考题, 名落孙山。成为一名司机后认为工作与生命安全相关, 更加小心谨慎。每次出车前总是莫名其妙的紧张、担心, 具体不知道自己在担心什么。爱护车辆清洁, 有小点污点即反复冲洗。担心自己忘带相关证件每天反复检查, 即使明知带了仍忍不住要不停检查。有时看见人群在前方就担心自己会驾车把人群撞飞, 自知这种担心没有道理, 但控制不住担心, 从而感到非常痛苦。每次发动车之前必说三次“阿弥陀佛”, 否则下车重来。经治疗 8 周, 患者情况有所改善, 但心慌、口干、视物模糊、嗜睡, 对药物不能耐受。

对此情况, 下一步的处理可考虑

- A、 停氯米帕明, 换阿米替林
- B、 降低氯米帕明剂量
- C、 手术治疗
- D、 加丙戊酸钠
- E、 ECT
- F、 逐减氯米帕明, 加用帕罗西汀
- G、 加用抗精神病药
- H、 换用 SSRI s

答案： BFH

51、二十一岁女孩。1 年前患者因舍友嘲笑自己体形较胖(66kg), 觉得被同学笑话了, 于是开始节食, 早餐一片面包, 午餐一份粥, 晚餐不进食, 开始还觉得饿, 后来自我感觉不饿并且厌恶食物的味道, 体重迅速下降至 25 kg, 被学校强令休学。患者已出现闭经, 身体无力, 潮热, 盗汗, 极少进食。被家人带来入院。既往健康, 无阳性家族史。采集病史时应特别注意询问

- A、 家族史
- B、 老师同学的观察
- C、 患者对体形的评价
- D、 生长发育史

E、 重大疾病史

答案： C

52、二十一岁女孩。1年前患者因舍友嘲笑自己体形较胖(66kg),觉得被同学笑话了,于是开始节食,早餐一片面包,午餐一份粥,晚餐不进食,开始还觉得饿,后来自我感觉不饿并且厌恶食物的味道,体重迅速下降至 25 kg,被学校强令休学。患者已出现闭经,身体无力,潮热,盗汗,极少进食。被家人带来入院。既往健康,无阳性家族史。进行精神检查时除要注意患者有无精神病性症状外,还要重点检查有

- A、 躁狂症状群
- B、 抑郁症状群
- C、 疑病症状
- D、 强迫症状
- E、 怪异行为

答案： B

53、二十一岁女孩。1年前患者因舍友嘲笑自己体形较胖(66kg),觉得被同学笑话了,于是开始节食,早餐一片面包,午餐一份粥,晚餐不进食,开始还觉得饿,后来自我感觉不饿并且厌恶食物的味道,体重迅速下降至 25 kg,被学校强令休学。患者已出现闭经,身体无力,潮热,盗汗,极少进食。被家人带来入院。既往健康,无阳性家族史。经询问患者现在仍觉得自己太胖了,需要减肥。有轻度抑郁情绪。重度贫血,盆腔结核,既往无结核病史,考虑该患者最可能是

- A、 结核
- B、 抑郁症
- C、 强迫症
- D、 神经性厌食症
- E、 神经性贪食症

答案： D

54、二十一岁女孩。1年前患者因舍友嘲笑自己体形较胖(66kg),觉得被同学笑话了,于是开始节食,早餐一片面包,午餐一份粥,晚餐不进食,开始还觉得饿,后来自我感觉不饿并且厌恶食物的味道,体重迅速下降至 25 kg,被学校强令休学。患者已出现闭经,身体无力,潮热,盗汗,极少进食。被家人带来入院。既往健康,无阳性家族史。此病人的治疗计划中,哪项不合适

- A、 强迫进食

- B、 纠正电解质紊乱
- C、 静脉补充营养
- D、 认知疗法
- E、 行为疗法

答案： A

55、二十一岁女孩。1年前患者因舍友嘲笑自己体形较胖(66kg),觉得被同学笑话了,于是开始节食,早餐一片面包,午餐一份粥,晚餐不进食,开始还觉得饿,后来自我感觉不饿并且厌恶食物的味道,体重迅速下降至 25 kg,被学校强令休学。患者已出现闭经,身体无力,潮热,盗汗,极少进食。被家人带来入院。既往健康,无阳性家族史。进行认知治疗时,除改变错误认知外,最好的措施是

- A、 要求患者自觉按量进食
- B、 固定进食量,如违反就惩罚
- C、 为其制定进食计划,让其严格执行
- D、 顺其自然
- E、 共同制定进食计划,要求其执行,如目标达到,表扬或奖励

答案： E

56、二十一岁女孩。1年前患者因舍友嘲笑自己体形较胖(66kg),觉得被同学笑话了,于是开始节食,早餐一片面包,午餐一份粥,晚餐不进食,开始还觉得饿,后来自我感觉不饿并且厌恶食物的味道,体重迅速下降至 25 kg,被学校强令休学。患者已出现闭经,身体无力,潮热,盗汗,极少进食。被家人带来入院。既往健康,无阳性家族史。此病人的长期治疗计划中,哪项最重要

- A、 抗结核治疗
- B、 纠正电解质紊乱
- C、 改善认知
- D、 增加体重
- E、 保持好心情

答案： C