

耳鼻咽喉头颈外科学

1、额窦的开口于（ ）

- A、 上鼻道
- B、 中鼻道
- C、 下鼻道
- D、 蝶筛隐窝
- E、 额骨鼻突

答案： D

2、“腺样体面容”描述错误的是（ ）

- A、 表情呆板
- B、 上颌骨变长
- C、 硬腭高拱
- D、 下切牙突出
- E、 牙列不齐

答案： D

3、中鼻甲的前部附着于（ ）

- A、 筛窦顶部
- B、 筛骨水平板
- C、 筛窦顶部与筛骨水平板交接处的前颅底骨
- D、 鼻腔外侧壁
- E、 鼻腔内侧壁

答案： C

4、区分前、后筛窦的解剖标志是（ ）

- A、 中鼻甲基板
- B、 中鼻甲附着处
- C、 下鼻甲附着处
- D、 筛前动脉

E、筛后动脉

答案： A

5、上颌窦后外壁的恶性肿瘤引起的张口困难的原因是（ ）

A、 肿瘤侵犯了颞颌关节

B、 肿瘤侵犯了翼内肌

C、 肿瘤侵犯了翼外肌

D、 肿瘤侵犯了咬肌

E、 肿瘤侵犯了下颌关节

答案： B

6、筛窦的说法,下列哪项是错的（ ）

A、 筛窦位于上颌骨额突内

B、 前组筛窦开口于中鼻道

C、 后组筛窦开口于上鼻道

D、 出生后1~2岁发育较快

答案： A

7、蝶窦囊肿的眶周出现皮肤感觉障碍,眼睑下垂,眼球固定,失明时应考虑是（ ）

A、 球后视神经炎

B、 眶尖综合征

C、 眶内蜂窝织炎

D、 海绵窦血栓性静脉炎

E、 面神经损坏

答案： B

8、耳声发射反映哪一部位的功能状态（ ）

A、 外耳道

B、 鼓膜

C、 听骨链

D、 耳蜗外毛细胞

E、 听神经

答案： D

9、一般不做活检的是（ ）

- A、 鼻咽癌
- B、 鼻咽淋巴肉瘤
- C、 鼻咽纤维血管瘤
- D、 原因不明的颈部淋巴结肿大
- E、 以上都不是

答案： C

10、乳突手术时确定鼓窦位置的重要标志是（ ）

- A、 道上三角区
- B、 道上棘
- C、 乳突切迹
- D、 鼓乳裂
- E、 鼓室盖

答案： A

11、鼓膜紧张部由内向外分哪三层（ ）

- A、 鳞状上皮层、肌层、内膜层
- B、 鳞状上皮层、纤维层、粘膜层
- C、 粘膜层、纤维层、鳞状上皮层
- D、 纤维层、粘膜层、鳞状上皮层
- E、 纤维层、肌层、内膜层

答案： C

12、幼儿中耳炎易致脑膜刺激症状,主要是何缝隙未闭合引起?（ ）

- A、 岩鳞裂
- B、 鼓鳞裂
- C、 鼓乳裂
- D、 岩鼓裂
- E、 鼓沟

答案： A

13、清理外耳道时引起咳嗽是由于刺激了（ ）

- A、 下颌神经耳颞支
- B、 迷走神经耳支
- C、 耳大神经
- D、 枕小神经
- E、 舌咽神经分支

答案： B

14、关于坏死性外耳道炎,下列哪项错误 ()

- A、 又称恶性外耳道炎
- B、 常继发于糖尿病
- C、 常引起颞骨骨髓炎和广泛进行性坏死
- D、 可并发多发性脑神经麻痹
- E、 致病菌多为金黄色葡萄球菌

答案： E

15、青年男性患者,上感后左耳剧痛伴左耳听力下降,电测听检查示左耳轻度传导性聋,左耳鼓膜红肿上有紫色血疱,外耳道皮肤充血,最可能的诊断是 ()

- A、 急性化脓性中耳炎
- B、 颈静脉球体瘤
- C、 大疱性鼓膜炎
- D、 中耳癌
- E、 急性分泌性中耳炎

答案： C

16、慢性化脓性中耳炎的病因,下列哪项不是 ()

- A、 急性化脓性中耳炎彻底治疗后
- B、 病人身体抵抗力差
- C、 感染病菌毒性过强
- D、 鼻腔、鼻窦、咽部存在慢性病灶
- E、 中耳系统内通风引流通道的病理阻塞

答案： A

17、急性化脓性中耳炎治疗不正确的是 ()

- A、 鼓膜穿孔前可用 2%酚甘油滴耳

- B、 鼓膜穿孔后局部可使用抗生素粉剂
- C、 鼓膜穿孔后可用抗生素水溶液滴耳
- D、 及早应用足量抗生素控制感染
- E、 脓液减少、炎症逐渐消退时可用乙醇制剂滴耳

答案： B

18、梅尼埃病的基本病理改变是（ ）

- A、 膜迷路纤维化
- B、 膜迷路充血
- C、 膜迷路积水
- D、 螺旋器退行性变
- E、 血管纹萎缩

答案： C

19、咽反射实现了咽的（ ）

- A、 呼吸功能
- B、 吞咽功能
- C、 言语形成功能
- D、 防御保护功能
- E、 免疫功能

答案： D

20、会厌和舌根之间为（ ）

- A、 梨状窝
- B、 会厌前间隙
- C、 杓会厌壁
- D、 会厌谷
- E、 环后隙

答案： B

21、前上型扁桃体周脓肿穿刺的部位正确的是（ ）

- A、 脓肿最隆起处
- B、 腭垂尖端与最后磨牙连线的中点

- C、 腭垂底与最后磨牙连线中点上 1cm
- D、 扁桃体上窝
- E、 腭舌弓上缘

答案： A

22、有关鼻咽癌的描述不相符的是（ ）

- A、 是我国的高发肿瘤之一
- B、 多见于 30~40 岁
- C、 男性发病率高于女性
- D、 EB 病毒在其发病中有重要作用
- E、 鼻咽癌发病率有种族及家族聚集现象

答案： B

23、鼻腔后部及鼻咽部出血（ ）

- A、 后鼻孔填塞
- B、 切开引流, 不行鼻腔填塞
- C、 切开引流, 行鼻腔填塞
- D、 前鼻孔填塞
- E、 前后鼻孔填塞

答案： E

24、关于鼻出血, 错误的是（ ）

- A、 血液病是鼻出血的一种病因
- B、 与鼻中隔偏曲无关
- C、 儿童、青少年多数发生在利特尔区
- D、 老年人鼻涕中带有血性分泌物应怀疑恶性肿瘤
- E、 年轻人鼻涕中带有血性分泌物可能是恶性肿瘤

答案： E

25、蜗窗膜又称（ ）

- A、 紧张部鼓膜
- B、 松弛部鼓膜
- C、 前庭膜

D、 蜗窗龕膜

E、 第二鼓膜

答案： E

26、 茎突和乳突之间的骨孔称为（ ）

A、 内耳道口

B、 茎乳孔

C、 鼓室小管开口

D、 外耳门

E、 乳突小管开口

答案： B

27、 关于砧骨豆状突叙述正确的是（ ）

A、 位于砧骨窝内

B、 参与形成锤砧关节

C、 参与形成砧镫关节

D、 为砧骨短脚末端的膨大

E、 位于砧骨体的前外方

答案： C

28、 颈动脉体瘤（ ）

A、 多由动脉硬化引起

B、 由动脉内膜病变引起

C、 多由创伤引起

D、 由颈总动脉分叉处后方外膜的化学感受器发生病变所致

E、 由先天性动脉囊性中层坏死所致

答案： D

29、 外耳道疔描述有误的是（ ）

A、 又称局限性外耳道炎

B、 为外耳道软骨部毛囊感染

C、 脓肿成熟时, 红肿处变软, 顶部有黄色脓点

D、 脓液量少、 稠厚、 有黏液, 有时带血

E、 病原菌主要是葡萄球菌

答案： D

30、慢性化脓性中耳炎, 鼓膜穿孔位于前后皱襞及锤骨短突之上者称为 ()

A、 中央性穿孔

B、 紧张部穿孔

C、 边缘性穿孔

D、 松弛部穿孔

E、 上述都不是

答案： D

31、第 2 鳃裂瘻 ()

A、 瘻管穿越颈动脉分叉

B、 瘻管跨越颈动脉之前

C、 瘻管跨越颈动脉之后

D、 瘻管跨越颈内静脉之后

E、 瘻管跨越面神经

答案： A

32、引起传导性聋的先天性疾病不包括下列哪项 ()

A、 外耳道闭锁

B、 听骨链畸形

C、 前庭窗和蜗窗发育异常

D、 耳硬化

E、 鼓膜发育异常

答案： D

33、在临床上听到患者有吸气性喉喘鸣, 提示有 ()

A、 支气管哮喘

B、 喉炎

C、 喉阻塞

D、 肺气肿

E、 肺不张

答案： C

34、治疗慢性喉炎的首要治疗措施是（ ）

- A、 雾化吸入抗生素和糖皮质激素
- B、 寻找、去除病因
- C、 服用中药
- D、 二氧化碳激光手术
- E、 手术治疗

答案： B

35、环甲动脉的来源于（ ）

- A、 喉上动脉
- B、 甲状腺上动脉
- C、 甲状腺下动脉
- D、 喉中动脉
- E、 喉下动脉

答案： B

36、第二颈椎也叫（ ）

- A、 隆椎
- B、 枢椎
- C、 寰椎
- D、 龙椎
- E、 环椎

答案： B

37、甲状舌管瘻外瘻口位于（ ）

- A、 颈侧
- B、 颈后
- C、 锁骨上
- D、 颈前正中
- E、 颌下

答案： D

38、淋巴结结核应行（ ）

- A、 抗炎治疗
- B、 抗结核治疗
- C、 抗病毒治疗
- D、 手术治疗
- E、 免疫治疗

答案： B

39、夹层颈动脉瘤（ ）

- A、 多由动脉硬化引起
- B、 由动脉内膜病变引起
- C、 多由创伤引起
- D、 由颈总动脉分叉处后方外膜的化学感受器发生病变所致
- E、 由先天性动脉囊性中层坏死所致

答案： E

40、发生颈部淋巴结转移率最高的头颈恶性肿瘤为（ ）

- A、 喉癌
- B、 下咽癌
- C、 鼻咽癌
- D、 环后癌
- E、 扁桃体癌

答案： C

41、哪一型甲状腺癌常合并内分泌综合征（ ）

- A、 甲状腺髓样癌
- B、 甲状腺乳头状癌
- C、 甲状腺未分化癌
- D、 甲状腺滤泡状癌
- E、 甲状腺鳞癌

答案： A

42、下列可确诊支气管异物的是（ ）

- A、 X线片检查
- B、 CT扫描检查
- C、 支气管镜检查
- D、 病检
- E、 磁共振检查

答案： C

43、当外力从正面直接撞击颈部时,主要损伤 ()

- A、 颈椎
- B、 颈部大血管
- C、 食管
- D、 喉、气管、甲状腺
- E、 颈部神经

答案： D

44、扁桃体外侧相邻的肌肉为 ()

- A、 咽上缩肌
- B、 咽中缩肌
- C、 腭舌肌
- D、 腭咽肌
- E、 茎突咽肌

答案： A

45、蝶窦的开口在 ()

- A、 中鼻道
- B、 鼻咽腔
- C、 蝶筛隐窝
- D、 鼻顶部
- E、 鼻外部

答案： C

46、急性鼻炎可出现的并发症是 ()

- A、 鼻窦炎

- B、 急性中耳炎
- C、 急性咽喉炎
- D、 气管炎、支气管炎
- E、 以上都不对

答案： ABCD

47、关于耳蜗生理功能描述正确的是（ ）

- A、 传音功能和感音功能
- B、 传音功能是指声波振动从镫骨底板传递至整个耳蜗底周
- C、 基底膜的不同部位感受不同的声波频率
- D、 蜗底区域感受高频声,蜗顶区域感受低频声
- E、 耳蜗毛细胞具有感音功能

答案： ACDE

48、下列哪项符合慢性化脓性中耳炎骨疡型的临床特点（ ）

- A、 持续流脓,脓黏稠,常有臭味
- B、 脓内可混有血丝
- C、 鼓膜紧张部大穿孔或边缘性穿孔
- D、 鼓室内有肉芽或息肉生长
- E、 多有较重的神经性聋

答案： ABCD

49、对耳源性脑脓肿的脓肿处理主要有（ ）

- A、 穿刺抽脓
- B、 50%葡萄糖和 20%甘露醇交替静脉注射
- C、 脓肿切除
- D、 切开引流
- E、 应用糖皮质激素

答案： ACD

50、手术治疗耳源性脑脓肿正确的是（ ）

- A、 在严格消毒后经乳突术腔穿刺抽脓
- B、 穿刺时,针体一旦刺入颅内,针头不能再改变方向

- C、 如需改变针头方向,不必退出针体,可直接改变针头方向穿刺抽脓,
- D、 脓肿表浅,已形成硬脑膜脓痿者,可切开引流
- E、 脓肿包膜较厚,经反复穿刺无效,或多房性脓肿、多发性脓肿等,均应开颅摘除

答案: ABDE

51、慢性扁桃体炎可有隐窝口扩大或黄白色脓栓()

答案: 正确

52、音叉试验主要用于判断听力减退的程度()

答案: 错误

53、喉梗阻是呼气性呼吸困难()

答案: 错误

54、声门裂是喉腔最狭窄的部位()

答案: 正确

55、婴幼儿因咽鼓管长而细故较易患中耳炎()

答案: 错误

56、鼻尖部发生疔肿时疼痛的明显的原因是()

- A、 鼻尖部皮肤较厚
- B、 鼻尖部感觉神经比较敏感
- C、 鼻尖部皮肤与其下面的脂肪纤维组织及软骨膜连接紧密
- D、 鼻尖部皮肤汗腺较多
- E、 鼻尖部血管丰富

答案: C

57、半规管接受的适宜刺激是()

- A、 匀速旋转刺激
- B、 匀速直线运动刺激
- C、 变速旋转刺激
- D、 变速直线运动刺激
- E、 直线运动刺激

答案: C

58、梅尼埃病的临床特征不包括（ ）

- A、 发作性头晕
- B、 耳聋
- C、 耳鸣
- D、 耳胀满感
- E、 眩晕

答案： A

59、喉阻塞患者,若出现定向力丧失,心律失常等症状,其呼吸困难应属于（ ）

- A、 一度
- B、 二度
- C、 三度
- D、 四度

答案： D

60、除哪块肌外,其余均属舌骨上肌群（ ）

- A、 二腹肌
- B、 下颌舌骨肌
- C、 舌骨舌肌
- D、 颏舌骨肌
- E、 茎突舌骨肌

答案： C

61、颈内动脉在颈部的分支有（ ）

- A、 颞浅动脉
- B、 上颌动脉
- C、 甲状腺下动脉
- D、 无分支
- E、 面动脉

答案： D

62、在临床上听到患者有吸气性喉喘鸣,提示有（ ）

- A、 支气管哮喘

- B、 喉炎
- C、 喉阻塞
- D、 肺气肿
- E、 肺不张

答案： C

63、正常成人从上切牙到气管隆嵴的距离为（ ）

- A、 17~19cm
- B、 20~22cm
- C、 23~25cm
- D、 26~28cm
- E、 29~31cm

答案： C

64、诊断气管异物最主要依据是（ ）

- A、 异物吸入史
- B、 咳嗽
- C、 呼吸困难
- D、 听诊肺呼吸音减弱
- E、 X线肺部阴影

答案： A

65、不支配扁桃体神经的是（ ）

- A、 舌咽神经分支
- B、 迷走神经分支
- C、 舌下神经
- D、 上颌神经
- E、 交感神经

答案： C

66、鼻咽部淋巴引流至（ ）

- A、 颌下淋巴结
- B、 耳后淋巴结

- C、 下颌角淋巴结
- D、 颈深上淋巴结
- E、 颈深下淋巴结

答案： D

67、对于慢性扁桃体炎反复急性发作,常用的有效的治疗方法是 ()

- A、 药物治疗
- B、 免疫疗法
- C、 物理疗法
- D、 激光治疗
- E、 手术治疗

答案： E

68、下列哪项符合慢性扁桃体炎的特征 ()

- A、 平时多无明显自觉症状,反复急性发作
- B、 经常有不明原因的低热
- C、 扁桃体隐窝口有角化物
- D、 单侧扁桃体肥大
- E、 咽痛,吞咽时明显

答案： A

69、对急性扁桃体炎引起的全身并发症不包括 ()

- A、 风湿热
- B、 急性关节炎
- C、 心肌炎
- D、 急性肾炎
- E、 急性中耳炎

答案： E

70、颈动脉体瘤 ()

- A、 多由动脉硬化引起
- B、 由动脉内膜病变引起
- C、 多由创伤引起

- D、 由颈总动脉分叉处后方外膜的化学感受器发生病变所致
- E、 由先天性动脉囊性中层坏死所致

答案： D

71、 母亲怀孕早期哪些因素与先天性非遗传性聋有关 ()

- A、 外伤
- B、 患风疹
- C、 营养不良
- D、 患流感
- E、 大量应用耳毒性药物

答案： BDE

72、 分别司声带外展与内收的肌肉是 ()

- A、 环杓后肌
- B、 环甲肌
- C、 环杓侧肌和杓肌
- D、 甲杓肌

答案： AC

73、 前组鼻窦包括 ()

- A、 上颌窦
- B、 额窦
- C、 前组筛窦
- D、 后组筛窦
- E、 蝶窦

答案： ABC

74、 耳廓外伤的正确处理方法是 ()

- A、 完全断离可及时将其浸泡于含有肝素的 0.9%氯化钠溶液中, 尽早对位缝合
- B、 皮肤及软骨同时小面积缺损, 可做边缘楔形切除再对位缝合
- C、 皮肤大块缺损而软骨完整, 可用耳后带蒂皮瓣或游离皮瓣修复
- D、 小血肿在严格无菌操作下抽出积血, 加压包扎 48 小时
- E、 血肿较大应手术切开, 清除积血和血凝块

答案： ABCDE

75、梅尼埃病的治疗原则是（ ）

- A、 调节植物神经功能
- B、 改善内耳微循环
- C、 解除迷路积水
- D、 抗感染治疗
- E、 长期、规范保守治疗无效者可考虑手术治疗

答案： ABCE

76、急性化脓性中耳炎感染途径是咽鼓管途径()

答案： 正确

77、急性鼻窦炎鼻窦区有压痛()

答案： 正确

78、喉癌颈部转移部位颈深淋巴结下群()

答案： 正确

79、鼻咽癌颈部转移部位颈深淋巴结上群()

答案： 正确

80、喉癌临床上多为基底细胞癌()

答案： 错误

81、腮腺鞘是由下面哪一层筋膜包裹而成（ ）

- A、 颈浅筋膜
- B、 颈深筋膜中层
- C、 颈深筋膜浅层
- D、 颈深筋膜深层
- E、 颈阔肌筋膜

答案： C

82、人骨蜗管旋绕蜗轴的周数是（ ）

- A、 0.5
- B、 0.75
- C、 1.25~2.25

D、 2.5~2.75

E、 3.5~3.75

答案： D

83、哪一型甲状腺癌常合并内分泌综合征（ ）

A、 甲状腺髓样癌

B、 甲状腺乳头状癌

C、 甲状腺未分化癌

D、 甲状腺滤泡状癌

E、 甲状腺鳞癌

答案： A

84、下列可确诊支气管异物的是（ ）

A、 X线片检查

B、 CT扫描检查

C、 支气管镜检查

D、 病检

E、 磁共振检查

答案： C

85、当外力从正面直接撞击颈部时,主要损伤（ ）

A、 颈椎

B、 颈部大血管

C、 食管

D、 喉、气管、甲状腺

E、 颈部神经

答案： D

86、扁桃体外侧相邻的肌肉为（ ）

A、 咽上缩肌

B、 咽中缩肌

C、 腭舌肌

D、 腭咽肌

E、茎突咽肌

答案： A

87、蝶窦的开口在（ ）

A、中鼻道

B、鼻咽腔

C、蝶筛隐窝

D、鼻顶部

E、鼻外部

答案： C

88、鼻尖部发生疔肿时疼痛的明显的原因是（ ）

A、鼻尖部皮肤较厚

B、鼻尖部感觉神经比较敏感

C、鼻尖部皮肤与其下面的脂肪纤维组织及软骨膜连接紧密

D、鼻尖部皮肤汗腺较多

E、鼻尖部血管丰富

答案： C

89、半规管接受的适宜刺激是（ ）

A、匀速旋转刺激

B、匀速直线运动刺激

C、变速旋转刺激

D、变速直线运动刺激

E、直线运动刺激

答案： C

90、梅尼埃病的临床特征不包括（ ）

A、发作性头晕

B、耳聋

C、耳鸣

D、耳胀满感

E、眩晕

答案： A

91、喉阻塞患者,若出现定向力丧失,心律失常等症状,其呼吸困难应属于 ()

- A、 一度
- B、 二度
- C、 三度
- D、 四度

答案： D

92、鼓膜紧张部由内向外分哪三层 ()

- A、 鳞状上皮层、肌层、内膜层
- B、 鳞状上皮层、纤维层、粘膜层
- C、 粘膜层、纤维层、鳞状上皮层
- D、 纤维层、粘膜层、鳞状上皮层
- E、 纤维层、肌层、内膜层

答案： C

93、幼儿中耳炎易致脑膜刺激症状,主要是何缝隙未闭合引起? ()

- A、 岩鳞裂
- B、 鼓鳞裂
- C、 鼓乳裂
- D、 岩鼓裂
- E、 鼓沟

答案： A

94、清理外耳道时引起咳嗽是由于刺激了 ()

- A、 下颌神经耳颞支
- B、 迷走神经耳支
- C、 耳大神经
- D、 枕小神经
- E、 舌咽神经分支

答案： B

95、关于坏死性外耳道炎,下列哪项错误 ()

- A、 又称恶性外耳道炎
- B、 常继发于糖尿病
- C、 常引起颞骨骨髓炎和广泛进行性坏死
- D、 可并发多发性脑神经麻痹
- E、 致病菌多为金黄色葡萄球菌

答案： E

96、青年男性患者,上感后左耳剧痛伴左耳听力下降,电测听检查示左耳轻度传导性聋,左耳鼓膜红肿上有紫色血疱,外耳道皮肤充血,最可能的诊断是 ()

- A、 急性化脓性中耳炎
- B、 颈静脉球体瘤
- C、 大疱性鼓膜炎
- D、 中耳癌
- E、 急性分泌性中耳炎

答案： C

97、慢性化脓性中耳炎的病因,下列哪项不是 ()

- A、 急性化脓性中耳炎彻底治疗后
- B、 病人身体抵抗力差
- C、 感染病菌毒性过强
- D、 鼻腔、鼻窦、咽部存在慢性病灶
- E、 中耳系统内通风引流通道的病理阻塞

答案： A

98、急性化脓性中耳炎治疗不正确的是 ()

- A、 鼓膜穿孔前可用 2%酚甘油滴耳
- B、 鼓膜穿孔后局部可使用抗生素粉剂
- C、 鼓膜穿孔后可用抗生素水溶液滴耳
- D、 及早应用足量抗生素控制感染
- E、 脓液减少、炎症逐渐消退时可用乙醇制剂滴耳

答案： B

99、梅尼埃病的基本病理改变是 ()

- A、 膜迷路纤维化

- B、 膜迷路充血
- C、 膜迷路积水
- D、 螺旋器退行性变
- E、 血管纹萎缩

答案： C

100、咽反射实现了咽的（ ）

- A、 呼吸功能
- B、 吞咽功能
- C、 言语形成功能
- D、 防御保护功能
- E、 免疫功能

答案： D

101、会厌和舌根之间为（ ）

- A、 梨状窝
- B、 会厌前间隙
- C、 杓会厌壁
- D、 会厌谷
- E、 环后隙

答案： B

102、除哪块肌外,其余均属舌骨上肌群（ ）

- A、 二腹肌
- B、 下颌舌骨肌
- C、 舌骨舌肌
- D、 颏舌骨肌
- E、 茎突舌骨肌

答案： C

103、颈内动脉在颈部的分支有（ ）

- A、 颞浅动脉
- B、 上颌动脉

- C、 甲状腺下动脉
- D、 无分支
- E、 面动脉

答案： D

104、在临床上听到患者有吸气性喉喘鸣,提示有 ()

- A、 支气管哮喘
- B、 喉炎
- C、 喉阻塞
- D、 肺气肿
- E、 肺不张

答案： C

105、正常成人从上切牙到气管隆嵴的距离为 ()

- A、 17~19cm
- B、 20~22cm
- C、 23~25cm
- D、 26~28cm
- E、 29~31cm

答案： C

106、诊断气管异物最主要依据是 ()

- A、 异物吸入史
- B、 咳嗽
- C、 呼吸困难
- D、 听诊肺呼吸音减弱
- E、 X线肺部阴影

答案： A

107、不支配扁桃体神经的是 ()

- A、 舌咽神经分支
- B、 迷走神经分支
- C、 舌下神经

D、 上颌神经

E、 交感神经

答案： C

108、鼻咽部淋巴引流至（ ）

A、 颌下淋巴结

B、 耳后淋巴结

C、 下颌角淋巴结

D、 颈深上淋巴结

E、 颈深下淋巴结

答案： D

109、对于慢性扁桃体炎反复急性发作,常用的有效的治疗方法是（ ）

A、 药物治疗

B、 免疫疗法

C、 物理疗法

D、 激光治疗

E、 手术治疗

答案： E

110、下列哪项符合慢性扁桃体炎的特征（ ）

A、 平时多无明显自觉症状,反复急性发作

B、 经常有不明原因的低热

C、 扁桃体隐窝口有角化物

D、 单侧扁桃体肥大

E、 咽痛, 吞咽时明显

答案： A

111、对急性扁桃体炎引起的全身并发症不包括（ ）

A、 风湿热

B、 急性关节炎

C、 心肌炎

D、 急性肾炎

E、急性中耳炎

答案： E

112、前上型扁桃体周脓肿穿刺的部位正确的是（ ）

- A、 脓肿最隆起处
- B、 腭垂尖端与最后磨牙连线的中点
- C、 腭垂底与最后磨牙连线中点上 1cm
- D、 扁桃体上窝
- E、 腭舌弓上缘

答案： A

113、有关鼻咽癌的描述不相符的是（ ）

- A、 是我国的高发肿瘤之一
- B、 多见于 30~40 岁
- C、 男性发病率高于女性
- D、 EB 病毒在其发病中有重要作用
- E、 鼻咽癌发病率有种族及家族聚集现象

答案： B

114、鼻腔后部及鼻咽部出血（ ）

- A、 后鼻孔填塞
- B、 切开引流, 不行鼻腔填塞
- C、 切开引流, 行鼻腔填塞
- D、 前鼻孔填塞
- E、 前后鼻孔填塞

答案： E

115、关于鼻出血, 错误的是（ ）

- A、 血液病是鼻出血的一种病因
- B、 与鼻中隔偏曲无关
- C、 儿童、青少年多数发生在利特尔区
- D、 老年人鼻涕中带有血性分泌物应怀疑恶性肿瘤
- E、 年轻人鼻涕中带有血性分泌物可能是恶性肿瘤

答案： E

116、蜗窗膜又称（ ）

- A、 紧张部鼓膜
- B、 松弛部鼓膜
- C、 前庭膜
- D、 蜗窗龕膜
- E、 第二鼓膜

答案： E

117、茎突和乳突之间的骨孔称为（ ）

- A、 内耳道口
- B、 茎乳孔
- C、 鼓室小管开口
- D、 外耳门
- E、 乳突小管开口

答案： B

118、关于砧骨豆状突叙述正确的是（ ）

- A、 位于砧骨窝内
- B、 参与形成锤砧关节
- C、 参与形成砧镫关节
- D、 为砧骨短脚末端的膨大
- E、 位于砧骨体的前外方

答案： C

119、颈动脉体瘤（ ）

- A、 多由动脉硬化引起
- B、 由动脉内膜病变引起
- C、 多由创伤引起
- D、 由颈总动脉分叉处后方外膜的化学感受器发生病变所致
- E、 由先天性动脉囊性中层坏死所致

答案： D

120、外耳道疔描述有误的是（ ）

- A、 又称局限性外耳道炎
- B、 为外耳道软骨部毛囊感染
- C、 脓肿成熟时, 红肿处变软, 顶部有黄色脓点
- D、 脓液量少、稠厚、有黏液, 有时带血
- E、 病原菌主要是葡萄球菌

答案： D

121、慢性化脓性中耳炎, 鼓膜穿孔位于前后皱襞及锤骨短突之上者称为（ ）

- A、 中央性穿孔
- B、 紧张部穿孔
- C、 边缘性穿孔
- D、 松弛部穿孔
- E、 上述都不是

答案： D

122、第 2 鳃裂瘻（ ）

- A、 瘻管穿越颈动脉分叉
- B、 瘻管跨越颈动脉之前
- C、 瘻管跨越颈动脉之后
- D、 瘻管跨越颈内静脉之后
- E、 瘻管跨越面神经

答案： A

123、引起传导性聋的先天性疾病不包括下列哪项（ ）

- A、 外耳道闭锁
- B、 听骨链畸形
- C、 前庭窗和蜗窗发育异常
- D、 耳硬化
- E、 鼓膜发育异常

答案： D

124、在临床上听到患者有吸气性喉喘鸣, 提示有（ ）

- A、 支气管哮喘
- B、 喉炎
- C、 喉阻塞
- D、 肺气肿
- E、 肺不张

答案： C

125、治疗慢性喉炎的首要治疗措施是（ ）

- A、 雾化吸入抗生素和糖皮质激素
- B、 寻找、去除病因
- C、 服用中药
- D、 二氧化碳激光手术
- E、 手术治疗

答案： B

126、环甲动脉的来源于（ ）

- A、 喉上动脉
- B、 甲状腺上动脉
- C、 甲状腺下动脉
- D、 喉中动脉
- E、 喉下动脉

答案： B

127、第二颈椎也叫（ ）

- A、 隆椎
- B、 枢椎
- C、 寰椎
- D、 龙椎
- E、 环椎

答案： B

128、甲状舌管瘻外瘻口位于（ ）

- A、 颈侧

- B、 颈后
- C、 锁骨上
- D、 颈前正中
- E、 颌下

答案： D

129、淋巴结结核应行（ ）

- A、 抗炎治疗
- B、 抗结核治疗
- C、 抗病毒治疗
- D、 手术治疗
- E、 免疫治疗

答案： B

130、夹层颈动脉瘤（ ）

- A、 多由动脉硬化引起
- B、 由动脉内膜病变引起
- C、 多由创伤引起
- D、 由颈总动脉分叉处后方外膜的化学感受器发生病变所致
- E、 由先天性动脉囊性中层坏死所致

答案： E

131、发生颈部淋巴结转移率最高的头颈恶性肿瘤为（ ）

- A、 喉癌
- B、 下咽癌
- C、 鼻咽癌
- D、 环后癌
- E、 扁桃体癌

答案： C

132、额窦的开口于（ ）

- A、 上鼻道
- B、 中鼻道

- C、 下鼻道
- D、 蝶筛隐窝
- E、 额骨鼻突

答案： D

133、“腺样体面容”描述错误的是（ ）

- A、 表情呆板
- B、 上颌骨变长
- C、 硬腭高拱
- D、 下切牙突出
- E、 牙列不齐

答案： D

134、中鼻甲的前部附着于（ ）

- A、 筛窦顶部
- B、 筛骨水平板
- C、 筛窦顶部与筛骨水平板交接处的前颅底骨
- D、 鼻腔外侧壁
- E、 鼻腔内侧壁

答案： C

135、区分前、后筛窦的解剖标志是（ ）

- A、 中鼻甲基板
- B、 中鼻甲附着处
- C、 下鼻甲附着处
- D、 筛前动脉
- E、 筛后动脉

答案： A

136、上颌窦后外壁的恶性肿瘤引起的张口困难的原因是（ ）

- A、 肿瘤侵犯了颞颌关节
- B、 肿瘤侵犯了翼内肌
- C、 肿瘤侵犯了翼外肌

- D、 肿瘤侵犯了咬肌
- E、 肿瘤侵犯了下颌关节

答案： B

137、筛窦的说法,下列哪项是错的 ()

- A、 筛窦位于上颌骨额突内
- B、 前组筛窦开口于中鼻道
- C、 后组筛窦开口于上鼻道
- D、 出生后 1~2 岁发育较快

答案： A

138、人骨蜗管旋绕蜗轴的周数是 ()

- A、 0.5
- B、 0.75
- C、 1.25~2.25
- D、 2.5~2.75
- E、 3.5~3.75

答案： D

139、母亲怀孕早期哪些因素与先天性非遗传性聋有关 ()

- A、 外伤
- B、 患风疹
- C、 营养不良
- D、 患流感
- E、 大量应用耳毒性药物

答案： BDE

140、分别司声带外展与内收的肌肉是 ()

- A、 环杓后肌
- B、 环甲肌
- C、 环杓侧肌和杓肌
- D、 甲杓肌

答案： AC

141、前组鼻窦包括（ ）

- A、 上颌窦
- B、 额窦
- C、 前组筛窦
- D、 后组筛窦
- E、 蝶窦

答案： ABC

142、耳廓外伤的正确处理方法是（ ）

- A、 完全断离可及时将其浸泡于含有肝素的 0.9%氯化钠溶液中, 尽早对位缝合
- B、 皮肤及软骨同时小面积缺损, 可做边缘楔形切除再对位缝合
- C、 皮肤大块缺损而软骨完整, 可用耳后带蒂皮瓣或游离皮瓣修复
- D、 小血肿在严格无菌操作下抽出积血, 加压包扎 48 小时
- E、 血肿较大应手术切开, 清除积血和血凝块

答案： ABCDE

143、梅尼埃病的治疗原则是（ ）

- A、 调节植物神经功能
- B、 改善内耳微循环
- C、 解除迷路积水
- D、 抗感染治疗
- E、 长期、规范保守治疗无效者可考虑手术治疗

答案： ABCE

144、急性化脓性中耳炎感染途径是咽鼓管途径()

答案： 正确

145、急性鼻窦炎鼻窦区有压痛()

答案： 正确

146、喉癌颈部转移部位颈深淋巴结下群()

答案： 正确

147、鼻咽癌颈部转移部位颈深淋巴结上群()

答案： 正确

148、喉癌临床上多为基底细胞癌()

答案： 错误

149、婴幼儿因咽鼓管长而细故较易患中耳炎()

答案： 错误

150、额窦的开口于 ()

- A、 上鼻道
- B、 中鼻道
- C、 下鼻道
- D、 蝶筛隐窝
- E、 额骨鼻突

答案： D

151、“腺样体面容”描述错误的是 ()

- A、 表情呆板
- B、 上颌骨变长
- C、 硬腭高拱
- D、 下切牙突出
- E、 牙列不齐

答案： D

152、中鼻甲的前部附着于 ()

- A、 筛窦顶部
- B、 筛骨水平板
- C、 筛窦顶部与筛骨水平板交接处的前颅底骨
- D、 鼻腔外侧壁
- E、 鼻腔内侧壁

答案： C

153、区分前、后筛窦的解剖标志是 ()

- A、 中鼻甲基板
- B、 中鼻甲附着处
- C、 下鼻甲附着处

D、 筛前动脉

E、 筛后动脉

答案： A

154、上颌窦后外壁的恶性肿瘤引起的张口困难的原因是（ ）

A、 肿瘤侵犯了颞颌关节

B、 肿瘤侵犯了翼内肌

C、 肿瘤侵犯了翼外肌

D、 肿瘤侵犯了咬肌

E、 肿瘤侵犯了下颌关节

答案： B

155、筛窦的说法,下列哪项是错的（ ）

A、 筛窦位于上颌骨额突内

B、 前组筛窦开口于中鼻道

C、 后组筛窦开口于上鼻道

D、 出生后1~2岁发育较快

答案： A

156、蝶窦囊肿的眶周出现皮肤感觉障碍,眼睑下垂,眼球固定,失明时应考虑是（ ）

A、 球后视神经炎

B、 眶尖综合征

C、 眶内蜂窝织炎

D、 海绵窦血栓性静脉炎

E、 面神经损坏

答案： B

157、耳声发射反映哪一部位的功能状态（ ）

A、 外耳道

B、 鼓膜

C、 听骨链

D、 耳蜗外毛细胞

E、 听神经

答案： D

158、一般不做活检的是（ ）

- A、 鼻咽癌
- B、 鼻咽淋巴肉瘤
- C、 鼻咽纤维血管瘤
- D、 原因不明的颈部淋巴结肿大
- E、 以上都不是

答案： C

159、乳突手术时确定鼓窦位置的重要标志是（ ）

- A、 道上三角区
- B、 道上棘
- C、 乳突切迹
- D、 鼓乳裂
- E、 鼓室盖

答案： A

160、鼓膜紧张部由内向外分哪三层（ ）

- A、 鳞状上皮层、肌层、内膜层
- B、 鳞状上皮层、纤维层、粘膜层
- C、 粘膜层、纤维层、鳞状上皮层
- D、 纤维层、粘膜层、鳞状上皮层
- E、 纤维层、肌层、内膜层

答案： C

161、幼儿中耳炎易致脑膜刺激症状,主要是何缝隙未闭合引起?（ ）

- A、 岩鳞裂
- B、 鼓鳞裂
- C、 鼓乳裂
- D、 岩鼓裂
- E、 鼓沟

答案： A

162、清理外耳道时引起咳嗽是由于刺激了（ ）

- A、 下颌神经耳颞支
- B、 迷走神经耳支
- C、 耳大神经
- D、 枕小神经
- E、 舌咽神经分支

答案： B

163、关于坏死性外耳道炎,下列哪项错误（ ）

- A、 又称恶性外耳道炎
- B、 常继发于糖尿病
- C、 常引起颞骨骨髓炎和广泛进行性坏死
- D、 可并发多发性脑神经麻痹
- E、 致病菌多为金黄色葡萄球菌

答案： E

164、青年男性患者,上感后左耳剧痛伴左耳听力下降,电测听检查示左耳轻度传导性聋,左耳鼓膜红肿上有紫色血疱,外耳道皮肤充血,最可能的诊断是（ ）

- A、 急性化脓性中耳炎
- B、 颈静脉球体瘤
- C、 大疱性鼓膜炎
- D、 中耳癌
- E、 急性分泌性中耳炎

答案： C

165、慢性化脓性中耳炎的病因,下列哪项不是（ ）

- A、 急性化脓性中耳炎彻底治疗后
- B、 病人身体抵抗力差
- C、 感染病菌毒性过强
- D、 鼻腔、鼻窦、咽部存在慢性病灶
- E、 中耳系统内通风引流通道的病理阻塞

答案： A

166、急性化脓性中耳炎治疗不正确的是（ ）

- A、 鼓膜穿孔前可用 2%酚甘油滴耳
- B、 鼓膜穿孔后局部可使用抗生素粉剂
- C、 鼓膜穿孔后可用抗生素水溶液滴耳
- D、 及早应用足量抗生素控制感染
- E、 脓液减少、炎症逐渐消退时可用乙醇制剂滴耳

答案： B

167、梅尼埃病的基本病理改变是（ ）

- A、 膜迷路纤维化
- B、 膜迷路充血
- C、 膜迷路积水
- D、 螺旋器退行性变
- E、 血管纹萎缩

答案： C

168、咽反射实现了咽的（ ）

- A、 呼吸功能
- B、 吞咽功能
- C、 言语形成功能
- D、 防御保护功能
- E、 免疫功能

答案： D

169、会厌和舌根之间为（ ）

- A、 梨状窝
- B、 会厌前间隙
- C、 杓会厌壁
- D、 会厌谷
- E、 环后隙

答案： B

170、除哪块肌外,其余均属舌骨上肌群（ ）

- A、 二腹肌

- B、 下颌舌骨肌
- C、 舌骨舌肌
- D、 颞舌骨肌
- E、 茎突舌骨肌

答案： C

171、颈内动脉在颈部的分支有（ ）

- A、 颞浅动脉
- B、 上颌动脉
- C、 甲状腺下动脉
- D、 无分支
- E、 面动脉

答案： D

172、在临床上听到患者有吸气性喉喘鸣,提示有（ ）

- A、 支气管哮喘
- B、 喉炎
- C、 喉阻塞
- D、 肺气肿
- E、 肺不张

答案： C

173、正常成人从上切牙到气管隆嵴的距离为（ ）

- A、 17~19cm
- B、 20~22cm
- C、 23~25cm
- D、 26~28cm
- E、 29~31cm

答案： C

174、诊断气管异物最主要依据是（ ）

- A、 异物吸入史
- B、 咳嗽

- C、呼吸困难
- D、听诊肺呼吸音减弱
- E、X线肺部阴影

答案： A

175、不支配扁桃体神经的是（ ）

- A、舌咽神经分支
- B、迷走神经分支
- C、舌下神经
- D、上颌神经
- E、交感神经

答案： C

176、鼻咽部淋巴引流至（ ）

- A、颌下淋巴结
- B、耳后淋巴结
- C、下颌角淋巴结
- D、颈深上淋巴结
- E、颈深下淋巴结

答案： D

177、对于慢性扁桃体炎反复急性发作,常用的有效的治疗方法是（ ）

- A、药物治疗
- B、免疫疗法
- C、物理疗法
- D、激光治疗
- E、手术治疗

答案： E

178、下列哪项符合慢性扁桃体炎的特征（ ）

- A、平时多无明显自觉症状,反复急性发作
- B、经常有不明原因的低热
- C、扁桃体隐窝口有角化物

- D、 单侧扁桃体肥大
- E、 咽痛, 吞咽时明显

答案: A

179、对急性扁桃体炎引起的全身并发症不包括 ()

- A、 风湿热
- B、 急性关节炎
- C、 心肌炎
- D、 急性肾炎
- E、 急性中耳炎

答案: E

180、前上型扁桃体周脓肿穿刺的部位正确的是 ()

- A、 脓肿最隆起处
- B、 腭垂尖端与最后磨牙连线的中点
- C、 腭垂底与最后磨牙连线中点上 1cm
- D、 扁桃体上窝
- E、 腭舌弓上缘

答案: A

181、有关鼻咽癌的描述不相符的是 ()

- A、 是我国的高发肿瘤之一
- B、 多见于 30~40 岁
- C、 男性发病率高于女性
- D、 EB 病毒在其发病中有重要作用
- E、 鼻咽癌发病率有种族及家族聚集现象

答案: B

182、鼻腔后部及鼻咽部出血 ()

- A、 后鼻孔填塞
- B、 切开引流, 不行鼻腔填塞
- C、 切开引流, 行鼻腔填塞
- D、 前鼻孔填塞

E、前后鼻孔填塞

答案： E

183、关于鼻出血,错误的是 ()

A、 血液病是鼻出血的一种病因

B、 与鼻中隔偏曲无关

C、 儿童、青少年多数发生在利特尔区

D、 老年人鼻涕中带有血性分泌物应怀疑恶性肿瘤

E、 年轻人鼻涕中带有血性分泌物可能是恶性肿瘤

答案： E

184、蜗窗膜又称 ()

A、 紧张部鼓膜

B、 松弛部鼓膜

C、 前庭膜

D、 蜗窗龕膜

E、 第二鼓膜

答案： E

185、茎突和乳突之间的骨孔称为 ()

A、 内耳道口

B、 茎乳孔

C、 鼓室小管开口

D、 外耳门

E、 乳突小管开口

答案： B

186、关于砧骨豆状突叙述正确的是 ()

A、 位于砧骨窝内

B、 参与形成锤砧关节

C、 参与形成砧镫关节

D、 为砧骨短脚末端的膨大

E、 位于砧骨体的前外方

答案： C

187、颈动脉体瘤 ()

- A、 多由动脉硬化引起
- B、 由动脉内膜病变引起
- C、 多由创伤引起
- D、 由颈总动脉分叉处后方外膜的化学感受器发生病变所致
- E、 由先天性动脉囊性中层坏死所致

答案： D

188、外耳道疔描述有误的是 ()

- A、 又称局限性外耳道炎
- B、 为外耳道软骨部毛囊感染
- C、 脓肿成熟时, 红肿处变软, 顶部有黄色脓点
- D、 脓液量少、稠厚、有黏液, 有时带血
- E、 病原菌主要是葡萄球菌

答案： D

189、慢性化脓性中耳炎, 鼓膜穿孔位于前后皱襞及锤骨短突之上者称为 ()

- A、 中央性穿孔
- B、 紧张部穿孔
- C、 边缘性穿孔
- D、 松弛部穿孔
- E、 上述都不是

答案： D

190、第 2 鳃裂瘻 ()

- A、 瘻管穿越颈动脉分叉
- B、 瘻管跨越颈动脉之前
- C、 瘻管跨越颈动脉之后
- D、 瘻管跨越颈内静脉之后
- E、 瘻管跨越面神经

答案： A

191、引起传导性聋的先天性疾病不包括下列哪项 ()

- A、 外耳道闭锁
- B、 听骨链畸形
- C、 前庭窗和蜗窗发育异常
- D、 耳硬化
- E、 鼓膜发育异常

答案： D

192、在临床上听到患者有吸气性喉喘鸣,提示有 ()

- A、 支气管哮喘
- B、 喉炎
- C、 喉阻塞
- D、 肺气肿
- E、 肺不张

答案： C

193、治疗慢性喉炎的首要治疗措施是 ()

- A、 雾化吸入抗生素和糖皮质激素
- B、 寻找、去除病因
- C、 服用中药
- D、 二氧化碳激光手术
- E、 手术治疗

答案： B

194、环甲动脉的来源于 ()

- A、 喉上动脉
- B、 甲状腺上动脉
- C、 甲状腺下动脉
- D、 喉中动脉
- E、 喉下动脉

答案： B

195、第二颈椎也叫 ()

- A、 隆椎
- B、 枢椎
- C、 寰椎
- D、 龙椎
- E、 环椎

答案： B

196、甲状舌管瘻外瘻口位于（ ）

- A、 颈侧
- B、 颈后
- C、 锁骨上
- D、 颈前正中
- E、 颌下

答案： D

197、淋巴结结核应行（ ）

- A、 抗炎治疗
- B、 抗结核治疗
- C、 抗病毒治疗
- D、 手术治疗
- E、 免疫治疗

答案： B

198、夹层颈动脉瘤（ ）

- A、 多由动脉硬化引起
- B、 由动脉内膜病变引起
- C、 多由创伤引起
- D、 由颈总动脉分叉处后方外膜的化学感受器发生病变所致
- E、 由先天性动脉囊性中层坏死所致

答案： E

199、发生颈部淋巴结转移率最高的头颈恶性肿瘤为（ ）

- A、 喉癌

- B、 下咽癌
- C、 鼻咽癌
- D、 环后癌
- E、 扁桃体癌

答案： C

200、哪一型甲状腺癌常合并内分泌综合征（ ）

- A、 甲状腺髓样癌
- B、 甲状腺乳头状癌
- C、 甲状腺未分化癌
- D、 甲状腺滤泡状癌
- E、 甲状腺鳞癌

答案： A

201、腮腺鞘是由下面哪一层筋膜包裹而成（ ）

- A、 颈浅筋膜
- B、 颈深筋膜中层
- C、 颈深筋膜浅层
- D、 颈深筋膜深层
- E、 颈阔肌筋膜

答案： C

202、下列可确诊支气管异物的是（ ）

- A、 X线片检查
- B、 CT扫描检查
- C、 支气管镜检查
- D、 病检
- E、 磁共振检查

答案： C

203、当外力从正面直接撞击颈部时,主要损伤（ ）

- A、 颈椎
- B、 颈部大血管

- C、 食管
- D、 喉、气管、甲状腺
- E、 颈部神经

答案： D

204、扁桃体外侧相邻的肌肉为（ ）

- A、 咽上缩肌
- B、 咽中缩肌
- C、 腭舌肌
- D、 腭咽肌
- E、 茎突咽肌

答案： A

205、蝶窦的开口在（ ）

- A、 中鼻道
- B、 鼻咽腔
- C、 蝶筛隐窝
- D、 鼻顶部
- E、 鼻外部

答案： C

206、急性鼻炎可出现的并发症是（ ）

- A、 鼻窦炎
- B、 急性中耳炎
- C、 急性咽喉炎
- D、 气管炎、支气管炎
- E、 以上都不对

答案： ABCD

207、关于耳蜗生理功能描述正确的是（ ）

- A、 传音功能和感音功能
- B、 传音功能是指声波振动从镫骨底板传递至整个耳蜗底周
- C、 基底膜的不同部位感受不同的声波频率

D、 蜗底区域感受高频声,蜗顶区域感受低频声

E、 耳蜗毛细胞具有感音功能

答案: ACDE

208、下列哪项符合慢性化脓性中耳炎骨疡型的临床特点 ()

A、 持续流脓,脓黏稠,常有臭味

B、 脓内可混有血丝

C、 鼓膜紧张部大穿孔或边缘性穿孔

D、 鼓室内有肉芽或息肉生长

E、 多有较重的神经性聋

答案: ABCD

209、对耳源性脑脓肿的脓肿处理主要有 ()

A、 穿刺抽脓

B、 50%葡萄糖和 20%甘露醇交替静脉注射

C、 脓肿切除

D、 切开引流

E、 应用糖皮质激素

答案: ACD

210、手术治疗耳源性脑脓肿正确的是 ()

A、 在严格消毒后经乳突术腔穿刺抽脓

B、 穿刺时,针体一旦刺入颅内,针头不能再改变方向

C、 如需改变针头方向,不必退出针体,可直接改变针头方向穿刺抽脓,

D、 脓肿表浅,已形成硬脑膜脓痿者,可切开引流

E、 脓肿包膜较厚,经反复穿刺无效,或多房性脓肿、多发性脓肿等,均应开颅摘除

答案: ABDE

211、慢性扁桃体炎可有隐窝口扩大或黄白色脓栓 ()

答案: 正确

212、音叉试验主要用于判断听力减退的程度 ()

答案: 错误

213、喉梗阻是呼气性呼吸困难()

答案： 错误

214、声门裂是喉腔最狭窄的部位()

答案： 正确

215、婴幼儿因咽鼓管长而细故较易患中耳炎()

答案： 错误

216、喉癌临床上多为基底细胞癌()

答案： 错误